

Le Passer

Revue d'ornithologie francilienne



- L'Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France
- Quinzième rapport du CHR 2007-2012
- Suivi de la nidification de linottes mélodieuses (95)
- Synthèse ornithologique 2012-2014 :
non-passereaux, volet 1

Etudier • Sensibiliser • Protéger la nature

Le Passer

Revue d'ornithologie francilienne

Directeur de la publication : Frédéric Malher, président du Corif.

Comité de rédaction et comité de lecture : Christian Gloria,
Olivier Laporte, Christian Letourneau, Frédéric Malher,
Catherine Walbecque.

Maquette et montage : Catherine Walbecque, Philippe Maintigneux.

Photo de couverture : Bécasseau tacheté, Olivier Laporte.

Relecture : Marie-José Leroy.

Traduction : Oliver Fox, John Rose.

Tarif 2017

9,15 € par numéro ; abonnement annuel (2 numéros) en France :
17 €, à l'étranger : 25 €.

ISSN 1141-3557.

Le CORIF

Centre ornithologique Île-de-France

Siège social

Muséum national d'histoire naturelle, Laboratoire de zoologie
(Mammifères et Oiseaux), 55, rue Buffon, 75005 PARIS

Siège administratif

Maison de l'oiseau, Parc forestier de la Poudrerie, Allée Eugène-
Burlot, 93410 VAUJOURS

Contacts

Téléphone : 01 48 60 13 00 - corif@corif.net - www.corif.net -
facebook.com/corifnet - twitter.com/corifnet

Vous trouvez un oiseau bagué !

L'oiseau est vivant...

Relevez attentivement le numéro de la bague, les lieu, date et heure,
etc... Et, envoyez votre observation au Centre de recherches par le
baguage des populations d'oiseaux (C.R.B.P.O.), 55, rue Buffon,
75005 PARIS

<http://www2.mnhn.fr/crbpo/spip.php?rubrique4>

L'oiseau est mort...

Retournez la bague au C.R.B.P.O., en ajoutant à vos observations
les causes présumées de la mort.

Merci d'avance.

EDITORIAL

Ce numéro du *Passer* sort en plein débat interne sur la fusion éventuelle du Corif avec la LPO. Je ne peux donc pas présumer de ce qu'il en sera de notre association en 2018. Je peux juste certifier que, quel que soit le cas de figure, notre revue poursuivra son bonhomme de chemin, rédigée et composée par la même équipe de bénévoles qui fait ce travail depuis plusieurs années (mais qui accepte d'être renforcée par des forces vives...), avec le même espoir de satisfaire ses lecteurs et de susciter chez eux des vocations de rédacteurs.

Ce numéro contient la première partie de la synthèse des observations des années 2012-2014. Si la compilation des données est bien facilitée depuis l'ouverture de Faune-IdF, la rédaction est devenue une tâche plus importante, car le nombre d'observations à traiter a beaucoup augmenté : ce sont plusieurs centaines de milliers d'observations (350 000 en moyenne) qui sont recueillies chaque année sur cet outil de saisie, très vite devenu irremplaçable.

Vous trouverez aussi une compilation des données validées par le CHR entre 2007 et 2012, rédigée par David Laloi. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à David, qui a tenu à bout de bras depuis de nombreuses années le *Passer* et le CHR. Après avoir confié le *Passer* à l'équipe actuelle, il a transmis la coordination du CHR à Yves Massin. Que l'un et l'autre soient remerciés pour leur travail, accompli pour l'un, à son début pour l'autre !

Frédéric Malher

L'Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France

Frédéric Malher

Le Centre ornithologique Île-de-France (Corif) vient de publier l'*Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France : 2009 - 2014* (Éditions du Corif, 204 pages. 25 euros, en vente sur www.corif.net).

L'ouvrage présente et commente les cartes de répartition et les effectifs de 169 espèces d'oiseaux ayant niché en Île-de-France entre 2009 et 2013 (nous avons toutefois fait figurer les espèces nidificatrices découvertes en 2014). Des informations sont fournies sur la reproduction de ces espèces et des recommandations sont données pour favoriser leur conservation.

Méthode


Le travail sur le terrain a été effectué entre 2009 et 2013 par des centaines d'ornithologues. Il s'inscrit dans le cadre d'un travail impulsé au niveau national par la LPO pour réaliser l'*Atlas des oiseaux nicheurs de France* (ISSA et MULLER, 2015). Au niveau régional, ce travail est le résultat de la coopération des principales associations naturalistes franciliennes : ANVL, CERF, NaturEssoonne, LPO-IdF, coordonnées par le Corif.

La région a été divisée en 124 mailles de 10 x 10 km. Le travail, coordonné par 65 responsables de maille, a consisté à établir la liste et les effectifs approximatifs des espèces nicheuses de chaque maille. Les indices de nidification utilisés sont les mêmes que ceux en usage sur les portails de saisie d'observations du réseau Biovision (Faune-IdF en particulier). Les coordinateurs étaient aussi chargés d'estimer les effectifs des espèces nicheuses dans leur maille en utilisant des classes d'abondance aux bornes croissant en progression géométrique (1-10 couples, 11-100 couples, 101-1 000 couples et plus de 1 000 couples). Selon les espèces, entre 50 % et 60 % des mailles ont vu leurs effectifs estimés par les coordinateurs.

Pour les espèces communes, les estimations des effectifs franciliens ont été calculées, comme pour l'Atlas national, par la « méthode des deux moyennes » (ROCHÉ *et al.*, 2013). Elle consiste à calculer l'effectif moyen des mailles occupées de deux manières : en retenant soit la moyenne arithmétique de chaque classe (5,5 ;

55,5 ; 550,5 ; 5 500,5), soit la moyenne géométrique (3,16 ; 31,62 ; 316,23 ; 3 162,27). On obtient donc deux valeurs d'effectif moyen pour les mailles dont les effectifs ont été estimés par leur coordinateur. Pour les mailles dont les effectifs n'ont pas été estimés, la méthode considère que leur effectif moyen est le même que pour celles qui ont été renseignées. Une simple règle de trois permet donc d'obtenir l'estimation qui a été retenue pour cet atlas.

Il faut cependant retenir que cette méthode d'apparence très mathématique repose aussi sur des estimations « à dire d'experts ». Elles sont juste faites au niveau de chaque maille, alors que les estimations classiques ont été faites à « dire d'expert » globalement au niveau régional. Dans les deux cas, la subjectivité humaine intervient.



Résultats

Au total, 169 espèces d'oiseaux ont niché en Île-de-France au moins une fois durant la période de travail (en tenant compte des espèces nidificatrices découvertes en 2014). Parmi elles, on peut considérer que 152 espèces nichent régulièrement dans notre région.

Espèces en déclin

L'évolution des effectifs des espèces a été suivie essentiellement grâce aux données de l'Observatoire régional des oiseaux communs (OROC), déclinaison régionale, coordonnée par le Corif, du programme STOC, piloté par le MNHN. On peut considérer qu'au moins 48 espèces sont en déclin plus ou moins marqué sur les 10 dernières années, sachant qu'un certain nombre d'espèces dont la tendance n'a pu être précisée sont sans doute aussi en déclin.

Les baisses les plus nettes concernent souvent les espèces vivant dans les milieux agricoles : Moineau friquet (*Passer montanus*), 80 % en 10 ans ; Pipit farlouse (*Anthus pratensis*), 75 % ; Cochevis huppé (*Galeriuda cristata*), en quasi disparition ; Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*), 46 % ; mais elles touchent aussi des espèces d'autres milieux : Pic épeichette (*Dryobates minor*), Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*), Accenteur mouchet (*Prunella modularis*), Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*), Mésange boréale (*Poecile montanus*). On peut noter qu'un certain nombre d'entre elles ont des préférences thermiques fraîches, ce qui laisse penser à un impact possible du réchauffement climatique.

D'autres ont beaucoup baissé à la fin du XX^e siècle et stagnent depuis à un niveau bien bas : Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*), Huppe fasciée (*Upupa epops*), Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*), Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), Fauvette pitchou (*Sylvia undata*), Blongios nain (*Ixobrychus minutus*).

Espèces nouvelles ou en progression

Inversement, quelques espèces se portent bien, souvent hébergées par

des milieux aquatiques : Mouette mélanocéphale (*Ichthyæetus melanocephalus*), Nette rousse (*Netta rufina*), Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*), Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*), Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), Goéland argenté (*Larus argentatus*)... À noter que cela ne concerne aucun passereau.

Quelques espèces nouvelles se sont établies dans notre région depuis l'an 2000 : Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*), Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*), Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*), Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Aigrette garzette (*Egretta garzetta*), Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*), Échasse blanche (*Himantopus himantopus*), Goéland brun (*Larus fuscus*).

Deux autres espèces ont niché pour la première fois en Île-de-France, mais sans doute de manière occasionnelle : le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en 2014 et 2015 et la Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) en 2014.

Le cas des espèces exotiques

Quelques espèces exotiques ont constitué des populations viables :

• la Bernache du Canada (*Branta canadensis*), dont les premiers couples ont été lâchés en 1975 à Saint-Quentin-en-Yvelines, a connu une croissance exponentielle jusqu'à atteindre peut-être un plateau d'après les comptages hivernaux :

- la Perruche à collier (*Psittacula krameri*) très probablement échappées principalement vers 1990 (avec des cas plus anciens) au niveau des deux aéroports de Roissy et d'Orly. La croissance de la population semble se maintenir au taux assez incroyable de +25 % annuels ! Tout le Grand Paris ainsi que les franges de la Seine-et-Marne, une bonne partie de l'Essonne et des Yvelines hébergent actuellement des couples nicheurs :

- le Canard mandarin (*Aix gericulata*) et le Leïothrix jaune (*Leiothrix lutea*) se maintiennent sans montrer d'expansion spectaculaire.

Le cas du Faisan vénéré (*Symyaticus reevesi*) est plus délicat à interpréter vu l'importance des lâchers annuels pour la chasse.


L'avenir de deux espèces est à suivre de près : l'Ouette d'Égypte (*Alopochen aegyptiaca*), qui connaît une expansion importante au nord et à l'est de notre région ; et la Perruche Alexandre (*Psittacula eupatria*), qui vient d'être trouvée nicheuse mais dont la ressemblance avec la Perruche à collier a pu contribuer à la faire passer inaperçue.

Ce travail montre encore une fois, s'il en était besoin, d'une part, l'intérêt de l'établissement d'atlas régionaux (comme locaux ou nationaux) pour la connaissance de l'évolution de l'avifaune et d'autre part, l'importance des bénévoles et de leurs associations naturalistes pour l'énorme travail de terrain et de compilation des données, nécessaire à leur réalisation.

Bibliographie

ISSA N. & MULLER Y. (coord.), 2015.
*Atlas des oiseaux de France
métropolitaine. Nidification et présence
hivernale*, LPO / SEOF / MNHN,
Delachaux & Niestlé, Paris, deux
volumes. 1 408 p.

ROCHÉ J.-E., MULLER Y. & SIBLÉ J.-P., 2013 : Une méthode simple pour estimer les populations d'oiseaux communs nicheurs en France. *Alauda* **81** (4) : 241-268



Frédéric Malher

frederic.malher@orange.fr

LES OISEAUX RARES EN ÎLE-DE-FRANCE DE 2007 à 2012

David LALOI et le Comité d'homologation régional

ABSTRACT

Report on rare birds in the region of Île-de-France from 2007 to 2012. Fifteenth report of the Regional Rarities Committee.

En 2016, le Comité d'homologation régional s'est modernisé et a modifié ses procédures de validation des observations d'oiseaux rares en Île-de-France, en particulier pour s'adapter aux nouveaux modes de transmission des données via les sites de saisie en ligne et les bases de données sur Internet. Le CHR appliquera rétroactivement ces nouvelles procédures aux données soumises depuis 2013. Ce quinzième rapport du CHR est, de ce fait, un peu particulier puisqu'il couvre les dernières observations évaluées selon l'ancienne procédure, correspondant aux années 2007 à 2012, ainsi que quelques données antérieures qui n'avaient pas encore été publiées.

Le CHR tient à remercier les observateurs qui font l'effort de transmettre des descriptions précises et documentées, contribuant ainsi à la collecte d'informations détaillées sur les espèces rares ou occasionnelles en Île-de-France. Premier pas dans le cadre de la modernisation des procédures de validation, certaines données n'ayant pas fait l'objet de fiche descriptive formelle ont néanmoins été prises en compte, en particulier sur la base de photographies ou de descriptions diffusées sur Internet. Rappelons toutefois que les photographies, si elles sont souvent très utiles, ne sont pas toujours suffisantes, quelques-unes étant même parfois trompeuses. En outre, elles ne décrivent pas tout (comportement, voix, circonstances de l'observation, etc.) et il reste préférable de rédiger une fiche détaillée lors de l'observation d'une espèce soumise à homologation. Par ailleurs, plusieurs espèces, ayant connu des changements de statut qui ne justifiaient plus qu'elles soient soumises à homologation, ont été retirées de la procédure à partir du 1^{er} janvier 2012 ou du 1^{er} janvier 2013. Pour ces espèces, des procédures simplifiées de validation ont été appliquées aux dernières données soumises à homologation. Le fonctionnement du CHR « nouvelle formule » ainsi que la liste révisée des espèces soumises à homologation se trouvent sur le site du CORIF (www.corif.net/?pg=do&sj=31&ar=226) ainsi que sur www.faune-iledefrance.org à la rubrique Homologation.

Pour la période 2007-2012, les personnes suivantes ont participé au CHR : François BOUZENDORF, Gérard GROLLEAU, Pierre LE MARÉCHAL, Guilhem LESAFFRE, Philippe PERSUY, Benoît SEGERER, Jean-Philippe SIBLET, et David LALOI (secrétaire). Pour les données soumises à homologation nationale, les décisions relèvent du CHN, ses décisions étant reportées dans le présent rapport. Le nom des espèces soumises à homologation nationale est suivi d'un astérisque.

Concernant les données non homologuées, des indications sur les raisons ayant conduit au refus sont reportées dans la liste de ces observations, en fin de rapport. Des raisons plus

détaillées sont fournies aux observateurs qui en font la demande. Notons qu'une partie de ces données est refusée en raison d'une insuffisance de description.

Données acceptées

* = espèce soumise à l'homologation nationale

Cygne de Bewick

Cygnus columbianus

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand Voyeux, 3 individus, 23 décembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Luzancy-77, individu probablement de 2^e hiver, 23 et 24 novembre 2010 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
- Grisy-sur-Seine-77, 3 individus de 1^{er} hiver, 27 février au 19 mars 2011 (S. VINCENT).
- Luzancy-77, 2 adultes, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH, S. TARDY).
- Grisy-sur-Seine-77, adulte, 10 novembre 2011 (B. SEGERER) ; adulte et individu de 1^{er} hiver, 17 décembre 2011 au 14 janvier 2012 (S. VINCENT, P. ROUSSET *et al.*).
- Noyen-sur-Seine-77, adulte, probablement le même qu'à Grisy-sur-Seine, 3 et 4 décembre 2011 (P. ROUSSET, J.-P. SIBLET, R. HENRY, T. SEVELLEC, T. SCHUHMACHER).

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

- Changis-sur-Marne-77, 4 adultes et 1 individu de 1^{er} hiver, 15 au 31 janvier 2011 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH, S. TARDY).
- Armentières-en-Brie-77, 4 adultes et 1 individu de 1^{er} hiver, certainement les mêmes qu'à Changis-sur-Marne, 23 janvier 2011 (S. VINCENT).
- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand Voyeux, 1 individu, 20 avril 2012 (R. HUCHIN).

Oie (des moissons) de tundra

Anser fabalis rossicus

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 4 individus, 20 octobre au 3 novembre 2005, 14 décembre 2005 au 24 janvier 2006, 16 février au 30 mars 2006 (T. ROY, J.-P. LABOURDETTE, T. WILLIAMS – AVEN du Grand-Voyeux).
- Jouarre-77 / étang de Péreuse, 4 individus, les mêmes qu'à Congis-sur-Thérrouanne, 3 novembre au 14 décembre 2005 (J. BOTTINELLI).
- Verneuil-sur-Seine-78, 2 individus, 5 février 2006 (G. JARDIN,

- G. PHILIPPE, C. BERTRAND, L. BOITEUX).
- Luzancy-77, 1 individu, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH, S. TARDY).

L'hiver 2005-2006, pour lequel quelques données en retard sont publiées ici (incluant l'hivernage complet de 4 oiseaux dans le secteur de Congis-sur-Thérouanne et Jouarre), avait vu l'arrivée de quelques petits groupes. Il n'y a eu qu'une seule donnée, d'un seul individu associé à un groupe d'Oies rieuses, au cours des années suivantes et jusqu'en 2012.

Oie à bec court

Anser brachyrhynchus *

- Marolles-sur-Seine-77 et Bazoches-lès-Bray-77, individu de 1^{er} hiver, 20 novembre au 2 décembre 2011 (S. VINCENT *et al.*).

Cinquième mention francilienne ; les précédentes observations dataient de février 1964, janvier 1965, janvier 1979 et décembre 1981, et toutes ont été réalisées en Seine-et-Marne (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013).



Oie à bec court © Pierre Laur-Fournié

Oie rieuse

Anser albifrons

- Guernes-78, 30 individus en vol vers le nord, 5 février 2006 (G. PHILIPPE, G. JARDIN, C. BERTRAND *et al.*).
- Grisy-sur-Seine-77, 25 individus, 17 janvier au 14 février 2009 (ANVL).
- Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, individu de 1^{er} hiver de la sous-espèce *albifrons*, 25 janvier au 8 février 2009 (C. LETOURNEAU, P. SCHAFFHAUSEUR).
- Vigny-95, 2 individus en vol, 5 mars 2009 (Y. DUBOIS).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 8 au 24 mai 2009 (S. VINCENT, J. BOTTINELLI, T. ROY).
- Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 12 septembre 2009 (S. VINCENT).
- Luzancy-77, 2 immatures, 14 au 17 janvier 2010 (S. TARDY, J. BOTTINELLI).
- Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande Bosse, 19 individus, 21 février 2010 (S. VINCENT) ; 8 individus, 27 février 2010 (S. VINCENT).
- Guernes-78, 1 individu, 12 décembre 2010 (L. BOITEUX).
- Trilbardou-77, 16 individus, 7 janvier 2011 (P. PERSUY).
- Luzancy-77, 2 adultes et 5 individus de 1^{er} hiver, 14 et 15 janvier 2011 (J. BOTTINELLI).
- Giremoutiers-77, 9 individus, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI).
- Luzancy-77, 17 individus, 9 novembre 2011 (J. BOTTINELLI).

- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus de la sous-espèce *albifrons*, 14 novembre 2011 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 27 février au 31 mars 2012 (P. RIVALLIN, S. VINCENT, Y. MASSIN *et al.*).
- Luzancy-77, 6 individus, 12 mars 2012 (S. TARDY).
- Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande Bosse et Champs Courceaux, 1 individu, 18 mars au 4 mai 2012 (P. ROUSSET, S. VINCENT, P. RIVALLIN, B. LEBRUN *et al.*).

Bernache nonnette

Branta leucopsis

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 14 janvier au 16 février 2007, puis le 9 avril 2007 (T. FOURNET *et al.*).
- Saclay-91, adulte, 2 mars au 3 avril 2007 (C. FAJOLLES, C. HARDEL *et al.*).
- Chamarande-91, adulte, 15 avril 2007 (G. NOCLE).
- Milon-la-Chapelle-78, 1 individu, 29 avril 2007 (C. LETOURNEAU, O. THORET).
- Changis-sur-Marne-77, 1 individu, 1^{er} mai 2007 (J. BOTTINELLI).
- Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 8 juillet 2007 (S. VINCENT).
- Rambouillet-78, 1 individu, 28 octobre 2007 (L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE).
- Les Mesnuls-78, 1 individu, 11 novembre 2007 (F. VERGONJEANNE).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 8 et 20 janvier 2008 (L. ALBESA, S. VINCENT).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 8 avril 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Saint-Aubin-91, 1 individu, 16 juin au 4 octobre 2008 (C. HARDEL).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 7 individus, 25 novembre 2008 (N. FLAMANT).
- Marolles-sur-Seine-77 / Carreau Franc, 8 individus, 28 mars au 4 avril 2009 (S. VINCENT, L. ALBESA, J. CRESPO).
- Montfort-l'Amaury-78, 1 individu, 22 et 26 mai 2009 (C. LETOURNEAU).
- Les Mesnuls-78, 1 individu, 18 août 2009 (P. GOUDIN).
- Torcy-77, 1 individu, 18 décembre 2009 (J. DUMAND).
- Jablines-77, 1 individu, 22 décembre 2009 (R. PROVOST).
- Osny-95, 2 individus, 17 et 21 janvier 2010 (P. J. DUBOIS, G. JARDIN).
- Trilbardou-77, 16 adultes, 17 janvier 2010 (P. PERSUY, B. LELAURE).
- Saclay-91, 12 individus, 7 février 2010 (D. BOUCHET).
- Fontenay-le-Vicomte-91, 11 individus, 20 février 2010 (Conseil général de l'Essonne).
- Moisson-78, 24 individus, 2 janvier 2011, puis 26 individus, 29 janvier 2011 (L. BOITEUX *et al.*).
- Luzancy-77, 15 individus en vol, 3 janvier 2011 (S. TARDY).
- Jouars-Pontchartrain-78, 2 individus, 15 janvier 2011 (C. LETOURNEAU).
- Cergy-95, 1 individu, 15 avril 2011 (P. J. DUBOIS).
- Milon-la-Chapelle-78, 1 individu, 15 mai et 9 juin 2011 (C. LETOURNEAU, O. THORET).
- Mantes-la-Jolie-78 / Bassin d'aviron, 3 individus, 18 au 28 décembre 2011 (E. GROSSO *et al.*).
- Mantes-la-Jolie-78 / l'Île Aumône, 2 individus, 4 février 2012 (F. LELIÈVRE).
- Grigny-91, 1 individu, 14 février 2012 (J. DAUBIGNARD).
- Rambouillet-78, 2 individus, 22 février 2012 (L. CHEVALLIER).
- Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, 2 individus,

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

27 février 2012 (G. KERYER).

- Congis-sur-Thérouanne-77, 2 individus, 3 au 8 mars 2012 (M. ZUCCA, J. BIRARD, R. HUCHIN) ; 1 individu, fin mai au 17 septembre 2012 (M. ZUCCA, J. BIRARD, J. BOTTINELLI).
- Clairefontaine-en-Yvelines-78, 2 individus, 4 mars 2012 (C. LETOURNEAU).
- Guernes-78 / étang des Bastilles, 3 individus, 4 mars 2012 (E. GROSSO, A. CHAILLOU).
- Gesvres-le-Chapitre-77, 3 individus, 13 mars 2012 (R. HUCHIN).
- Varennes-Jarcy-91 / le moulin de Jarcy, 1 individu, 7 avril 2012 (P.-Y. HENRY) ; 1 individu, 12 décembre 2012 (O. MARÉCHAL).
- La Courneuve-93, 2 individus, mi-avril au 1^{er} mai 2012 (N. SANTA MARIA) ; adulte, 12 mai 2012 (N. SANTA MARIA).
- Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l'Ilon, 1 individu, 27 avril 2012 (M. SERAIN).
- Épône-78 / le Bout du monde, 1 individu, 30 avril au 19 juin 2012 (P. J. DUBOIS, E. GROSSO, O. LECLERC *et al.*).
- Ozoir-la-Ferrière-77, adulte, 17 juin 2012 (N. SANTA MARIA).
- Auffargis-78 / Vaux de Cernay et étang de l'Abbaye, 1 individu, 24 juillet 2012 (G. KERYER) ; 1 individu, 28 septembre 2012 (M. ZUCCA).
- Moisson-78, 1 individu, 23 septembre 2012 (L. BOITEUX).
- Bièvre-91 / les Damoiseaux, 1 individu, 22 décembre 2012 (D. ATTINAULT).

Il est possible que quelques petits groupes hivernaux correspondent bien à l'arrivée d'oiseaux sauvages, surtout lors des vagues de froid, mais la grande majorité des données concerne des oiseaux soit introduits localement, soit venant de populations férales de France, voire de plus loin en Europe. La Bernache nonnette n'est plus soumise à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Bernache cravant

Branta bernicla

- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 19 mars 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris

- Saclay-91, mâle, 12 au 26 mars 2007 (S. VINCENT, P. LE MARÉCHAL, C. HARDEL *et al.*).
- Cannes-Écluse-77, mâle adulte, 11 janvier 2009 (E. PERRET, J. CRESPO).

L'oiseau observé à Saclay en mars 2007 était porteur d'une marque nasale posée le 26 octobre 2006 au lac de Grand-Lieu-44. Avant d'être vu à Saclay, il était resté à Grand-Lieu jusqu'au 16 janvier 2007. Par la suite, il a été vu à Outines-51 le 3 février 2008, puis en Lubelskie (région de Lublin, Pologne) du 25 septembre au 2 octobre 2008.

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, mâle adulte, 15 novembre 2006 au 5 février 2007 (T. ROY – AVEN du Grand-Voyeux).
- Vigneux-sur-Seine-91 / la Fosse Montalbot, mâle, 1^{er} janvier au 3 février 2007 (Y. MASSIN, O. LAPORTE, D. LALOI *et al.*).
- Balloy-77, 1 individu, 7 janvier 2007 (J.-P. SIBLET, M. ZUCCA).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, mâle adulte, mi-septembre à fin décembre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, mâle adulte, 14 octobre 2007 (S. VINCENT).
- Vigneux-sur-Seine-91 / la Fosse Montalbot, mâle, probablement le même individu qu'en début d'année, 10 novembre au 20 décembre 2007 (T. AURISSESGUES, S. MALIGNAT *et al.*).
- Saint-Hubert-78, mâle, 26 novembre au 18 décembre 2007 (P. CRANÇON, A. DAUCHEZ *et al.*).
- Trilbardou-77, mâle adulte, 27 janvier 2008 (P. PERSUY, Y. DAVID) ; mâle adulte (le même que le 27 janvier) et probable mâle immature, 10 février 2008 (P. PERSUY).
- Égigny-77, mâle probablement de 1^{er} hiver, 3 au 16 février 2008 (D. LALOI, L. ALBESA *et al.*).
- Saclay-91, mâle adulte et individu de 1^{er} hiver, 10 au 12 février 2008, le mâle adulte seul jusqu'au 21 février 2008 (S. VINCENT, P. LE MARÉCHAL, D. LALOI *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77 / Grand Marais, 1 individu, 6 avril 2008 (S. VINCENT).
- Étampes-91, mâle adulte, 13 août 2008 (S. FOIX).
- Jablines-77, mâle probablement de 1^{er} hiver, 2 novembre 2008 (J. BOTTINELLI).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus, 10 novembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Vaires-le-Petit-91, femelle, 11 janvier 2009 (P. CRANÇON, J. CHARBONNIER).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 20 janvier au 2 mars 2009 (T. ROY).
- Jablines-77, mâle de 1^{er} hiver, 25 janvier au 14 février 2009 (E. PERRET, J. BOTTINELLI).
- Marolles-sur-Seine-77 / Motteux, mâle adulte, 8 mars 2009 (S. VINCENT).
- Jaulnes-77 / Neuvry, mâle adulte, 24 août 2009 (S. VINCENT).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus, septembre et octobre 2009, 1 seul du 25 octobre au 12 novembre 2009 (T. ROY).
- Le-Mesnil-Saint-Denis-78 / étang des Noës, 1 mâle et 1 femelle, 27 novembre 2009 (G. JARDIN) ; 1 individu, 28 novembre 2009 (C. DENOZIÈRE).
- Jablines-77, femelle, 22 et 26 décembre 2009 (R. PROVOST).
- Lac de Créteil-94, mâle et femelle, 10 janvier au 7 février 2010 (C. GLORIA, Y. MASSIN).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 mâles et 1 femelle, 31 janvier 2010 (J. BOTTINELLI).
- Saclay-91, mâle, 4 au 6 février 2010 (S. VINCENT, D. LALOI) ; mâle, peut-être le même que précédemment, 21 février 2010 (D. LALOI).
- Marolles-sur-Seine-77 / Motteux, mâle adulte, 24 juillet au 4 septembre 2010 (S. VINCENT).
- Jablines-77, femelle, 6 au 10 novembre 2010 (R. PROVOST).
- Lac de Créteil-94, mâle, 21 décembre 2010 (M. SANNIER).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 5 mars 2011 (S. VINCENT).

- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, femelle adulte, 15 et 16 avril 2011 (P. RIVALLIN).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, femelle, 30 septembre 2011 (J. BOTTINELLI).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, femelle, 10 décembre 2011 (T. ROY).
- Moisson-78, individu de 1^{er} hiver probablement mâle, 12 et 18 décembre 2011 (P. J. DUBOIS, E. GROSSO).
- Grigny-91 / l'Arbalète, mâle adulte, 19 janvier au 4 février 2012 (M.-M. SÉNÉCHAL, D. LALOI *et al.*).
- Luzancy-77, 1 individu, 6 février 2012 (J. BOTTINELLI).
- Lac de Créteil-94, mâle, 11 au 13 février 2012 (J. ANJUERER, Q. DUBOST *et al.*).
- Bazoches-lès-Bray-77 / la Grande-Bosse, mâle adulte, 10 et 12 septembre 2012 (G. NOCLE, S. VINCENT).
- Saclay-91, femelle, 9 octobre 2012 (D. LALOI).
- Grigny-91 / l'Arbalète, mâle adulte, 9 décembre 2012 (M.-M. SÉNÉCHAL).

Une série d'observations à Roissy-en-Brie-77, principalement à l'étang du Coq, entre l'été 2008 et le printemps 2009, n'a pas été incluse dans les données dans la mesure où elle concerne des oiseaux très certainement d'origine domestique. Il y a eu jusqu'à 5 individus ensemble, 3 mâles et 2 femelles ; au moins 2 de ces oiseaux étaient bagués, et leur comportement souvent relativement confiant. De tels oiseaux peuvent à l'occasion être observés ailleurs, et quelques autres données, notamment à des dates ou sur des sites atypiques, peuvent correspondre à des échappés.

À noter, plusieurs cas de retour probable des mêmes individus sur les mêmes sites d'hivernage, comme à Congis-sur-Thérouanne (probablement le même mâle depuis l'hiver 2003-2004 jusqu'à l'hiver 2007-2008), à Jablines ou encore à Vigneux-sur-Seine.

Rappelons encore que des oiseaux hybrides, s'ils semblent plus rares dans la région que les Fuligules nyrocas apparemment purs, sont néanmoins régulièrement observés, notamment des hybrides Fuligule nyroca x milouin. En présence d'un oiseau de type Fuligule nyroca, il convient de bien vérifier tous les critères permettant d'exclure un éventuel hybride.

Fuligule à tête noire

Aythya affinis *

- Jablines-77, mâle adulte, 8 au 29 mars 2008 (S. CHAMBRIS, P. J. DUBOIS, M. ZUCCA *et al.*).

Il s'agit de la première mention en Île-de-France (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013), qui arrive juste après une année exceptionnelle en France, puisque l'année 2007 a totalisé à elle seule près de la moitié des Fuligules à tête noire vus dans le pays (REEBER et le CHN, 2009).

Harelde boréale

Clangula hyemalis

- Jaulnes-77 / Neuville, mâle et femelle, 1^{er} au 3 juillet 2007 (F. LEGENDRE, J. CRESPO, J. SAVRY, J.-P. SIBLET) ; le mâle seulement, 6 juillet 2007 (Y. MASSIN) ; la femelle seulement, 8 au 14 juillet 2007 (S. VINCENT *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77, mâle et femelle de 1^{er} hiver (2^e année civile), 5 janvier au 31 mars 2008 (N. FLAMANT, L. ALBESA, J.-P. SIBLET *et al.*) ; mâle de 2^e année civile, peut-être un oiseau différent de celui présent depuis début janvier, 6 au 30 avril 2008 (M. ZUCCA, N. FLAMANT, B. SEGERER *et al.*).
- Jablines-77, mâle immature, 12 et 13 janvier 2008 (F. YVERT, B. ROGEZ *et al.*).

- Luzancy-77, mâle et femelle de 1^{er} hiver (2^e année civile), 12 janvier au 17 mars 2008 (M. ZUCCA, J. BOTTINELLI).
- Vaires-sur-Marne-77, mâle immature, peut-être l'oiseau observé quelques jours plus tôt à Jablines, 15 au 19 janvier 2008 (F. BARTH, L. ALBESA, S. VINCENT).
- Trilbardou-77, mâle adulte, 16 février au 23 mars 2008 (P. PERSUY, S. CHAMBRIS).
- Jablines-77, mâle de 1^{er} hiver, 12 au 26 décembre 2010 (T. FERNEZ, P. GESTRAUD, S. WROZA *et al.*).
- Jablines-77, femelle, 24 décembre 2009 au 6 janvier 2010 (J. GOUELLO, M. SANNIER, L. ALBESA, S. VINCENT *et al.*).

Événement notable, il y a eu un petit afflux au début de l'année 2008, concernant uniquement la Seine-et-Marne dans notre région, avec un total de 6 ou 7 oiseaux.

Érismature rousse


Oxyura jamaicensis *

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, mâle adulte, 12 janvier au 4 mars 2007, puis 19 octobre 2007 au 29 février 2008, et 24 octobre au 1^{er} novembre 2008 (T. FOURNET).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, femelle, 1^{er} au 21 mai 2010 (D. GODREAU, F. YVERT, F. MALHER, S. WROZA *et al.*).
- Jablines-77, femelle, 6 au 10 novembre 2010 (R. PROVOST) ; mâle de 1^{er} hiver, 6 novembre 2010 au 6 février 2011 (R. PROVOST, J. BOTTINELLI, T. BITSCH, S. VINCENT *et al.*).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, mâle, 24 avril au 11 mai 2011 (C. BRILLAUD, S. WROZA *et al.*) ; mâle, 15 au 22 octobre 2011 (G. LESAFFRE, C. BRILLAUD *et al.*).
- Moisson-78, femelle de 1^{er} hiver, 4 décembre 2011 (P. J. DUBOIS).
- Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, 1 individu, 18 décembre 2011 (P. ROUSSET).

Plongeon imbrin

Gavia immer

- Vigneux-sur-Seine-91 / Fosse Montalbot, individu de 1^{er} hiver, 10 décembre 2006 au 10 février 2007 (Y. MASSIN, O. LAPORTE, D. LALOI *et al.*), et non jusqu'au 3 février 2007 comme précédemment publié (LALOI et le CHR, 2015).
- Marolles-sur-Seine-77, individu de 1^{er} hiver, 7 au 14 janvier 2007 (J. CRESPO, J.-P. SIBLET).
- Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 1^{er} décembre 2007 (J. CRESPO).



Harelde boréale © Olivier Laporte

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

- Jablines-77, individu de 1^{er} hiver, 4 décembre 2009 au 4 janvier 2010 (R. PROVOST, S. VINCENT, M. SANNIER *et al.*).

Avec un autre oiseau présent à Verneuil-sur-Seine-78 du 10 décembre 2006 au 7 janvier 2007 (voir le rapport 2006 du CHR ; LALOI et le CHR, 2015), l'hiver 2006-2007 totalise 3 oiseaux. L'espèce a été beaucoup moins observée au cours des années qui ont suivi.

Cormoran huppé

Phalacrocorax aristotelis

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 11 et 16 novembre 2007 (T. FOURNET).

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

- Torcy-77, 1 individu, 16 juin 2006 (F. BARTH).
- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 10 mai 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Brétigny-sur-Orge-91 / le Carouge, 1 individu, 10 juin 2008 (M. BITTER).
- Dugny-93 / étang des Brouillards, 1 individu, 5 juin 2010 (F. GASNOT).
- Luzancy-77, adulte, 15 au 25 août 2012 (G. PASSAVY, J. BOTTINELLI).

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

- Vignely-77, 1 individu, 18 mars 2007 (S. CHAMBRIS, S. VINCENT).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 31 mars au 2 avril 2008 (J.-P. MOULIN, M.-F. MOULIN *et al.*).
- Méry-sur-Marne-77 / les Charottes, adulte, 2 au 11 avril 2008 (J. BOTTINELLI).
- Gouvernes-77 / les Coutures, 1 individu, 4 avril 2008 (B. PIKETTY).
- Congis-sur-Thérrouanne-77, 2 individus, 24 avril 2008, 1 seul le 25 avril 2008 (AVEN du Grand-Voyeux *et al.*).
- Grigny-91, adulte nuptial, 1^{er} mai 2008 (G. NOCLE, P. POCHET).
- Orcemont-78, environ 20 adultes, 17 février 2009 (J.-C. FOGAROLI).
- Bruyères-le-Châtel-91 / le Trévoix, 1 individu, 8 mars 2009 (C. HARDEL).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 4 avril 2009 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET *et al.*).
- Grigny-91, adulte, 25 avril 2009 (G. NOCLE).
- Moisenay-77, 1 individu, 17 janvier 2010 (S. VINCENT).
- Paris-75 / pont Neuf, puis Ivry-sur-Seine-94 / pont Nelson Mandela, 1 individu en vol au-dessus de la Seine, 12 mai 2010 (X. JAPIOT *et al.*).
- Fontenay-le-Vicomte-91, 1 individu, 5 décembre 2010 (conseil général de l'Essonne).
- Moisenay-77, individu en vol, 11 décembre 2010 (S. VINCENT).

- Pontoise-95, 1 individu, 19 décembre 2010 (P. J. DUBOIS).
- Jaulnes-77 / Neuville, adulte, 19 janvier 2011 (J. CRESPO).
- Trilbardou-77, 1 individu, 7 mai 2011 (P. PERSUY).
- Bruyères-le-Châtel-91, 1 individu, 17 juillet 2011 (N. BARRE).
- Itteville-91, juvénile, 21 au 24 juillet 2011 (D. ATTINAULT).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 29 juillet 2011 (L. ALBESA) ; 1 individu, 15 au 29 octobre 2011 (L. ALBESA *et al.*) ; dans les deux cas, il s'agit très probablement d'individus ayant fait aussi partie du groupe qui a fréquenté Varennes-sur-Seine.
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 2 adultes, 13 août 2011 ; 6 individus, 14 août 2011 ; 7 individus, du 16 août au 23 septembre 2011 ; 3 adultes, 28 septembre 2011 ; 2 adultes, 1^{er} octobre 2011 ; 1 individu, 8 octobre 2011 (L. ALBESA, J. DAUBIGNARD, S. VINCENT, A. SAGETTE *et al.*).
- Saclay-91, 5 adultes, 8 et 9 septembre 2011 (S. VINCENT).
- Jouy-en-Josas-78 / Viltain, 1 individu, 6 novembre 2011 (C. HARDEL).
- Jaulnes-77 / Neuville, adulte, 30 mars au 1^{er} avril 2012 (P. ROUSSET, Y. MASSIN, S. VINCENT).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte nuptial, 29 avril 2012 (T. FOURNET).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, adulte, 30 avril 2012 (L. ALBESA).
- Barbey-77, 1 individu, 26 mai 2012 (T. GRUSON).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 28 mai 2012 (A. LAMEK), le même individu qu'à Ville-Saint-Jacques-77 le 30 mai et peut-être aussi qu'à Barbey le 26 mai.
- Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 30 mai 2012 (A. LAMEK), le même individu qu'à Varennes-sur-Seine le 28 mai et peut-être aussi qu'à Barbey le 26 mai.
- Épône-78 / le Bout du monde, 2 adultes nuptiaux, 9 juin 2012 (G. BAUDOUIN).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 4 août 2012 (G. LARREGLE, R. PANVERT, P. MIGUET) et 8 août 2012 (D. LALOI).
- Montreuil-sous-Bois-93, adulte en migration, 1^{er} septembre 2012 (P. ROUSSET).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 3 adultes, 2 septembre 2012 (S. VINCENT) ; 1 individu, 4 et 5 septembre 2012 (A. LAMEK, P. RIVALLIN, D. LALOI) ; 1 individu, 12 septembre 2012 (J. CRESPO) ; 3 individus, 16 septembre 2012 (S. VINCENT) ; 1 individu, 22 septembre 2012 (L. ALBESA).
- Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 9 septembre 2012 (D. GODREAU) et 16 septembre 2012 (S. VINCENT), vraisemblablement l'un des oiseaux observés à Varennes-sur-Seine à la même époque.
- Marolles-sur-Seine-77 / Carreau Franc, 2 individus, 12 septembre 2012 (S. VINCENT), vraisemblablement deux des oiseaux observés à Varennes-sur-Seine à la même époque.

Le Héron garde-bœufs n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Cigogne noire

Ciconia nigra

- Marolles-sur-Seine-77, individu en migration, 1^{er} avril 2007 (D. LALOI).
- Bazoches-lès-Bray-77, individu en migration, 20 avril 2007 (J. CRESPO).
- Sonchamp-78 / espace Rambouillet, individu en vol, 13 août 2007 (D. CHAGOT) ; individu en vol, 20 août 2007 (D. CHAGOT).

- Bonnelles-78 / les Clos, individu en migration, 14 août 2007 (J. CHEVALLIER) ; individu en migration, 28 août 2007 (J. CHEVALLIER).
- Orphin-78, 1 individu, 20 août 2007 (D. CHAGOT).
- Saint-Hubert-78, 2 juvéniles, 23 et 25 août 2007 (D. PICHON, J.J. BERTHOLOM *et al.*).
- Forêt de Rambouillet-78 / le Bocquet, 2 individus en vol, 2 septembre 2007 (C. LETOURNEAU).
- Bombon-77, adulte en vol, 12 mai 2008 (J. CRESPO).
- Fontenailles-77 / la Noyade, immature, 4 juin 2008 (J. CRESPO).
- Saint-Hubert-78, individu en vol, 6 septembre 2008 (P. CRANÇON, S. HOUPERT).
- Mennecey-91, 2 adultes en migration, 9 septembre 2008 (J. DAUBIGNARD *et al.*).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 23 septembre 2008 (AVEN du Grand-Voyeux).
- La Queue-lez-Yvelines-78, 2 individus en vol, 28 septembre 2008 (S. CHEVALLIER).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, adulte en vol, 5 mai 2009 (B. LEBRUN).
- Saint-Martin-en-Brière-77, individu en migration, 5 mai 2009 (S. VINCENT), peut-être le même individu qu'en plaine de Chanfroy.
- Forêt de Rambouillet-78, 1 individu, 21 mars 2010 (V. DELECOUR).
- Orsay-91, individu en migration, 12 juin 2010 (D. LALOI).
- Les Ulis-91, 1 individu, 25 juillet 2010 (L. SPRIET).
- Herblay-95, 5 individus en migration, 3 août 2010 (G. LOÏS).
- Saint-Hubert-78, 2 individus en vol, 5 août 2010 (J.-C. SULPICE).
- Chevreuse-78 / le Breuil, 3 juvéniles, 6 au 8 août 2010 (E. et C. DE GOURCUFF).
- Saint-Martin-la-Garenne-78, 1 individu, 8 août 2010 (L. BOITEUX).
- Soignolles-en-Brie-77, 2 individus, 19 août 2010 (J. CRESPO).
- Jaulnes-77 / Neuville, juvénile, 5 septembre 2010 (A. GIRARDEAU, J. GIRARDEAU).
- Dugny-93 / parc de la Courneuve, individu en migration, 9 octobre 2010 (O. LAPORTE, S. CHAMBRIS).
- Fontainebleau-77, 1 individu, 24 mars 2011 (B. DALLET).
- Luzancy-77, adulte, 24 mars 2011 (J. BOTTINELLI).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu en migration, 15 avril 2011 (L. ALBESA).
- Boucle de Moisson-78, individu en vol, 4 juin 2011 (F. DAVID).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, immature, 5 juillet 2011 (B. LEBRUN).
- Soignolles-en-Brie-77 / bois de Fou, 6 individus, 7 août 2011 (J. CRESPO).
- Isles-lès-Villenoy-77, 3 juvéniles en vol, 7 août 2011 (R. PROVOST).
- Brie-Comte-Robert-77, 4 individus, 17 août 2011 (B. et S. THOMIN).
- Ablis-78, 5 individus en migration, 20 août 2011 (C. LETOURNEAU).
- Eaubonne-95 et Ermont-95, juvénile, 27 au 30 août 2011 (B. MALLET, A. MAURIN).
- Berville-95, 1 individu, 19 septembre 2011 (G. TORRES).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 individus en vol, 19 septembre 2011 (P. DARDENNE).
- Paris-75 / XV^e arrondissement, individu en migration, 20 mars 2012 (Y. GESTRAUD).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus en migration, 21 mars 2012 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH).

- Champcueil-91 / les Grands Avaux, 2 individus en migration, 21 mars 2012 (O. THORET).
- Mouroux-77, 1 individu en migration, 29 avril 2012 (T. HERVÉ).
- Chenoise-77, individu de 2^e année en vol, 27 juin 2012 (J. BOTTINELLI).
- Bonnelles-78, adulte en vol, 28 juin 2012 (L. et A. PICARD).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu en vol, 21 juillet 2012 (D. THORNS).
- Congis-sur-Thérouanne-77, individu en vol, 23 juillet 2012 (R. HUCHIN).
- Soignolles-en-Brie-77, juvénile, 10 août 2012 (J. CRESPO) ; 4 individus en vol, 23 août 2012 (J. CRESPO).
- Chauconin-Neufmontiers-77, individu en vol, 15 août 2012 (A. LAMEK).
- Montreuil-sous-Bois-93, individu en migration, 23 août 2012 (P. ROUSSET).
- Chaumes-en-Brie-77, individu en vol, 1^{er} septembre 2012 (O. PATRIMONIO).
- Montigny-sur-Loing-77 / Sorques, individu en vol, 1^{er} septembre 2012 (S. DETANTE-BRISON).
- Fresnes-sur-Marne-77, 1 individu, 6 septembre 2012 (P. RIVALLIN).
- Congis-sur-Thérouanne-77, 1 individu, 13 septembre 2012 (R. HUCHIN).
- Évry-Grégy-sur-Yerres-77, juvénile, 16 septembre 2012 (S. THOMIN).
- Ozouer-le-Voulgis-77, adulte en vol, 16 septembre 2012 (O. PATRIMONIO).

L'augmentation du nombre d'observations (auquel il manque quelques données n'ayant pas pu être examinées en raison d'un manque d'information) traduit bien le changement de statut réel de cette espèce. La Cigogne noire n'est plus soumise à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus

- Jaulnes-77 / Neuville, adulte nuptial, 6 mai 2007 (J. CRESPO, N. FIXARY).
- Lieusaint-77, 1 individu, 27 novembre 2011 (R. PROVOST).
- Marais d'Épisy-77, adulte, 6 et 7 avril 2012 (S. PLANCKE, P. RIVALLIN, S. MALLARD) ; cet oiseau avait été bagué au nid le 11 juin 2008 à la réserve naturelle régionale du Scamandre dans le Gard.
- Varennes-sur-Seine-77 / marais du Colombier, 1 individu, 7 mai 2012 (S. VINCENT, G. LARRÈGLE, A. LAMEK, J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN *et al.*).

Élanion blanc

Elanus caeruleus *

- Verneuil-sur-Seine-78, adulte, 20 avril 2008 (J.-M. FENEROLE).
- Bonnelles-78, adulte, 21 avril 2008 (J. CHEVALLIER).
- Varennes-sur-Seine-77, adulte, 19 mai 2009 (L. ALBESA).

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla

- Gazeran-78 / le Gâteau, immature, 29 novembre 2009 au 8 janvier 2010 (Y. DE CHAISEMARTIN, A. VANSON).
- Échouboulains-77, 1 individu, 25 au 29 novembre 2010 (ALBESA, 2010).

Vautour fauve

Gyps fulvus

- Gambaiseuil-78, 7 individus en vol, 30 mai 2011 (A. BENOIT).
- Mouroux-77, adulte en vol, 8 juin 2011 (T. HERVÉ).

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

Deuxième et troisième mentions franciliennes ; la première remontait à août 1870 et concernait vraisemblablement un échappé de captivité. Ces deux données, à quelques jours d'intervalle, cadrent bien avec les apparitions de plus en plus fréquentes de l'espèce au nord de son aire de répartition.

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 2 individus, 22 avril au 15 juillet 2007 (S. HOUPERT). Il y a peut-être eu tentative de reproduction, mais aucun jeune n'a été observé.
- Moisson-78, 1 à 2 individus, 8 mai au 29 juillet 2007 (G. JARDIN *et al.*).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 3 individus, 30 mars à l'été 2008 (S. BARBERIS, D. UNKELBACH). Un couple s'est reproduit avec succès, produisant 1 jeune.
- Moisson-78 et Guernes-78, 1 à 4 individus, 14 juin au 14 septembre 2008 (G. JARDIN *et al.*). L'espèce a vraisemblablement tenté de nicher, mais aucun jeune potentiellement né sur place n'a été observé.
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 à 2 individus, 28 mars (S. VINCENT) au 15 juin 2009 au moins. Un couple a tenté de se reproduire.
- Moisson-78, 1 à 2 individus, printemps au 30 août 2009 (Groupe local V.B.S.). Comme l'année précédente, un couple a probablement tenté de s'installer, sans autre preuve de nidification.
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, reproduction d'un couple en 2010, produisant 1 jeune (O. CLAESSENS, L. ALBESA *et al.*), dernière observation du jeune le 29 septembre 2010.
- Milly-la-Forêt-91 / le Coquibus, adulte, 20 juin 2010 (S. BARBERIS).
- Moisson-78, immature, 4 juillet 2010 (O. PAÏKINE) ; adulte, 24 juillet 2010 (F. DAVID).
- Montreuil-sous-Bois-93, 1 individu en migration, 7 octobre 2010 (P. ROUSSET).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, au moins 1 adulte, 2 avril (V. PONELLE) au 7 juillet 2011 (O. CLAESSENS, L. ALBESA *et al.*). Bien que le nid qui avait vu l'envol d'un jeune en 2010 ait été fréquenté, il semble qu'il n'y ait pas eu reproduction en 2011.
- Luzancy-77, individu en migration, 5 mai 2011 (S. TARDY).
- Croissy-Beaubourg-77, 1 individu, 25 juin 2011 (J.-P. DELAPRE).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 adulte, 7 juin au 18 juillet 2012 (J. DAUBIGNARD, Y. MASSIN, L. ALBESA, D. THORNS, P. ROUSSET *et al.*).
- Moisson-78, adulte, 1^{er} juillet au 9 août 2012 (C. GLORIA, R. JUGIEUX, P. J. DUBOIS *et al.*).
- Guernes-78, 1 individu, 4 août 2012 (G. BAUDOUIN), peut-être le même individu qu'à Moisson.

Le Circaète Jean-le-Blanc n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Busard pâle

Circus macrourus *

- Villiers-le-Bâcle-91 / plateau de Saclay, juvénile, 17 août 2007 (D. LALOI).
- Villiers-le-Bâcle-91 / plateau de Saclay, mâle adulte, 23 mars 2008 (D. LALOI).
- Chauconin-Neufmontiers-77, juvénile, 11 au 18 septembre 2011 (R. PROVOST, D. THORNS *et al.*).
- Mespuits-91 / les Arpents blancs et les Boucheteaux, mâle de 3^e année, 27 septembre au 5 octobre 2011 (J. DAUBIGNARD, L. ALBESA *et al.*).

Il n'y avait qu'une seule donnée antérieure en Île-de-France, à Saclay le 25 mars 1981 (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013). Ces quatre nouvelles mentions franciliennes entrent bien dans le cadre de l'augmentation des observations en France. Cette augmentation, sans doute liée pour une part au développement de l'ornithologie de terrain et pour une autre part à l'extension de l'aire de répartition de l'espèce vers le nord et l'ouest de la Russie, s'est amorcée au début des années 2000 et s'est amplifiée à partir de 2006 et 2007 (DUBOIS *et al.*, 2008). Dans les années qui ont suivi, 22 Busards pâles ont été notés en France en 2008, 20 en 2009, 17 en 2010, 19 en 2011 et au moins 32 en 2012 (REEBER et le CHN, 2010, 2011, 2012 ; KAYSER, PAEPEGAËY et le CHN, 2014).



Busard pâle © Julien Daubignard

Autour des palombes

Accipiter gentilis

- Bonnelles-78, immature probablement femelle, 19 décembre 2006 (J. CHEVALLIER).
- Vert-le-Grand-91, femelle adulte, 7 janvier 2007 (D. LALOI).
- Bonnelles-78 / les Clos, immature, 29 janvier au 8 février 2007 (J. CHEVALLIER) ; 1 individu, 27 octobre 2007 (J. CHEVALLIER) ; mâle immature, 23 novembre 2007 (J. CHEVALLIER).
- Rochefort-en-Yvelines-78, femelle, 4 mars 2007 (B. DALLET).
- Saclay-91, mâle, 11 mars 2007 (D. LALOI, E. FENART, P. LE MARÉCHAL).
- Clairefontaine-en-Yvelines-78 / Paincourt, femelle, 17 mars et 13 mai 2007 (J.C. SULPICE).
- Saint-Rémy-lès-Chevreuse-78 / Rhodon, 2 mâles et 1 femelle, 23 septembre 2007 (P. DARDENNE).

- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, mâle de 2^e année, 14, 18 et 21 octobre 2007 (D. LALOI, B. DALLET, P. et S. DARDENNE, S. VINCENT, E. FENART).
- Saclay-91, mâle probable, 24 novembre 2007 (D. LALOI).
- Montigny-sur-Loing-77 / Sorques, femelle juvénile, 25 novembre 2007 (J. CRESPO).
- Bonnelles-78, 1 individu, 6 janvier 2008 (J. CHEVALLIER).
- Paris-75 / VII^e arrondissement, juvénile, récupéré après s'être cogné contre une baie vitrée et amené au centre de soins de Maison-Alfort, 9 janvier 2008 (*fade* G. CHAMBERT-LOIR).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 15 et 29 février 2008 (T. FOURNET).
- Forêt de Rambouillet-78, signalé sur 4 sites du massif mars à juillet 2008 (J. CHEVALLIER, B. DALLET, C. LETOURNEAU, J. ROCHEFORT), avec parades et défense de territoire sur deux d'entre eux, et 2 juvéniles sur l'un des sites le 6 juillet.
- Bonnelles-78 / Les Clos, 1 individu, 29 septembre au 10 octobre 2008 (J. CHEVALLIER).
- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, femelle, 4 novembre 2008 (B. DALLET).
- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 9 janvier 2009 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 3 sites du massif, mars à juillet 2009 (B. DALLET, C. LETOURNEAU, F. ARNABOLDI, A. PERTHUIS *et al.*), avec nidification confirmée sur l'un d'entre eux le 3 juillet.
- Vaux-sur-Seine-78, 1 individu, 6 août 2009 (G. JARDIN *et al.*).
- Saclay-91, juvénile, 15 septembre 2009 (L. SPRIET).
- Jaulnes-77 / Neuvery, 1 individu, 26 septembre 2009 (S. VINCENT).
- Chevreuse-78 / Talou, femelle, 23 février 2010 (J.C. SULPICE).
- Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 2 sites du massif, mars à avril 2010 (B. DALLET, G. PATEK *et al.*).
- Forêt de Fontainebleau-77, nidification confirmée d'un couple qui a produit 2 jeunes à l'envol, 2 août 2010 (L. ALBESA, O. CLAESSENS).
- Forêt de Rambouillet-78, signalé sur au moins 1 site de nidification des années précédentes, mars 2011 (B. DALLET *et al.*) ; le plus petit nombre de données résulte d'une prospection plus faible.
- Forêt de Fontainebleau-77, nidification confirmée d'un couple qui a produit 2 jeunes à l'envol, printemps-été 2011 (O. CLAESSENS, L. ALBESA), sur le même site que l'année précédente.
- Bassée-77, nidification confirmée d'un couple qui a produit 2 jeunes à l'envol, printemps-été 2011 (O. CLAESSENS, L. ALBESA), après un échec en 2010 attribué au dérangement par des travaux forestiers, et un échec en 2009 attribué à l'immaturité du couple.
- Environs de Nemours-77, nidification confirmée d'un couple qui a produit 2 jeunes à l'envol, printemps-été 2011 (L. ALBESA).
- Boucle de Moisson-78, couple cantonné nicheur possible, printemps-été 2011 (G. BAUDOIN).
- Paris-75 / parc de Bagatelle, 1 individu probablement femelle, 13 novembre 2011 (G. LESAFFRE).
- Forêt de Rambouillet-78 / bois de l'Épars, mâle probable, 19 novembre 2011 (B. DALLET).

Le nombre d'observations a lentement mais sensiblement augmenté depuis le début des années 2000, soit parce que l'espèce est réellement en augmentation dans la région, soit parce qu'elle est mieux détectée et signalée par les observateurs. Malgré l'intérêt du suivi des données d'Autour des palombes,

son statut ne justifie plus une soumission au CHR : l'Autour des palombes n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2012.

Buse variable

présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Buteo buteo vulpinus*, appelée **Buse des steppes** ou **Buse de Russie** *

- Gometz-le-Châtel-91, 2 individus en migration, 5 septembre 2009 (D. LALOI, B. DALLET).

La date de cette première mention francilienne est particulièrement précoce (REEBER et le CHN, 2010), mais, comme pour d'autres espèces, les observations en des lieux atypiques sont parfois à des dates atypiques elles-aussi. En outre, le statut de cette sous-espèce en France est sans doute mal connu compte-tenu des difficultés d'identification sur le terrain (DUBOIS *et al.*, 2008).

Buse pattue

Buteo lagopus *

- Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche, individu de 1^{er} hiver, 13 janvier au 16 mars 2008 (J. CRESPO, S. BARBERIS *et al.*).
- Thiverval-Grignon-78 / Chantepie, individu de 1^{er} hiver, 5 décembre 2010 (Y. CARASCO, A. POIREL *et al.*).
- Jouarre-77 / la Fringale, individu de 1^{re} année, 9 décembre 2010 (J. BOTTINELLI).
- Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche et Réau-77, individu de 1^{er} hiver, 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011 (F. LEGENDRE, JP. et M. DELAPRE, J. CRESPO *et al.*).
- Mouroux-77 / Boussois, individu de 2^e année, 2 au 8 janvier 2011 (J. BOTTINELLI *et al.*).
- Jouarre-77 / le Petit Courroy, individu de 2^e année, 4 janvier 2011 (J. BOTTINELLI).
- Sonchamp-78, mâle de 3^e année, 1^{er} janvier au 10 février 2012 (L. CHEVALLIER *et al.*).
- Jablines-77, immature, 21 février 2012 (J. BOTTINELLI).

Les observations de l'hiver 2010-2011 entrent dans le cadre d'un afflux sans précédent en France (REEBER et le CHN, 2011, 2012).

Aigle criard

Aquila clanga *

- Mortery-77 (48,5976° N, 3,22917° E), individu de 3^e année, 10 octobre 2010 à 14 h 00.

Il s'agit de l'Aigle criard dénommé Tönn, né au printemps 2008 en Estonie et équipé d'une balise. Il traverse régulièrement la France depuis cette date, pour aller hiverner dans le sud-est de l'Espagne. Il passe d'ordinaire, à l'automne comme au printemps, sur des voies plus orientales et ne survole pas l'Île-de-France, mais il a survolé la Seine-et-Marne le 10 octobre 2010, quand il a été géolocalisé à Mortery (REEBER et le CHN, 2011). Il s'agit de la première mention francilienne de cette espèce.

Aigle botté

Aquila pennata

- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, individu de forme claire, 25 mars 2006 (S. VINCENT).
- Menecy-91 / marais de Fontenay, individu de forme sombre, 12 et 16 juillet 2007 (J. DAUBIGNARD).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 2 individus de forme claire, 6 juillet 2008 (Y. MASSIN).
- Fontenay-le-Vicomte-91, individu de forme claire, 2 août 2008 (Y. MASSIN).

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

- Coulommiers-77, individu de forme claire, 15 septembre 2008 (J. BOTTINELLI).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 2 individus (couple probable), 31 mars 2009 (L. ALBESA).
- Forêt de Rambouillet-78 / Pecqueuse, 1 individu, 1^{er} mai 2009 (A. BLASCO, C. LETOURNEAU) ; individu de forme claire, probablement le même que le 1^{er} mai, 14 juin 2009 (C. LETOURNEAU).
- Saint-Hubert-78, individu de forme claire, 9 mai 2009 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH, L. ALBESA), probablement le même qu'à Pecqueuse et Clairefontaine-en-Yvelines.
- Clairefontaine-en-Yvelines-78, individu de forme claire, 27 mai 2009 (G. PATEK), probablement le même qu'à Pecqueuse et Saint-Hubert.
- Mennecy-91 / marais de Fontenay, individu de forme sombre, 2 juin 2009 (J. DAUBIGNARD).
- Moisson-78, individu de forme claire, 4 et 18 juin 2009 (G. BAUDOIN, B. LELAURE, A. LEBOSSE).
- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, individu de forme sombre, en migration, 5 septembre 2009 (B. DALLEY, D. LALOI).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, adulte de forme claire, 5 avril 2010 (M. NARCY) ; individu de forme sombre, 17 avril 2010 (Y. MASSIN, L. ALBESA, B. ROGEZ, V. CARON).
- Saint-Martin-la-Garenne-78 / le Pré d'Auber, individu de forme claire, 19 juin 2010 (G. BAUDOIN).
- Asnières-sur-Oise-95, individu de forme sombre, 2 juillet 2010 (J.-C. BEAUCOUR).
- Lissy-77, individu de forme claire, 18 juillet 2010 (F. LEGENDRE).
- Réau-77, individu de forme claire, 25 juillet 2010 (J. CRESPO), peut-être le même individu qu'à Lissy quelques jours plus tôt.
- Montereau-sur-le-Jard-77 / aérodrome de Melun-Villaroche, individu de forme claire, 27 juillet 2010 (J. CRESPO), peut-être le même individu qu'à Lissy et Réau quelques jours plus tôt.
- Lissy-77, adulte de forme sombre, 1^{er} août 2010 (J. CRESPO).
- Réau-77, individu de forme sombre, 23 mai 2011 (J. CRESPO).
- Varennes-sur-Seine-77, individu de forme sombre, 7 mai 2012 (S. VINCENT, J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN, J. BIRARD, L. ALBESA).
- Roinvilliers-91 / Ézerville, individu de forme claire probablement adulte, 25 juin 2012 (F. THOUIN, J.F. FABRE, B. DI LAURO) ; adulte de forme claire, 7 septembre 2012 (M.-M. SÉNÉCHAL, P. MULOT).
- Fontenay-le-Vicomte-91 / étang aux Pointes, individu de forme claire, 29 juillet 2012 (B. QUEVAL).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, adulte de forme claire, 8 août 2012 (D. LALOI).

Marouette ponctuée

Porzana porzana

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, juvénile, 28 août au 20

septembre 2008 (T. FOURNET, D. LALOI) ; adulte, 6 au 13 septembre 2008 (D. LALOI, S. VINCENT, S. BARBERIS *et al.*).

- Vignely-77, adulte, 4 août 2009 (S. CHAMBRIS, S. VINCENT).
- Itteville-91, 1 individu, 7 au 10 octobre 2009 (O. THORET).
- Trilbardou-77, adulte probable, 18 octobre 2009 (P. PERSUY).
- Jaulnes-77 / Neuville, juvénile, 21 au 24 août 2010 (S. VINCENT, E. PERRET) ; adulte, 4 septembre 2010 (S. VINCENT).
- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 1^{er} avril 2011 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Merisier, 1 individu, 11 mai 2011 (J. CRESPO).
- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 7 septembre 2011 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
- Itteville-91, adulte, 2 au 31 octobre 2011 (G. RENOU, D. ATTINAULT, B. LEBRUN, D. LALOI, L. ALBESA *et al.*), avec un second adulte le 7 octobre 2011 (J. DAUBIGNARD), et un second individu, le 26 octobre 2011 (D. ATTINAULT), peut-être le même que le 7 octobre.
- Neuilly-sur-Marne-93 / la Haute-Île, 1 individu, 20 mars 2012 (W. HUIN) ; adulte, 1^{er} avril 2012 (O. SIGAUD), probablement le même individu que le 20 mars.
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, individu probablement adulte, 26 août 2012 (D. ATTINAULT).
- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, juvénile, 31 août 2012 (J. BOTTINELLI) ; 2 adultes, 4 septembre 2012 (J. BOTTINELLI) ; adulte, 17 septembre 2012 (J. BOTTINELLI).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 22 septembre 2012 (F. DUCORDEAU *et al.*).
- Grigny-91, individu probablement juvénile, 23 septembre au 15 octobre 2012 (P. POCHET, P. MULOT, M.-M. SÉNÉCHAL *et al.*).

La Marouette ponctuée n'est plus soumise à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Guignard d'Eurasie (Pluvier guignard)

Charadrius morinellus

- Bazoches-lès-Bray-77, juvénile, 12 octobre 2008 (J. CRESPO, J. SAVRY, G. FOY).

Vanneau sociable

Vanellus gregarius *

- Balloy-77, 1 individu, 11 octobre 2008 (B. BOUGEARD).
- Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 2 octobre 2010 (J. MARGAS, J. CRESPO).
- Gaillon-sur-Montcient-78, juvénile, 17 et 18 octobre 2011 (J.-M. FENEROLE *et al.*).
- Frémainville-95, juvénile, 19 octobre 2011 (photo sur www.ornitho.fr) même individu que celui vu précédemment à Gaillon-sur-Montcient.

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 4 individus, 10 mai 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Toussus-le-Noble-78, adulte nuptial, 10 mai 2007 (S. VINCENT).
- Saclay-91, adulte nuptial 11 mai 2007 (S. VINCENT), le même que la veille à Toussus-le-Noble.
- Méry-sur-Marne-77, adulte nuptial, 11 et 12 mai 2007 (J. BOTTINELLI).

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte nuptial, 11 au 19 mai 2007 (T. FOURNET *et al.*).
 - Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, juvénile, 11 au 25 septembre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux) ; juvénile, 8 octobre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
 - Vignely-77, juvénile, 15 septembre 2007 (S. VINCENT).
 - Grigny-91, 1 individu, 3 septembre 2008 (T. AURISSERGUES).
 - Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 4 adultes nuptiaux, 9 mai 2009 (L. ALBESA).
 - Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, immature, 17 septembre 2009 (J. BOTTINELLI).
 - Saclay-91, adulte nuptial, 2 au 10 mai 2010 (P. LE MARÉCHAL *et al.*).
 - Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 13 août 2011 (D. GODREAU).
- Le Bécasseau maubèche n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Bécasseau de Temminck

Calidris temminckii

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 20 août 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
 - Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, 1 individu, 13 au 23 septembre 2007 (L. ALBESA, M. ZUCCA, S. VINCENT *et al.*).
 - Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, juvénile, 15 août à début septembre 2008 (D. LALOI, S. VINCENT).
 - Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 1 individu, 7 mai 2009 (J. BOTTINELLI).
 - Villiers-sur-Seine-77 / les Thurets, 1 individu, 20 avril 2010 (J. HANOL).
 - Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 2 individus, 9 mai 2010 (L. ALBESA, J. BOTTINELLI).
 - Le Plessis-Picard-77 / Ourdy, 2 individus, 12 mai 2010, puis 3 individus, 13 et 14 mai 2010, encore 2 individus, 15 mai 2010 (J. CRESPO, E. PERRET) ; 1 individu, probablement nouveau, 19 mai 2010 (J. CRESPO).
 - Grigny-91 / l'Arbalète, adulte, 12 au 15 mai 2010 (O. PATRIMONIO, R. PROVOST, D. LALOI *et al.*).
 - Savigny-le-Temple-77, 1 individu, 15 mai 2010 (R. PROVOST).
 - Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, juvénile, 21 août 2010, puis 2 juvéniles, 3 septembre 2010, encore 1 juvénile, 4 septembre 2010 (S. VINCENT).
 - Grigny-91 / l'Arbalète, 1 individu, 1^{er} au 3 mai 2011 (M.-M. SÉNÉCHAL, R. PROVOST).
 - Luzancy-77, 1 individu, 6 mai 2011 (J. BOTTINELLI).
 - Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 1 individu, 7 au 12 mai 2011 (L. ALBESA, D. GODREAU, J. CRESPO, S. VINCENT *et al.*).
 - Lesches-77, 1 individu, 13 et 14 mai 2011 (O. LAPORTE, F. YVERT *et al.*).
 - Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, 1 individu, 2 et 3 mai 2012 (P. RIVALLIN, T. JOURDAIN, L. ALBESA) ; 1 individu, 14 mai 2012 (B. LEBRUN).
 - Lissy-77, adulte, 12 mai 2012 (S. VINCENT, J. CRESPO).
- Notons en particulier un passage plus important que d'ordinaire au printemps 2010, totalisant au moins 9 individus entre le 20 avril et le 19 mai 2010.

Bécasseau sanderling

Calidris alba

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 2 individus, 9 mai 2007 (AVEN du Grand-Voyeux, J. BOTTINELLI).
- Luzancy-77, 1 individu, 11 mai 2007 (J. BOTTINELLI).

- Jaulnes-77 / Neuvry, 1 individu, 13 mai 2007 (J. BOTTINELLI).
- Grigny-91, 1 individu, 17 mai 2007 (P. POCHET).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 25 septembre 2008 (C. HARDEL).
- Barbey-77 / les Préaux, 1 individu, 31 décembre 2008 (F. LEGENDRE).
- Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 1 individu, 7 au 11 mai 2009 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Colombier, 3 individus, 8 mai 2009 (O. LAPORTE).
- Luzancy-77, 1 individu, 2 au 8 mai 2010 (J. BOTTINELLI) ; 4 individus, 26 mai 2010 (J. BOTTINELLI).
- Jablines-77, 1 individu, 9 mai 2010 (S. VINCENT).
- Barbey-77, juvénile, 11 septembre 2010 (S. VINCENT).
- Changis-sur-Marne-77, 1 individu, 13 mai 2011 (J. BOTTINELLI).
- Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 3 individus, 15 mai 2011 (J. BOTTINELLI, S. TARDY).
- Épône-78 / le Bout du monde, 5 individus, 31 mars 2012 (S. VINCENT).
- Marolles-sur-Seine-77, adulte, 28 au 30 avril 2012 (J. CRESPO, G. PASSAVY, S. HOUPERT, L. ALBESA).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 4 et 5 mai 2012 (T. FOURNET, S. VINCENT *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77 / Le Grand Marais, 1 individu, 4 au 7 mai 2012 (B. LEBRUN, S. VINCENT *et al.*).
- Luzancy-77 / le Pré des Bateaux, 3 individus, 6 mai 2012 (S. TARDY).
- Bazoches-lès-Bray-77, 1 individu, 9 mai 2012 (J. CRESPO).
- Luzancy-77, juvénile, 11 au 15 septembre 2012 (J. BOTTINELLI *et al.*).

On notera l'observation de fin décembre 2008 qui constitue la première mention hivernale francilienne. Les autres données entrent bien dans le cadre classique du passage de l'espèce dans la région. Le Bécasseau sanderling n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2013.

Bécasseau de Baird

Calidris bairdii *

- Congis-sur-Thérrouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 11 et 12 mai 2009 (T. ROY).

Il s'agit de la première mention francilienne (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013), d'autant plus remarquable que l'espèce est surtout notée en France lors du passage postnuptial, de fin juillet à mi-octobre (DUBOIS *et al.*, 2008).

Bécasseau de Bonaparte

Calidris fuscicollis *

- Luzancy-77, 1 individu, 17 octobre 2012 (J. BOTTINELLI).

Il s'agit de la deuxième mention francilienne, la précédente avait été obtenue également dans le nord de la Seine-et-Marne, le 13 août 2005 à Fresnes-sur-Marne (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013).

Bécasseau tacheté

Calidris melanotos

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, juvénile, 5 au 10 septembre 2008 (T. FOURNET *et al.*).
- Marolles-sur-Seine-77, 1 individu, 29 avril 2009 (J. CRESPO).
- Nangis-77, juvénile, 30 septembre 2012 (J. CRESPO *et al.*).

Septième, huitième et neuvième mentions franciliennes, l'observation à Marolles-sur-Seine étant aussi la première mention au passage prénuptial (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013).

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

Phalarope de Wilson

Phalaropus tricolor *

- Jaulnes-77 / Neuvry, individu de 1^{er} hiver, 28 au 30 août 2009 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET, S. SIBLET, J.-M. GUILPAIN).
- Marolles-sur-Seine-77, le même que les jours précédents à Neuvry, 30 et 31 août 2009 (A. GIRARDEAU, J.-P. DELAPRE, F. BOUZENDORF *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77, le même que les jours précédents à Neuvry et Marolles-sur-Seine, 1^{er} et 2 septembre 2009 (D. LALOI, L. SPANNEUT).

Encore une première mention francilienne (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013). C'est aussi une première à l'intérieur des terres en France, mais à une date qui est par contre tout à fait typique du passage de l'espèce (DUBOIS *et al.*, 2008 ; REEBER *et al.*, 2010).

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

- Villiers-le-Bâcle-91 / Fonds d'Orsigny, adulte probablement femelle, 14 au 17 août 2007 (D. BOUCHET, D. LALOI, S. VINCENT, O. THORET *et al.*).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 juvéniles, 1^{er} au 7 septembre 2008 (T. FOURNET *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77, juvénile, 18 au 20 août 2010 (A. et J. GIRARDEAU, L. ALBESA).

Phalarope à bec large

Phalaropus fulicarius

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte probablement femelle, 12 mai 2007 (T. FOURNET, D. LALOI, P. J. DUBOIS *et al.*).
- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais, adulte probable, 25 et 26 novembre 2008 (N. FLAMANT, E. PERRET).
- Trilbardou-77, adulte, 15 novembre 2009 (P. PERSUY).
- Bazoches-lès-Bray-77, adulte, 2 mars 2010 (L. ALBESA, A. et J. GIRARDEAU).

Chevalier grivelé

Actitis macularia *

- Grigny-91, 1 individu, 16 au 18 mai 2011 (C. FRAIGNEAU, J. SANNIER, P. POCHET *et al.*).

Première mention francilienne (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013), remarquable autant par la date que par l'observation à l'intérieur des terres, l'espèce étant surtout notée en France lors du passage postnuptial et sur le littoral Manche-Atlantique (DUBOIS *et al.*, 2008).

Chevalier stagnatille

Tringa stagnatilis

- Varennes-sur-Seine-77 / le Grand Marais et Beauchamp, adulte, 6 au 12 avril 2008 (S. VINCENT, M. ZUCCA, D. LALOI).
- Ville-Saint-Jacques-77, 1 individu, 7 mai 2012 (S. VINCENT, J. BOTTINELLI, P. RIVALLIN).

Bécassine double

Gallinago media *

- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, 1 individu, 4 au 9 mai 2007 (T. ROY – AVEN du Grand-Voyeux).

Le CHN n'a homologué que la date de la découverte, le 4 mai, mais cet oiseau est bien resté jusqu'au 9 mai. Mis à part quelques captures au XIX^e siècle en Seine-et-Marne, il s'agit de la cinquième mention (pour 6 oiseaux) en Île-de-France depuis 1962, la précédente remontant à 1985 (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013). C'est aussi la première donnée régionale au passage prénuptial, classiquement moins marqué que le passage automnal en France (DUBOIS *et al.*, 2008).

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

- Évry-91, individu de 1^{er} hiver, 12 novembre 2007 (E. GONZALEZ, C. SONRIER), probablement le même qu'à Trilbardou et Congis-sur-Thérouanne.
- Congis-sur-Thérouanne-77, individu de 1^{er} hiver, 14 novembre 2007 (AVEN du Grand-Voyeux), probablement le même qu'à Evry et Trilbardou.
- Trilbardou-91, individu de 1^{er} hiver, 18 novembre 2007 (S. CHAMBRIS, P. PERSUY), probablement le même qu'à Evry et Congis-sur-Thérouanne.

Malgré des descriptions incomplètes, plusieurs éléments indiquent que c'est probablement le même individu qui a été vu à Evry puis à Congis-sur-Thérouanne et à Trilbardou en six jours de temps.

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 11 au 15 mai 2010 (J. GOUELLO, O. THORET, O. LAPORTE, Y. MASSIN *et al.*).

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

- Congis-sur-Thérouanne-77 / le Grand-Voyeux, adulte, 20 avril 2007 (AVEN du Grand-Voyeux).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 29 août 2008 (T. FOURNET).
- Jablines-77, 2 adultes, 17 avril 2010 (P. RIVALLIN, S. CHAMBRIS, C. HOUEIX).



Chevalier grivelé © Chloé Fraigneau

- Varennes-sur-Seine-77, adulte et juvénile, 5 septembre 2010 (A. et J. GIRARDEAU).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 individus, 15 septembre 2011 (P. DARDENNE).

Guifette leucoptère

Chlidonias leucopterus

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 4 juin 2008 (T. FOURNET) ; juvénile, 27 au 29 août 2008 (T. FOURNET, S. VINCENT) ; adulte, 3 au 10 septembre 2008 (T. FOURNET *et al.*).
- Luzancy-77, juvénile, 4 septembre 2008 (J. BOTTINELLI).
- Grigny-91, 4 adultes, 5 mai 2009 (G. NOCLE).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 2 au 13 mai 2010 (C. BRILLAUD, S. VINCENT, O. THORET *et al.*).
- Grigny-91, 1 individu, 24 au 29 avril 2011 (O. LAPORTE, O. PAIKINE, M.-M. SÉNÉCHAL).
- Varennes-sur-Seine-77, 1 individu, 18 septembre 2011 (J. BIRARD, P. RIVALLIN, R. PROVOST).

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 2 adultes, 11 mai 2007 (T. FOURNET).
- Cachan-94 / le Coteau, adulte, en vol vers le nord-est, 19 mai 2009 (S. BARBERIS).

Mouette de Sabine

Xema sabini

- Saclay-91, individu probablement de 2^e été, 29 août 2008 (S. VINCENT, D. LALOI).

L'espèce n'avait pas été revue en Île-de-France depuis la première mention régionale en 1856.

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 12 janvier 2007 (T. FOURNET).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, adulte, 23 au 26 janvier 2009 (B. FROELICH, O. THORET).
- Luzancy-77, individu de 1^{er} hiver, 5 février 2009 (J. BOTTINELLI).
- Marolles-sur-Seine-77, adulte, 4 septembre 2009 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET).

Goéland à ailes blanches

Larus glaucoideus *

- Vaires-sur-Marne-77, individu de 1^{er} hiver, 11 janvier 2009 (F. YVERT, S. CHAMBRIS, B. ROGEZ) ; individu de 1^{er} hiver, 27 février 2009 (J. GOUELLO).
- Congis-sur-Thérrouanne-77, individu de 2^e hiver, 28 janvier au 21 mars 2012 (M. ZUCCA *et al.*).
- Vaires-sur-Marne-77, adulte ou subadulte, 11 février au 11 mars 2012 (M. ZUCCA *et al.*).

Goéland bourgmestre

Larus hyperboreus

- Charny-77, individu de 2^e hiver, 23 février 2007 (S. CHAMBRIS).
- Vaires-sur-Marne-77, 2 individus de 1^{er} hiver, 4 janvier, puis 1 seul individu jusqu'au 12 février 2008 (M. ZUCCA, E. GFELLER, Y. DUBOIS *et al.*).
- Charny-77, individu de 1^{er} hiver, 2 février 2008

(S. CHAMBRIS, Y. DUBOIS), probablement le même oiseau qu'à Vaires-sur-Marne.

- Précly-sur-Marne-77, individu de 2^e hiver, 30 décembre 2008 (F. YVERT, B. ROGEZ).
- Vaires-sur-Marne-77, individu de 2^e hiver, 31 décembre 2008 au 15 février 2009 (S. VINCENT, S. CHAMBRIS *et al.*), le même qu'à Précly-sur-Marne.
- Fresnes-sur-Marne-77, individu de 2^e hiver, 2 janvier 2009 (F. BOUZENDORF, E. GOUSSET), le même qu'à Précly-sur-Marne et Vaires-sur-Marne.
- Messy-77, individu de 2^e hiver, 4 janvier 2009 (J. BOTTINELLI).
- Vaires-sur-Marne-77, 2 individus de 1^{er} hiver, 19 et 24 février 2009 (M. ZUCCA, B. SEGERER).
- Vaires-sur-Marne-77, individu de 1^{er} hiver, 8 et 9 janvier 2011 (P. RIVALLIN, S. CHAMBRIS, K. SCHMALE).

Goéland marin

Larus marinus

- Moisson-78, adulte, 6 janvier 2008 (P. J. DUBOIS).
- Moisson-78 et Saint-Martin-la-Garenne-78, adulte, 18 janvier 2009 (groupe Val de Basse Seine).
- Freneuse-78, adulte, 8 février 2009 (groupe Val de Basse Seine).
- Guernes-78 / Flicourt, 4 adultes, 20 février 2009 (groupe Val de Basse Seine).
- Verneuil-sur-Seine-78, 2 adultes, 14 février 2010 (L. BOITEUX, E. GROSSO, G. JARDIN, S. BOUCHER, J.-M. GIBIARD, J.-M. REMAUD).
- Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l'Ilon, adulte et individu de 1^{er} hiver, 23 janvier 2011 (G. BAUDOIN).
- Mantes-la-Ville-78 / pont de la Mare, adulte, 21 avril 2012 (G. BAUDOIN).

Martinet pâle

Apus pallidus

- Gometz-le-Châtel-91, 1 individu, 29 octobre 2011 (D. LALOI, B. DALLEY, J. BRUN).

Première mention francilienne, à une date assez typique des rares observations de l'espèce en dehors de son aire de répartition normale (DUBOIS *et al.*, 2008). Cette observation s'inscrit dans le cadre d'un petit afflux dans le nord-ouest de l'Europe entre fin octobre et novembre 2011.

Martinet à ventre blanc

Apus melba

- Santeuil-95, 1 individu, 26 mars 2010 (G. TORRES).

Troisième mention francilienne et la première au printemps (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013), à une date qui correspond aux retours printaniers de l'espèce dans son aire de répartition dans le sud-est de la France (DUBOIS *et al.*, 2008).

Pic cendré

Picus canus

- Brunoy-91 / domaine du MNHN, mâle, juillet au 26 août 2008 (P.Y. HENRY, J. LAIGNEL, C. ÉRARD).

Quelques dizaines de couples de Pic cendré nichaient en Île-de-France au début des années 1990, mais il a disparu de la région au début de la décennie suivante et n'est plus observé qu'occasionnellement. Il a donc été inclus dans les espèces soumises à homologation régionale. Le site d'observation de 2008 n'est pas loin de la forêt de Sénart-91, une des forêts anciennement occupées par l'espèce, mais celle-ci ne semblait déjà plus y nicher en 1994 (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013) et n'y a pas été observée depuis.

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

Faucon kobez

Falco vespertinus

- Saint-Germain-Laval-77 / Tréchy, mâle, 15 avril 2007 (J.-P. SIBLET).
- Bonnelles-78 / les Clos, mâle adulte, 14 mai 2007 (J. CHEVALLIER).
- Cernay-la-Ville-78 / la plaine Coulon, mâle de 1^{er} été, 24 mai 2007 (F. POUZERGUES).
- Us-95 et Vigny-95, mâle en vol, 6 mai 2008 (Y. DUBOIS).
- Brie-Comte-Robert-77, mâle en vol, 9 mai 2008 (S. THOMIN).
- Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu en vol, probablement mâle de 2^e année, 23 mai 2008 (P. ROUSSET).
- Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, mâle adulte, 22 avril 2010 (P. ROUSSET).
- Orphin-78 / bois de Haute Maison, mâle adulte, 1^{er} mai 2011 (L. CHEVALLIER) (vu également sur Écrosnes-28).
- Marais d'Épizy-77, mâle de 2^e année, 23 et 24 mai 2012 (E. PERRET, P. RIVALLIN, P. MIGUET, L. ALBESA, S. VINCENT, O. CLAESSENS, J. COMOLET-TIRMAN, J. CRESPO, A. SAGETTE).

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Après plus d'un demi-siècle d'absence comme nicheur, le Faucon pèlerin s'est réinstallé en Île-de-France au milieu des années 2000. Il a tenté de nicher à Guerville-78 en 2005 et s'est reproduit avec succès sur ce site les années suivantes (les données de Guerville ne sont pas reprises dans la liste des observations ci-dessous). Un couple a niché à Haute-Isle-95 en 2010. À Ivry-sur-Seine-94, après avoir été suspectée en 2010, la reproduction a été avérée en 2011. Également en 2011, un couple a niché en aval de Mantes-la-Jolie-78, etc..

- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, immature, 3 février 2007 (S. VINCENT, J.-P. SIBLET).
- Guyancourt-78 / Villaroy, juvénile, 15 septembre 2007 (D. LALOI).
- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, juvénile, apparemment en migration, 14 octobre 2007 (D. LALOI, B. DALLET).
- Jablines-77, 1 individu, 27 octobre 2007 (Y. DUBOIS, S. CHAMBRIS).
- Bonnelles-78 / les Clos, 1 individu, 6 novembre 2007 (J. CHEVALLIER).
- Ablis-78 / la Castaigne, 1 individu, 8 mars 2008 (L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE).
- Saclay-91, juvénile, 23 et 29 août 2008 (D. LALOI).
- Trilbardou-77, juvénile, 17 septembre 2008 (P. PERSUY *et al.*).
- Fouju-77, adulte probablement femelle, 9 novembre 2008 (J. CRESPO).
- Misery-91, femelle, 18 novembre 2008 (O. THORET).
- Saint-Martin-la-Garenne-78 / port de l'Ilon, adulte, 8 décembre 2008 (P. PICHON, C. MULATIER).
- La Défense-92, couple, 13 décembre 2008 au 30 janvier 2009 (T. BARA *et al.*).

- Saclay-91, juvénile, 23 décembre 2008 (D. LALOI, J. BRUN *et al.*) ; immature probablement femelle, 24 février 2009 (S. VINCENT).
- Paris-75 / pont de Grenelle (XV^e arrondissement), adulte, 22 mars 2009 (P. SCHAFFHAUSER).
- Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu, 5 juillet 2009 (P. ROUSSET) ; 1 individu, 11 août 2009 (P. ROUSSET).
- Boinville-le-Gaillard-78, 1 individu, 6 septembre 2009 (L. CHEVALLIER).
- Allainville-aux-Bois-78, immature, 27 septembre 2009 (L. CHEVALLIER).
- Marolles-sur-Seine-77 / le Carreau Franc, adulte, 3 octobre 2009 (S. VINCENT).
- Saclay-91 et Toussus-le-Noble-78 / Orsigny, 2 individus, 15 décembre 2009 (S. VINCENT).
- La Défense-92, couple, 16 décembre 2009 au 1^{er} mars 2010 (T. BARA *et al.*).
- Orsay-91, 1 individu, 8 janvier 2010 (C. DENOZIÈRE).
- Alfortville-94 / Chinagora, couple, 24 janvier au 24 mars 2010 (P. DERENNES, Y. ATTICK *et al.*), il y a vraisemblablement eu tentative de reproduction mais sans succès ; au moins 1 individu, 7 juillet 2010 (R. PROVOST).
- Saint-Hubert-78, 1 individu, 19 avril 2010 (G. LOIS).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 13 mai 2010 (O. THORET *et al.*).
- Haute-Isle-95, 1 couple avec 3 jeunes sur l'aire, 7 juin 2010 (L. BOITEUX).
- Trilbardou-77, juvénile, 1^{er} août 2010 (P. PERSUY).
- Saclay-91, adulte probablement mâle, 18 août 2010 (D. LALOI).
- Saint-Hubert-78, 1 individu, 21 août 2010 (J.C. VESCO).
- Saint-Germain-en-Laye-78, 1 individu, 13 septembre 2010 (P. CAGGIARI).
- La Défense-92, couple, 14 octobre 2010 à juin 2011 (T. BARA, F. THOUIN *et al.*), 2 œufs ont été pondus mais n'ont pas éclos.
- Thiverval-Grignon-78, 1 individu, 23 octobre 2010 (Y. CARASCO).
- Alfortville-94 / Chinagora, un couple nicheur a produit 3 jeunes à l'envol, printemps-été 2011 (Y. ATTICK *et al.*).
- Vallée de la Seine en aval de Mantes-78, un couple nicheur a produit 3 jeunes à l'envol, printemps-été 2011 (G. BAUDOUIN).
- Allainville-78, adulte, 12 juin 2011 (L. CHEVALLIER).
- Paris-75 / Front-de-Seine (xv^e arr.), couple, à partir du 1^{er} août 2011 (J. BIRARD, G. LOÏS *et al.*).

Le Faucon pèlerin n'est plus soumis à homologation en Île-de-France à partir du 1^{er} janvier 2012. Même si l'augmentation de l'espèce a conduit à regarder les dernières fiches avec un niveau d'exigence un peu abaissé, quelques données ont été rejetées en raison de descriptions nettement insuffisantes pour affirmer qu'il s'agissait bien de cette espèce.

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, mâle de la sous-espèce *senator*, 5 et 6 mai 2012 (A. REBOUL, F. MOIGNET, S. DETANTE-BRISON, G. LARRÈGLE *et al.*).
- Grisy-sur-Seine-77, mâle, 10 mai 2012 (F. BRANGER, P. RIVALLIN).
- Nangis-77 / les Mantresses, individu probablement femelle, 19 mai 2012 (F. MALHER, C. WALBECQUE, S. DETANTE-BRISON).

Hirondelle rousseline

Cecropis daurica

- Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu, 25 avril 2008 (D. THORNS).

Encore une première mention francilienne, à une date qui entre tout à fait dans le cadre des rares observations printanières en dehors de l'aire d'apparition normale de l'espèce (DUBOIS *et al.*, 2008).

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus caudatus *

présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale

- Mantes-la-Jolie-78 / île Aumône, 5 individus, 14 novembre 2010 (F. LELIÈVRE *et al.*).
- Paris-75 / jardin des Tuileries, 4 à 5 individus, 20 décembre 2010 au 2 février 2011 (F. JIGUET, P. J. DUBOIS *et al.*).
- Bagneux-92 / cimetière parisien, 2 individus, 14 janvier au 11 février 2011 (A. PATAUD).
- Congis-sur-Thérouanne-77, 1 individu, 18 mars 2011 (J. BOTTINELLI).

D'autres oiseaux ont été acceptés comme Mésanges à longue queue « à tête blanche » :

- Freneuse-78, 3 individus, 28 novembre 2010 (F. LELIÈVRE *et al.*).
- Thiais-94, environ 10 individus, 11 janvier 2011 (F. BOHAIN).
- Paris-75 / bois de Boulogne, 1 individu, 19 janvier 2011 (L. MOUSSIEGT).
- Villepinte-93 / parc du Sausset, 1 individu, 29 janvier 2011 (O. LAPORTE).
- L'Isle-Adam-95, 1 individu, 6 mars 2011 (J.-C. BEAUCOUR).

Un afflux exceptionnel et inédit en France a eu lieu au cours de l'hiver 2010-2011, alors qu'aucune mention d'*Aegithalos caudatus caudatus* n'était authentifiée dans le pays jusque-là (DUBOIS *et al.*, 2008 ; REEBER et le CHN, 2011, 2012 ; KAYSER, PAEPGAEY et le CHN, 2014). Même dans le cadre de cet afflux, il n'a pas toujours été possible d'attribuer avec certitude ces mésanges à la sous-espèce *caudatus*, d'où l'acceptation d'une partie d'entre elles comme Mésange à longue queue « à tête blanche ». Quelques données n'ont pas

fait l'objet de fiche d'homologation ; le nombre d'oiseaux vus en Île-de-France au cours de cet afflux est certainement un peu supérieur au total des données validées.

Pouillot à grands sourcils

Phylloscopus inornatus

- Santeuil-95 / étang de Vallière, 1 individu, 18 octobre 2007 (Y. DUBOIS).
- Marais de Larchant-77, 1 individu, 8 octobre 2008 (D. SÉNÉCAL).

Voici (enfin !) les première et deuxième mentions franciliennes de cette espèce longtemps attendue.

Pouillot véloce

présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Phylloscopus collybita tristis*, appelée **Pouillot de Sibérie**

- Montreuil-sous-Bois-93 / parc des Beaumonts, 1 individu, 20 février au 26 mars 2007 (P. ROUSSET, O. LAPORTE, M. ZUCCA, L. SPANNEUT *et al.*).
- Paris-75 / jardin des Tuileries, 1 individu, 8 au 12 avril 2011 (J. BIRARD, F. YVERT, G. LESAFFRE *et al.*).
- Paris-75 / rue de Grenelle, 1 individu, 10 au 20 février 2012 (M. ZUCCA, G. LOÏS, J. BIRARD).
- Paris-75 / Jardin des plantes, chanteur, 26 mars au 4 avril 2012 (F. JIGUET, J.-P. SIBLET, D. LALOI, Y. MASSIN *et al.*).

Pouillot ibérique

Phylloscopus ibericus

- Gif-sur-Yvette-91, mâle chanteur, 1^{er} mai au 1^{er} juillet 2009 (E. FENART, D. LALOI, P. LE MARÉCHAL) ; mâle chanteur, probablement le même que l'année précédente, 4 avril au 20 mai 2010 (E. FENART, D. LALOI, B. DALLET, S. VINCENT).

En 2009, le Pouillot ibérique était apparié à une femelle de Pouillot véloce *Phylloscopus collybita collybita* et probablement nicheur ; il a notamment été observé transportant de la nourriture le 23 mai. Par contre, aucun indice de nidification n'a été relevé en 2010.



Mésange à longue queue sous espèce orientale © F. Lelièvre

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

Fauvette épervière

Sylvia nisoria *

- Nandy-77, individu de 1^{er} hiver, 17 au 27 octobre 2010 (E. PERRET, D. BUYSSE *et al.*).

Il s'agit de la première mention francilienne, à une date typique du passage postnuptial en France, mais particulièrement remarquable compte-tenu du très petit nombre d'observations à l'intérieur des terres (DUBOIS *et al.*, 2008).

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

- Forêt de Sénart-91, mâle, 18 juin 2008 (J. LAIGNEL).

Il y a quelques mentions anciennes, avant les années 1960, mais il n'y avait eu qu'une seule donnée depuis cette époque, en forêt de Fontainebleau au printemps 1998 (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013).

Fauvette des Balkans

Sylvia cantillans *

- Beynes-78 / Camp de Frileuse, mâle adulte, 7 mai 2008 (G. GROLLEAU, M. PENPENY, J.-P. THAUVIN).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, mâle adulte, 7 mai 2012 (S. VINCENT, E. NANIANE, P. FOIN *et al.*).

Le complexe de la Fauvette passerinette a fait l'objet d'une révision récente. Le nouveau traitement systématique distingue trois espèces : *Sylvia inornata* dans l'ouest du bassin méditerranéen (dont les nicheurs de France continentale), *Sylvia subalpina* en Corse, Sardaigne, Baléares et dans le nord de l'Italie, *Sylvia cantillans* dans le sud de l'Italie, les Balkans et jusque dans l'ouest de la Turquie (REEBER, KAYSER et le CHN, 2015 ; SVENSSON, 2013a ; SVENSSON, 2013b). On ne connaissait aucune mention de ce groupe en Île-de-France avant 2008. Sur les trois mentions obtenues depuis, deux ont été attribuées à l'espèce orientale *Sylvia cantillans* (anciennement sous-espèce orientale de la Fauvette passerinette) ; la troisième mention n'a pu être rattachée à aucun des taxons nouvellement reconnus et, de ce fait, n'a pas été homologuée.

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Données en dehors du massif de Fontainebleau :

- Rochefort-en-Yvelines-78, mâle, 20 mars 2008 (B. DALLET) ; 3 individus dont 1 mâle chanteur, 17 mars 2009 (F. ARNABOLDI) ; mâle chanteur, 21 mai 2009 (B. DALLET).
- Moisson-78 / domaine régional, couple nicheur, printemps 2008 (A. LEBOSSE, G. JARDIN *et al.*).
- Forêt de Rambouillet-78, mâle chanteur, 1^{er} avril 2010 (J.-M. FENEROLE).

Locustelle lusciniöide

Locustella luscinioides

- Saint-Hubert-78 / étang de Pourras, chanteur, 30 avril au 7 mai 2007 (M. DI MAGGIO, C. LETOURNEAU, A. PERNOT, M. BORIE).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, chanteur, 17 mai 2007 (P. PICHON, C. MULATIER).
- Saint-Hubert-78, 1 individu, 31 juillet 2007 (M. BORIE).
- Saint-Hubert-78, chanteur, 1^{er} au 8 mai 2009 ; 2 chanteurs, 9 au 29 mai 2009 ; chanteur, 30 mai au 30 juin 2009 (groupe Rambouillet).
- Saint-Hubert-78, chanteur, 1^{er} mai 2010 (C. LETOURNEAU) ; 2 chanteurs, 9 au 29 mai 2010 (L. CHASSERIEAU, C. LETOURNEAU, P. DARDENNE) ; chanteur, 26 juin 2010 (C. LETOURNEAU).
- Saint-Hubert-78 / étang de Corbet, chanteur, 11 avril au 4 juin 2011 (L. CHEVALLIER, S. CHEVALLIER-BRIERRE, S. HOUPERT, C. LETOURNEAU *et al.*).
- Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, chanteur, 16 au 28 avril 2011 (D. GODREAU, J.-C. MARTIN, L. ALBESA).
- Saulx-les-Chartreux-91, chanteur, 22 avril au 3 juin 2011 (B. LEBRUN, S. VINCENT *et al.*).
- Écharcon-91 / marais de Misery, chanteur, 24 avril 2011 (D. ATTINAULT).
- Bazoches-lès-Bray-77 / Champmorin, chanteur, 30 avril au 4 mai 2012 (S. HOUPERT, G. PASSAVY, J.-P. DELAPRE, B. LEBRUN).
- Saint-Quentin-en-Yvelines-78, 1 individu, 24 juin 2012 (Réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines).

Jaseur boréal

Bombycilla garrulus

- Châteaufort-78, juvénile probablement femelle, 7 et 8 janvier 2009 (P. DARDENNE, P. LE MARÉCHAL, O. THORET, D. LALOI).
- Jablines-77, 1 individu, 18 décembre 2010 (J. BOTTINELLI).
- Nanterre-92, 1 individu, 24 et 25 décembre 2010 (F. BOUZENDORF).
- Châteaufort-78, 2 mâles de 1^{er} hiver, 26 décembre 2010 au 2 janvier 2011 (F. POUZERGUES, P. LE MARÉCHAL, D. MAURAS, S. VINCENT, C. HARDEL, D. LALOI *et al.*).
- Ferrières-en-Brie-77, 1 à 3 individus, 1^{er} au 10 janvier 2011 (L. VINDRAS, O. LAPORTE, L. ALBESA *et al.*).
- Gadancourt-95, 1 individu, 2 décembre 2012 (C. FOUQUERAY).
- Châteaufort-78, 6 individus, 11 décembre 2012 (P. CRANÇON), puis seulement 3 individus, 12 au 15 décembre (D. ATTINAULT, P. CRANÇON, D. LALOI, S. VINCENT, Y. MASSIN *et al.*), et encore 1 individu, 17 décembre 2012 (J.-C. VESCO).
- Verneuil-sur-Seine-78, 2 individus, 23 décembre 2012 (L. BOITEUX).

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

- Dourdan-91 / église et château, 1 individu, 15 décembre 2009 au 4 avril 2010 (B. RONDEAU, M. FREULON, F. POUZERGUES *et al.*).
- Suresnes-92 / mont Valérien, 1 individu, 15 décembre 2009 au 22 mars 2010 (V. LE CALVEZ, D. PICHON *et al.*).
- Dourdan-91 / église et château, femelle, 14 novembre 2010 au 20 mars 2011 (B. RONDEAU, M. FREULON, F. POUZERGUES *et al.*).
- Dourdan-91 / église et château, femelle, 7 novembre 2011 au 5 février 2012 (D. ATTINAULT, Y. MASSIN, B. RONDEAU *et al.*).

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

- Montigny-sur-Loing-77, 1 individu, 20 mai 2007 (J. COMOLET-TIRMAN).
- Charenton-le-Pont-94 / bords de Marne, 1 individu, 7 au 30 juillet 2010 (R. PROVOST, O. NDIAYE).

Pipit de Richard

Anthus richardi

- Pontoise-95, 1 en migration, 28 octobre 2009 (P. J. DUBOIS).

Pipit rousseline

Anthus campestris

- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, 1 en migration, 23 août 2009 (B. DALLET) ; 2 en migration, 27 août 2009 (B. DALLET) ; 1 en migration, 30 août 2009 (B. DALLET) ; 2 en migration, 31 août 2009 (B. DALLET) ; 2 en migration, 9 septembre 2009 (J. ROCHEFORT).
- Dourdan-91 / la Pièce de l'orme, 2 individus, 24 août 2010 (B. DALLET, B. RONDEAU).
- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, 2 en migration, 25 août 2010 (D. LALOI) ; 1 en migration, 1^{er} septembre 2010 (B. DALLET) ; 1 en migration, 11 septembre 2010 (B. DALLET, S. VINCENT, D. LALOI).
- Garges-lès-Gonesse-95, 1 individu, 4 septembre 2010 (O. LAPORTE).
- Doué-77, 1 en migration, 24 août 2012 (J. BOTTINELLI).
- Garges-lès-Gonesse-95 / la Grande Prairie, 1 en migration, 2 septembre 2012 (G. PASSAVY).

Pipit à gorge rousse

Anthus cervinus

- Sandrancourt-78, 1 individu, 10 mai 2008 (P. J. DUBOIS, E. ROUSSEAU).
- Gometz-le-Châtel-91 / les Bigarreux, 1 en migration, 26 septembre 2009 (D. LALOI, B. DALLET, S. VINCENT).

Roselin cramoiisi

Erythrura erythrura *

- Les Bréviaires-78, individu de 2^e année, 22 mai 2007 (M. BORIE).
- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, chanteur, 29 mai 2010 (Bull. ANVL, 86-2 : 60).

Ces deux oiseaux constituent la première et la seconde mentions franciliennes de cette espèce, à des dates qui correspondent bien aux arrivées printanières en France (DUBOIS *et al.*, 2008).

Bruant des neiges

Plectrophenax nivalis

- Le Mesnil-Saint-Denis-78 / les Grands Ambésis, mâle, 29 novembre au 2 décembre 2007 (A. MARI, E. DIEU, F. POUZERGUES, S. VINCENT).

Bruant fou

Emberiza cia

- La Ferté-Alais-91, 1 individu, 1^{er} janvier au 15 mars 2012 (D. CHRISTIN).
- Forêt de Fontainebleau-77 / carrefour du Coq et Mont Fessas, 1 individu, 4 janvier 2012 (G. LARRÈGLE) ; 4 individus, 20 février 2012 (G. LARRÈGLE) ; 2 mâles et 1 femelle, 24 février au 3 mars 2012 (S. VINCENT, G. LESAFFRE *et al.*).



Pipit rousseline © Jaime Crespo

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

- Forêt de Sénart-91 / plaine des Bergeries, 1 individu, 12 septembre 2006 (J. ROCHEFORT).
- Bonnelles-78 / les Clos, femelle ou immature, 10 septembre 2008 (J. CHEVALLIER).
- Achères-78, 1 individu, 1^{er} mai 2011 (G. LAULHE, S. BOUROVALI-ZADE).
- Congis-sur-Thérrouanne-77, 1 individu, 2 mai 2011 (J. BOTTINELLI, T. BITSCH).
- Guérard-77, mâle, 4 mai 2012 (J. BIRARD).
- Luzancy-77, femelle, 6 mai 2012 (S. TARDY).
- Gometz-le-Châtel-91, 2 en migration, 2 septembre 2012 (B. DALLET).

Compte-tenu de sa raréfaction, le Bruant ortolan a été réintégré à la liste des espèces soumises à homologation régionale (il en avait déjà brièvement fait partie à la création du CHR avant d'être retiré en 1995). L'identification des oiseaux contactés en migration a pu être confirmée à plusieurs reprises grâce à des enregistrements sonores, et il faut reconnaître l'intérêt de la prise de son lors de séances de suivi de la migration active.

Bruant nain

Emberiza pusilla *

- Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, 1 individu, 15 septembre 2008 (J. ROCHEFORT).

Cet oiseau, comme quelques autres données concernant la migration postnuptiale (Pipits rousselines, Bruants ortolans), a pu être homologué sur la base d'un enregistrement (REEBER et le CHN, 2009, 2010). Il s'agit de la troisième mention francilienne depuis 1974, une donnée plus ancienne, de 1958, étant malheureusement peu documentée (LE MARÉCHAL *et al.*, 2013). La date est parmi les plus précoces du passage postnuptial en France, mais les dates d'observation sur des localités atypiques sont elles-aussi parfois atypiques.

Les oiseaux rares

Années 2007 à 2012

Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie

* = espèce soumise à l'homologation nationale

Harle couronné

Lophodytes cucullatus *

- Butry-sur-Oise-95, femelle, 17 août 2008 (R. LESOURD).
- L'Isle-Adam-95, mâle adulte, 26 décembre 2008 (J. GOUELLO).

Pélican blanc

Pelecanus onocrotalus *

- Sandrancourt-78 / port de l'Ilon, adulte, 11 au 19 janvier 2011 (L. BOITEUX *et al.*).
- Méricourt-78, adulte, 5 et 6 février 2011 (P. J. DUBOIS *et al.*).
- Sandrancourt-78 et Méricourt-78, adulte, 21 décembre 2011 au 5 février 2012 (M. SERAIN, P. J. DUBOIS *et al.*).
- Richebourg-78, adulte, 26 décembre 2011 (P. FRANÇOIS).
- Puteaux-92, adulte, 20 janvier 2012 (D. GODREAU *et al.*).

Toutes ces données concernent vraisemblablement le même oiseau (REEBER et le CHN, 2012 ; KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014) qui a régulièrement fréquenté la vallée de la Seine.

Ibis sacré

Threskiornis aethiopicus

- Brétigny-sur-Orge-91 / le Carouge, immature, 1^{er} et 2 décembre 2009, trouvé mort le 2 décembre (M. BITTER).

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus

- La Ferté-Alais-91, immature, 27 mai 2012 (D. CHRISTIN).

Cet oiseau provenait d'un programme de réintroduction en Autriche, et avait été équipé d'une balise Argos en 2011. Il a effectué un parcours erratique vers le nord pour atteindre les côtes des Pays-Bas puis est redescendu vers le sud en passant au-dessus de l'Île-de-France le 27 mai 2012.

Roselin familier

Carpodacus mexicanus *

- Saint-Rémy-lès-Chevreuse-78, mâle, 8 janvier au 12 février 2012 (F. JIGUET *et al.*).

Espèce commune en captivité, mais également capable d'arriver en Europe en empruntant des navires faisant la traversée de l'Atlantique. La présence hivernale dans des jardins avec des mangeoires ne plaide pas pour une arrivée directe d'Amérique (KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014).



Roselin familier © F. Jiguet

Observations non homologuées

* = espèce soumise à l'homologation nationale

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* : Persan-95, 2 immatures, 15 janvier 2012 (description non concluante ; des éléments vont bien dans le sens de l'espèce proposée, mais pas tous).

Canard à front blanc *Anas americana* * : Etampes-91, adulte, 12 juillet 2007 (description nettement insuffisante et sans doute un échappé de captivité ; REEBER, FRÉMONT, FLITTI et le CHN, 2008).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* : Roissy-en-Brie-77, femelle adulte, 24 octobre 2012 (les éléments notés peuvent correspondre, mais description insuffisante au moins pour exclure un éventuel hybride).

Cigogne noire *Ciconia nigra* : Écharcon-91 / marais de Misery, 26 mai 2007 (c'était peut-être cela, mais la description trop succincte ne permet pas de lever tout doute). Mantes-la-Jolie-78, 5 individus, 21 juillet 2012 (observation furtive, des critères n'ont pas été notés, description insuffisante pour lever tout doute).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* : Mennecy-91, 7 mars 2008 (c'était probablement cela, mais description insuffisante pour éliminer tout doute).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* : Dourdan-91, mâle adulte, 24 février 2007 (la description pourrait correspondre, mais elle est insuffisante pour lever tout doute). Dourdan-91, couple, 18 mars 2007 (là-aussi, la description pourrait correspondre, mais elle est toutefois insuffisante). Poigny-la-Forêt-78, 29 mars 2010 (observation très brève, les critères notés peuvent correspondre mais sont insuffisants).

Buse féroce *Buteo rufinus* * : Bray-sur-Seine-77, adulte, 8 octobre 2010 (la « silhouette typique d'une buse », l'absence de tache carpienne et les culottes décrites blanches laissent un doute sur l'identification, et pourraient convenir d'avantage à une Buse variable pâle ; REEBER et le CHN, 2011). Brétigny-sur-Orge (91), 28 octobre 2012 (description trop courte dans laquelle manquent des éléments essentiels, ne permettant pas d'écarter une Buse variable *Buteo buteo* ; KAYSER, PAEPEGAEY et le CHN, 2014).

Buse pattue *Buteo lagopus* * : Chauconin-Neufmontiers-77, 12 septembre 2011 (les photographies montrent une jeune

Busse variable avec la base de la queue blanche ; REEBER et le CHN, 2011).

Rôle des genêts *Crex crex* : les Molières-91, 18 mai 2008 (la description du chant évoque cette espèce, avec toutefois un rythme qui ne correspond pas).

Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus* * : Saint-Hubert-78 / étang de Corbet, 27 septembre 2009 (la distance d'observation importante n'a pas permis de noter des éléments d'identification qui auraient été nécessaires pour l'acceptation de cette espèce, en particulier en un lieu inhabituel ; REEBER, et le CHN, 2010).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : Saint-Maurice-Montcouronne-91, 9 octobre 2009 (c'était peut-être cela, mais observation brève, dans des conditions n'ayant pas permis de noter des éléments importants pour exclure tout doute).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoideus* * : Trilbardou-77, 1^{er}/2^e hiver, 18 octobre 2010 (le plumage entièrement blanc à cette époque de l'année plaide plutôt pour l'hypothèse d'un goéland leucique, et description trop incomplète pour lever le doute ; REEBER et le CHN, 2011).

Goéland marin *Larus marinus* : Enghien-95, 3 individus, 6 février 2012 (la description pourrait correspondre, mais il manque plusieurs éléments pour lever tout doute, surtout pour une observation exceptionnelle de 3 oiseaux ensemble).

Faucon d'Éléonore *Falco eleonora* : Marolles-en-Brie-94, 15 juillet 2007 (description insuffisante, ne permettant pas d'éliminer d'autres faucons, notamment des espèces détenues en fauconnerie).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : les Granges-le-Roi-91, 29 juillet 2007 (description insuffisante, ne permettant pas de lever tout doute).

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* : Jouy-en-Josas-78, 15 septembre 2008 (observation furtive, les éléments notés peuvent correspondre mais ne sont pas totalement concluants).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* : Chevreuse-78, 17 mai 2008 (en absence de description physique de l'oiseau, la description du chant, un peu imprécise, n'a pas permis d'écarter tout doute).

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* : Arbonne-la-Forêt-77 / plaine de Chanfroy, mâle, 24 mai 2010 (il s'agissait certainement d'un oiseau du groupe « Fauvette passerinette », mais les éléments notés n'ont pas permis de le rattacher à l'une des trois espèces aujourd'hui reconnues au sein de ce groupe).

Monticole bleu *Monticola solitarius* : Périgny-sur-Yerres-94, 10 au 19 avril 2011 (la description correspond à un Martin-pêcheur d'Europe).

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus** : Paris-75 / VII^e arrondissement, 1^{er} décembre 2008 (description trop peu robuste pour que soit retenue une mention, pour le moins invraisemblable, d'un robin picorant sur une pelouse en plein Paris et au mois de décembre, même si la description y ressemble ; REEBER et le CHN, 2009).

Tarier pâle oriental *Saxicola torquatus maurus/stejnegeri* * : Villiers-le-Bâcle-91, mâle (et peut-être une femelle en plus), 12 mai 2008 (un oiseau local évoquant le type sibérien, le manteau strié et plus pâle que la calotte indiquent bien qu'il ne s'agit pas d'un Tarier pâle oriental ; REEBER et le CHN, 2009).

Références

- ALBESA, L. (2010). Un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* en stationnement hivernal à Échouboulains (77) du 25 au 29 novembre 2010. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la vallée du Loing et des environs*, **86** : 64-65.
- DUBOIS, P. J., LE MARÉCHAL, P., OLIOSSO, G., et YESOU, P. (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 pages.
- KAYSER, Y., PAEPEGAËY, B., et le CHN (2014). Les oiseaux rares en France en 2012. 30^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **21** (2) : 65-107.
- LALOI, D., et le CHR (2015). Les oiseaux rares en Île-de-France en 2006. *Le Passer*, **48** : 2-5.
- LE MARÉCHAL, P., LALOI, D., et LESAFFRE, G. (2013). *Les Oiseaux d'Île-de-France. Nidification, migration, hivernage*. CORIF-Delachaux et Niestlé, Paris, 512 pages.
- REEBER, S., FRÉMONT, J.-Y., FLITTI, A., et le CHN (2008). Les oiseaux rares en France en 2006-2007. 25^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos*, **15** (5) : 313-355.
- REEBER, S., et le CHN (2009). Les oiseaux rares en France en 2008. 26^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **16** (5) : 273-315.
- REEBER, S., et le CHN (2010). Les oiseaux rares en France en 2009. 27^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **17** (6) : 361-405.
- REEBER, S., et le CHN (2011). Les oiseaux rares en France en 2010. 28^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **18** (6) : 325-367.
- REEBER, S., et le CHN (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **19** (6) : 353-395.
- REEBER, S., KAYSER, Y., et le CHN (2015). Les oiseaux rares en France en 2014. 32^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, **22** (6) : 281-311.
- SVENSSON, L. (2013a). Subalpine Warbler variation and taxonomy. *British Birds*, **106** (11) : 651-668.
- SVENSSON, L. (2013b). A taxonomic revision of the Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **133** : 240-248.

David LALOI

Suivi de la nidification de Linottes mélodieuses *Carduelis cannabina* dans un jardin du Val-d'Oise (95)

Catherine Walbecque

La présence de la Linotte dans le jardin est avérée depuis longtemps ; le développement de l'informatique et des bases de données a permis de garder mes observations diverses et variées depuis 2003. Mais ce n'est qu'avec le travail de l'atlas régional 2009-2014 et le souci de rechercher des preuves de nidifications, que le désir d'en savoir plus sur « mes » linottes est apparu. Je ne m'attendais pas alors à rencontrer autant de difficultés dans l'interprétation de ce que je voyais, et ce n'est qu'en 2016 que j'ai réussi à suivre le processus complet, avec aussi la volonté de ne jamais déranger aucun oiseau quel qu'il soit en période de nidification : les haies ne sont taillées que fin août, et c'est donc à cette époque que je contrôle la présence effective de nids confirmant mes observations de l'été. Les résultats obtenus ne sont pas issus d'un protocole d'observation, mais pris sur la vie familiale, avec son lot d'aléas, d'où certainement des irrégularités dans les données.

Description du jardin

La superficie du jardin est de 750 m² maison comprise. Celle-ci le sépare en deux entités : « devant au sud » et « derrière au nord », qui constituent bien souvent deux territoires distincts à défendre pour certaines autres espèces, tels les merles, ou les mésanges. Le jardin se situe en extrémité de village, et jouxte une prairie à chevaux, des bosquets et une friche humide ; un peu plus loin des champs.

Il est âgé de 20 ans et comporte deux haies mixtes (l'une de Troènes, Noisetiers, Thuyas, Charmilles et l'autre de persistants Elaeagnus, Houx, Viorne-aubier), des pelouses non traitées, des bordures de fleurs, un mini-potager et quelques arbres ou arbustes hauts isolés : Robinier faux-acacia, Aubépinier, If d'Irlande, Thuya, Cotonéaster.

Deux points d'eau pour les oiseaux sont maintenant pérennes et jouent leur rôle été comme hiver.

Historique

Date d'arrivée

Les linottes arrivent au mois de mars ou d'avril mais ne sont pas ponctuelles ;

les premiers contacts peuvent être le chant ou tout simplement un visuel de trajet avec les cris de contact en vol. Voici quelques dates d'arrivée relevées : 27 avril 2004, 29 avril 2007, 6 avril 2008, 13 mars 2009, 29 mars 2010 (chant), 3 avril 2012, 19 avril 2013, 1^{er} avril 2014, 9 avril 2015, 13 avril 2016. Elles peuvent être en couple ou constituer une « petite colonie de couples déjà formés » (GÉROUDET, 1998).

Ce fut donc une des premières difficultés : essayer de savoir qui fait quoi avec qui, et combien de mâles chantent dans le jardin, dans l'espoir de déterminer le nombre de couples cantonnés. Mais ce seul critère s'est avéré insuffisant : les mâles ont des postes de chant un peu partout, ne défendent pas leur territoire, les déplacements se font souvent à deux (couple) mais aussi avec d'autres. Des nicheurs situés dans la friche non loin ou ailleurs peuvent très bien venir chanter dans le jardin.

Construction du nid et couvaison

La femelle linotte est toujours accompagnée du mâle dans la moindre de ses activités ; il vocalise sans cesse, posté sur une hauteur, pendant qu'elle s'affaire à la recherche de matériaux, ou de nourriture et d'eau, et il démarre à sa suite avec une seconde de retard dès qu'elle s'envole. (Cette attitude existe aussi chez les chardonnerets.)

Le nid est une véritable œuvre d'assemblage (photo 1). La construction du nid n'est pas discrète, mais dure très peu de temps (2 jours selon

GÉROUDET, 1998). Elle peut donc totalement échapper à l'observation. Dans ce cas ce sont les allers et retours vers un lieu précis qui dévoilent la nidification.

Voici les dates que j'ai relevées au cours des années, avec le lieu :

- le 28 mai 2005 dans la haie (hauteur 2 m) ;
- le 12 mai 2007 dans l'if d'Irlande (hauteur 4 m), puis dans la haie le 12 juin 2007 (remplacement à la suite d'une prédation par un mammifère) ;
- le 17 avril 2008, puis le 27 mai 2008 (après un violent orage) (pas de notes sur le lieu) ;
- le 19 mai 2013 dans l'if d'Irlande (hauteur 4 m) ;
- le 22 mai 2015, deux couples construisent dans la même haie (hauteur 2 m) à 5 m d'intervalle ; puis un le 17 juillet 2015 ; puis un le 26 juillet 2015 ;
- le 26 avril 2016 dans un if taillé en boule (hauteur 1 m).

Les constructions du mois de mai correspondent à la première nidification, qui suit la date d'arrivée avec un écart assez constant : 13 jours en 2007 ; 11 jours en 2008 ; 13 jours également en 2015 où il y a eu deux couples actifs ; et pour l'année 2016, une arrivée le 13 avril précède une construction le 26 avril, soit 13 jours après !

2015 a vu non seulement deux couples actifs, mais également deux reproductions au cours de l'été.

2016 a vu une deuxième nidification en juillet, mais seuls des allers et



Photo 1 : nid prédaté, trouvé en août lors de la taille des haies.

retours avaient prouvé la présence d'un nid le 26 juillet.

Cette proximité avec l'homme est quand même très surprenante, car, certes, l'oiseau niche, mais je continue de jardiner un minimum, essayant de déranger le moins possible. Souvent, c'est le mâle qui commence à chanter doucement dès que j'oublie et approche trop près d'un endroit sensible.

Prédation au nid

Un geai des chênes est venu détruire les œufs le 22 mai 2013, pénétrant sans vergogne dans l'if proche de la maison (distance 1 m).

L'inspection des nids effectuée lors de la taille des haies permet également de constater la prédation, sans que je connaisse de façon certaine le prédateur (chat ?) ; la fouine a été cependant fortement suspectée du fait de crottes laissées non loin.

Accouplement

Moment tellement bref, qu'il passe souvent inaperçu.

J'ai pourtant quelques dates : 15 juin 2005, 17 juillet 2005, 3 juillet 2009, 30 avril 2012, 2 juillet 2012, 22 mai 2015. Cette dernière date correspond en fait à la date de construction du nid par deux couples à 5 mètres d'intervalle, l'un des mâles s'est rapidement rapproché de sa femelle alors qu'elle entraînait dans la haie, à l'aplomb du nid en construction, semble-t-il, et s'est accouplé.

Jeunes au nid

Très peu de données en raison de l'interdiction que je me suis faite de déranger les nids (photo 2) : 2 le 9 août 2005, dans le berbéris ; 1 le 3 juillet 2008, dans le berbéris ; 3 le 30 mai 2016, dans le thuya boule.

Il faut ajouter une autre caractéristique



Photo 2 : boule d'If et Berbéris hôte des nids de linottes

surprenante de l'espèce que j'ai découverte : les oisillons sont entièrement silencieux et ne quémangent jamais, ce qui ajoute encore à l'incertitude quant à la présence effective d'un nid. En août 2005, il me fallait en effet vérifier, avant de partir en vacances, si le berbéris était occupé et j'ai eu la surprise d'y voir un nid avec deux becs qui se sont ouverts.

Nourrissage de jeunes volants

Très peu de données également, en raison de la difficulté de différencier les jeunes des femelles et /ou de repérer les jeunes à la sortie du nid de par leur silence.

Néanmoins, le 7 août 2015 un juvénile est retrouvé groggy sur les marches de la salle de séjour (s'est-il cogné à la baie vitrée ?), permettant une photographie (photo 3) et l'observation de près des différences par rapport à la femelle : dos fortement strié chez les juvéniles, plus marron et uni chez la femelle.

Le 15 août 2015, j'ai ainsi pu repérer une femelle avec ses jeunes, qui se nourrissent ensemble dans la pelouse (photo 4).

Suivi détaillé en 2016

Le 26 avril à 13 h, la linotte construit sous l'œil vigilant du mâle.

Le 12 mai, de retour de 10 jours de vacances, et au cours d'un de mes tours de jardin, je fais fuir malencontreusement la linotte de la boule d'if (photo 2) et je comprends qu'elle couve.

Le 20 mai, malgré la tonte de la pelouse au ras de la boule, un rapide coup d'œil sans m'arrêter me permet de constater que la femelle couve toujours. Cette fois, elle ne fuit pas.

La plupart des observations seront faites à partir de la maison avec des jumelles (distance 10 m). Elles me permettront d'affiner ma compréhension du comportement nicheur des linottes, de m'apercevoir que les nourrissages sont plutôt matinaux et relativement peu fréquents, que les adultes sont souvent absents. J'ai donc pu déroger au principe de précaution et jeter un œil de temps en temps sur les oisillons au moment optimum.

Les nourrissages ont lieu plutôt le matin, alternativement par le mâle et la femelle, ou par la femelle seule ; sans effectuer de véritable suivi continu, j'en ai compté 3 le 27 mai (7 h 45, 8 h 45 et 10 h 35), 3 le 28 mai à des heures différentes (8 h 30, 9 h, 9 h 10), 1 le 30 mai à 12 h 35 (avec la femelle qui restait à moitié à l'extérieur du nid, les jeunes commençant à prendre beaucoup de place), 2 le 31 mai (6 h 45 et 9 h 20), 2 le 2 juin (7 h 30 et peut-être à 19 h 30), 1 le 3 juin à 8 h par la femelle – ce sera le dernier puisque le nid était vide à 13 h 30.



Photo 3 : juvénile.

Linotte mélodieuse

Les couples de linottes se gavent littéralement de graines. Cette action peut durer pendant au moins 30 minutes ; il s'agit en fait de se remplir le jabot en vue non pas d'une becquée (action de remplir le bec de l'autre), mais carrément d'un dégorgeement pour les oisillons.

Le scénario est toujours le même : une attente prudente aux environs du nid pouvant atteindre 5 minutes, avant d'y pénétrer. Le nourrissage prend une minute environ, puis l'adulte ressort avec un sac fécal.

Le comportement des adultes par rapport au sac fécal est différent. Alors que la femelle s'éloignait directement et très loin, j'ai pu observer, le 30 mai, que le mâle se posait à 2 mètres environ sur une branche du robinier faux-acacia, puis qu'il s'essuyait le bec plusieurs fois. J'ai effectué par la suite des recherches soigneuses pour retrouver le sac, sans succès, j'en ai donc déduit qu'il l'avait mangé !

Deux ou trois jours avant l'envol, les adultes pénètrent parfois uniquement pour ressortir avec un sac fécal. De même ils peuvent assurer une présence près du nid, puis repartir sans nourrir. Le reste du temps, le mâle veille souvent sur le toit de la maison et vocalise ou chante régulièrement.

Les jeunes au nid, toujours très silencieux, sont néanmoins très actifs et allongent régulièrement leurs ailes.



Photo 4 : femelle et jeune se nourrissant dans la pelouse.

L'envol a eu lieu le 3 juin dans la matinée : j'ai constaté le nid vide à 13 h 30, sans que je puisse observer quoi que ce soit.

Le lendemain et le surlendemain, les adultes semblaient rechercher leurs jeunes au sol près du mur du jardin.

Dès le 1^{er} juin, un deuxième couple était venu s'installer pour nicher à 5 mètres environ du premier !

Vocalisation originale de la femelle

Le nid du second couple était trop loin pour observer facilement mâle et femelle ; cependant j'ai suivi la fin de leur nidification. J'ai pu percevoir un cri poussé par la femelle seule dès que les jeunes ont quitté le nid et qu'ils se sont dispersés non loin (à découvrir sur le site du Corif en annexe).

Elle se met en situation haute, et semble appeler pour repérer où sont situés

les juvéniles, qui ne volent pas encore très bien. Il ne m'a pas semblé entendre de réponse. Il semblerait aussi qu'elle émet ce cri avec le jabot plein.

J'ai noté ce cri du 14 au 20 août dans la matinée, soit à 9 h ou 10 h, soit à 13 h, et dans la soirée.

J'avais déjà entendu ce cri l'année précédente, mais je l'avais d'abord attribué au mâle. Il reste aussi à déterminer si ce cri est poussé uniquement lors de la dernière nidification du mois d'août, car il ne m'a pas semblé l'entendre en juin, peut être parce que la femelle se préoccupe alors de fabriquer un deuxième nid, et que le mâle se charge des premiers nés !

La relation entre les linottes et le jardin est très importante. En effet les linottes, comme beaucoup d'autres oiseaux, utilisent pour leur nid les matériaux immédiatement disponibles dans la proximité. Il en est de même pour l'alimentation, et mon jardin possède deux plantes qui semblent leur convenir.

Plantes appétentes

D'abord il y a les myosotis, fleurs de plate-bandes, assez envahissantes, qui fleurissent au printemps jusqu'à l'été, et dont les graines apparaissent en mai, date qui correspond aux premières nidifications des linottes. Le plus dur pour le jardinier ornithologue est d'accepter la laideur de la plante en graines pendant un temps assez long (photo 5).

Ensuite, en été, il y a une petite plante sauvage dans la pelouse, qui au cours des ans a prospéré : la Brunelle *Prunella vulgaris* (photo 6). C'est une " plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées, cosmopolite héliophile, qui se plaît en bordure de route et de




Photo 5 : Serin cini et myosotis.

bois, et dans les prés "(Wikipédia). Elle occupe suffisamment de place pour que les oiseaux s'y fendent par mimétisme, et trouvent à nourrir leurs jeunes.

Du fait des tontes répétées de la pelouse, les fleurs et les graines sont au ras du sol et donc beaucoup plus accessibles pour les oiseaux ; cela donne tout son sens au verbe « pâturer » employé lorsque les linottes s'alimentent dans le jardin.

Ces deux plantes intéressent également les Serins cini et les Chardonnerets élégants, certainement pour les mêmes raisons, de même les Bouvreuils pivoine.

Conclusion

J'écris ces lignes en juin 2017, et la situation des linottes au jardin est encore différente : elles sont apparues le 11 avril, un couple a inspecté la boule d'if le soir du 3 mai, un mâle aux couleurs claires a inspecté le thuya le 24 mai, sans plus.... Aucun indice de nidification. Il est vrai que le robinier faux-acacia a été taillé façon têtard, un grillage remplacé, bref le visuel du jardin est différent par rapport à l'année dernière ; peut-être que les myosotis ne sont pas assez abondants, où qu'elles ont jugé qu'ils ne seront pas

en graine à la bonne date ! Cela fait deux ans que la sécheresse au printemps et en été provoque une accélération de la vie des végétaux, avec pour conséquence un décalage temporel pour les utilisateurs : des papillons et des butineurs qui ratent leur rendez-vous avec leurs fleurs de prédilection ou des granivores qui ne bénéficient plus de leurs graines à l'époque de l'élevage des jeunes ! J'attends donc maintenant l'été avec anxiété pour connaître leur verdict : mon jardin est-il encore au top pour accueillir les linottes ?

Bibliographie

GÉROUDET (1998). Les passereaux d'Europe, t.2 Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris. 512 pages

Nettographie

<http://www.ornithomedia.com/pratique/debuter/sacs-fecaux-couches-culottes-oisillons-02185.html>
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_fecal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunelle_commune

Catherine Walbecque



photo 6 : brunelle.



Synthèse ornithologique des observations franciliennes des années 2012 à 2014 : les non-passereaux, volet 1

Christian Gloria, Stanislas Wroza, Olivier Laporte, Sylvain Vincent, Irène Anglade, Éric Grosso, Julien Piolain, Frédéric Malher

RÉSUMÉ

La présente synthèse reprend les observations des « non-passereaux » issues essentiellement du site de saisie naturaliste www.faune-iledefrance.org pour la période 2012-2014 : 91 623 données ont été ainsi traitées provenant de 1567 observateurs. Elle ne comporte ni les gaviiformes (plongeurs) et les podicipédiformes (grèbes), ni les ciconiiformes (hérons, cigognes, spatules...) ni les rapaces diurnes (accipitriformes et falconiformes). Ceux-ci feront l'objet d'un second volet, à paraître dans un prochain numéro du *Passer*.

On y trouve des observations d'espèces rares en Île-de-France, soumises au Comité d'homologation régional (CHR). La liste est longue : Cygne de Bewick, Oie des moissons, Oie rieuse, Bernache cravant, Fuligule à bec cerclé, Fuligule nyroca, Eider à duvet, Macreuse noire, Harle huppé, Erismature rousse, Râle des genêts, Pluvier guignard, Bécasseau de Temminck, Bécasseau tacheté (les trois années pour cette espèce néarctique !), Phalarope à bec étroit, Phalarope à bec large, Chevalier stagnatile, Labbe parasite, Labbe pomarin, Labbe à longue queue, Sterne caspienne, Sterne caugek, Sterne arctique, Guifette leucoptère, Mouette tridactyle, Goéland à ailes blanches, Goéland marin. Une seule espèce a été soumise à homologation nationale : le Bécasseau de Bonaparte.

Beaucoup d'espèces entrant dans la catégorie D ou E de la Commission de l'avifaune française sont reprises, dont rien moins que 20 de la famille des anatidés (canards, oies...) et 9 de la famille des psittacidés (perruches, perroquets...). La reproduction et la constitution d'une population souche n'est pas impossible à partir de telles espèces. Ainsi, note-t-on à titre d'exemples, la reproduction du Cygne noir, de l'Oie à tête barrée, de l'Ouette d'Égypte (probable), de la Perruche Alexandre (probable) qui pourraient suivre les exemples d'espèces exotiques bien installées comme le Canard mandarin, le Faisan vénéré ou la Perruche à collier pour en citer quelques-unes.

La période a été riche en espèces marines (présentes en mer ou sur le littoral habituellement) observées à l'intérieur du territoire francilien. Parmi les limicoles, en dehors des espèces « classiques », on peut noter de manière plus exceptionnelle les observations de l'Huîtrier-pie, du Phalarope à bec large, du Phalarope à bec étroit et du Tournepierre à collier. Les autres espèces marines vues sont la Bernache cravant, l'Eider à duvet, la Macreuse noire, le Harle huppé, trois espèces de labbes (Parasite, Pomarin, à longue queue), le Goéland marin, la Mouette tridactyle, trois sternes (caugek, arctique, caspienne)... Mention spéciale au Goéland pontique dont la croissance forte des observations (190 données entre 2012 et 2014 contre 17 données sur la seule année 2011) est à mettre au crédit d'une meilleure reconnaissance de l'espèce plus que d'un afflux. Mais notre région constitue un des bastions du Goéland pontique en France.

Parmi les espèces arctiques et scandinaves ayant séjourné ou de passage en Île-de-France, on peut retenir le Cygne de Bewick, les Oies rieuses et des moissons, le Fuligule milouinan, le Harle piette, la Bernache nonnette avec des individus sauvages avérés, la Macreuse brune...

Dans les nidifications remarquables, le Garrot à œil d'or s'est reproduit en 2012 et 2014, la Sarcelle d'hiver en 2013, l'Echasse blanche en 2014 et, pour la première fois en Île-de-France, le Hibou des marais, en 2012.

ABSTRACT

*We summarise observations of non-passerines for the period 2012-2014, taken mainly from the participatory natural history website www.faune-iledefrance.org. In total 91,623 observations made by 1567 observers have been analysed. Our treatment does not include the Gaviiformes (Loons), Podicipediformes (Grebes), Ciconiiformes (Herons, Storks, Spoonbills, etc.) or diurnal raptors (Accipitriformes and Falconiformes) which will be included in a second paper, in a forthcoming issue of *Passer*.*

We include observations of species which are rare in Île-de-France and that have been submitted for validation by the Comité d'homologation régional (CHR). The extensive list of such species includes Bewick's Swan, Taiga Bean Goose, Greater White-fronted Goose, Dark-bellied Brant, Ring-necked Duck, Ferruginous Pochard, Common Eider, Common Scoter, Red-breasted Merganser, Ruddy Duck, Corn Crake, Eurasian Dotterel, Temminck's Stint, Pectoral Sandpiper (this Nearctic species observed in each of the three years!), Red-necked Phalarope, Red Phalarope, Marsh Sandpiper, Parasitic Jaeger, Pomarine Jaeger, Long-tailed Jaeger, Caspian Tern, Sandwich Tern, Arctic Tern, White-winged Tern, Black-legged Kittiwake, Iceland Gull and Great Black-backed Gull. A single record of White-rumped Sandpiper was submitted for validation at the national level.

Many species in categories D or E (observed in nature but not in the official list) of the Commission de l'avifaune française (French Avifauna Commission) are reported, including over 20 in the family Anatidae (Ducks, Geese, etc.) and 9 in the family Psittacidae (Parakeets, Parrots, etc.). Reproduction and formation of a viable wild population cannot be excluded for these species. We note successful breeding of Black Swan, Bar-headed Goose, Egyptian Goose (probable), and Alexandrine Parakeet (probable), which could potentially become established exotic species in the same manner as Mandarin Duck, Reeves's Pheasant and Rose-ringed Parakeet.

The period in question was rich in observations of species normally present on the coast or at sea, including both waders and pelagic species. Among the waders, in addition to the expected species, we note observations of Eurasian Oystercatcher, Red Phalarope, Red-necked Phalarope and Ruddy Turnstone. Other observed species more commonly associated with coastal locations were the Dark-bellied Brant, Common Eider, Common Scoter, Red-breasted Merganser, three species of jaeger (Parasitic, Pomarine, Long-tailed), Great Black-backed Gull, Black-legged Kittiwake, three tern species (Sandwich, Arctic, Caspian), etc. Special mention is made of Caspian Gull records with a significant increase in observations (190 between 2012 and 2014 compared to 17 in 2011) that is attributed to better monitoring of the species more than to a true population increase. However, this region does constitute one of the strongholds of Caspian Gull in France..

Arctic and Scandinavian breeding species wintering in or on passage through Île-de-France included Bewick's Swan, Greater White-fronted Goose, Taiga Bean Geese, Greater Scaup, Smew, Barnacle Goose (with confirmation of wild individuals), Velvet Scoter, etc.

Notable observations of breeding birds include Common Goldeneye in 2012 and 2014, Common Teal in 2013, Black-winged Stilt in 2014 and, for the first time in Île-de-France, Short-eared Owl in 2012.

Liste systématique catégorie A, B, C

selon le nouvel ordre taxonomique des familles d'oiseaux
(Commission de l'avifaune française, 2016)

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Comptages WI (Wetlands International) effectués à la mi-janvier de chaque année : en 2012, 1 349 ind. ; en 2013, 1 547 ind.; en 2014, 1 171 ind. De nouveaux records d'effectif hivernal ont été établis en 2012 puis en 2013 lors de ce dénombrement (P. Le Maréchal, comm. perso.).

Le site de la carrière de la Croix Saint-Michel à Neuville, Jaulnes – 77 est celui où se rencontrent les effectifs les plus importants, et ce sur les trois années. Le maximum est enregistré le 2 août 2014 avec 170 ind. (CBra). Hors saison de nidification, 150 ind. sont comptés le 10 avril 2014 à la ferme d'Isle à Grisy-sur-Seine – 77 (JPDe) et en pleine période hivernale. Les premiers cygnons apparaissent fin avril-début mai selon les années, l'observation la plus précoce en la matière sur la période étant le 28 avril 2013 à Longueville – 77 (Les Murs) avec 2 ad. et 8 pulli (FBra). Le Cygne tuberculé niche dans la majeure partie de la région, avec une estimation de la population nicheuse de 350-400 couples (MALHER *et al.*, 2017) pour la période 2009-2014.

Cygne de Bewick

Cygnus colombianus bewickii

Cinq observations sur trois ans. Entre le 7 et le 15 janvier 2012, 2 individus (un ad. et un ind. de 2^e année) sont notés à Grisy-sur-Seine – 77 (PRou, CGui et PGui, SVin).

Deux immatures sont observés le 15 janvier 2012, à Persan – 95 (JCBe).

Oie des moissons

Anser fabalis

Une seule observation sur la période considérée : 1 ind. posé le 25 avril 2013 à la ferme d'Isle à Grisy-sur-Seine – 77 (PRou). L'individu est en compagnie de Bernaches du Canada. Il présente des caractéristiques de la sous-espèce *rossicus*. L'observateur pose la question de son origine sauvage.

Oie rieuse

Anser albifrons

L'espèce n'est observée qu'en 2012 et à l'unité, sauf 6 ind. le 12 mars au Pré des Bateaux à Luzancy – 77 (STar). Sinon,

1 ind. est noté entre le 16 février et le 6 mai dans le sud de la Seine-et-Marne sur des sites de Marolles-sur-Seine, Varennes-sur-Seine, Bazoches-les-Bray et Vimpelles (divers observateurs), souvent en compagnie de Bernaches du Canada.

Oie cendrée

Anser anser

Comptages Wetlands International 2012 : 81 ind. ; 2013 : 24 ind. ; 2014 : 30 ind.

Les effectifs les plus importants se rapportent à des groupes observés en vol : 400 environ le 3 février 2013 depuis le parc des Beaumonts à Montreuil – 93 (PRou, DTho) ; 400 le 9 novembre 2014 de l'aire de service de Rosny-sur-Seine – 78 (CDum) en vol vers le sud ; plus de 370 au total en 6 groupes entre 12 h et 14 h en vol vers le nord le 11 février 2013 de l'étang de Saint-Hubert au Perray-en-Yvelines – 78 (JCVe) ; 220 le 8 décembre 2012 depuis Fourqueux – 78 (JPar) vers le sud... D'autres effectifs élevés de plus de 50 ind. sont notés, tous en déplacements migratoires : postnuptiaux à l'automne (très peu en octobre, majorité en novembre) ou prénuptiaux en fin d'hiver (majoritairement en février, un peu en mars jusqu'à la fin du mois). Le nombre le plus important pour un groupe posé est « seulement » de 38 ind., le 31 août 2014 à la Mandreuve, Grosrouvre – 78, probable regroupement postnuptial de la population résidente locale selon l'observateur (CLet).

L'espèce est nicheuse en Île-de-France, mais l'origine sauvage des individus est difficilement affirmable :

- 2 ad. et 6 oisons le 6 avril 2014 au Moulin, les Mesnuls – 78 (CLet) ;
- 5 ad. et 3 petits (oies domestiques en fait) le 10 mai 2014 au parc Jean Sainteny à L'Isle-Adam – 95 (JCBe) ;
- 2 ad. et 1 petit le 15 mai 2013 à Itteville – 91 (JDau), une famille (1 couple et 4 juv) le 1^{er} août 2013 au camping l'Île de Boulancourt – 77 (MApr).

Nombre de ces oies sont en réalité imprégnées.

Bernache du Canada

Branta canadensis

Comptages Wetlands International 2012 : 2 735 ; 2013 : 2 261 ; 2014 : 2 581. Le record d'effectif hivernal est atteint lors du dénombrement en 2012 (P. Le Maréchal, comm. perso.) avec 2 735 ind. Quelques sites ont compté au moins 300 individus : la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 avec 400 ind. environ le 2 septembre 2012 (CBri) ; la Haute Voie à Nangis – 77 avec 390 ind. le 11 octobre 2014 (CBra) ; les étangs de Saclay – 91 avec 343 au maximum le 15 septembre 2014 (DLal).

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Des groupes de plus de 200 ind. sont notés sur quelques autres sites.

La Bernache du Canada niche sur la majeure partie de l'Île-de-France, avec un effectif estimé à 350 couples en 2013 (MALHER *et al.*, 2017). Les juvéniles les plus précoces sont notés chaque année dans la dernière décade d'avril : le 29 avril 2012 avec 2 couples et 2 + 6 oisons à Dourdan – 91 (CMor) ; le 25 avril 2013 avec des adultes et 2 oisons au Parc floral à Paris – 75 (BLOT) ; le 20 avril 2014 à la passerelle de Gournay – 93 (SMac) avec 6 petits.

Bernache nonnette

Branta leucopsis

Un vol de 8 ind. en migration active est observé le 8 mars 2014 à la fontaine Bézauld à Courcelles-en-Bassée – 77 (TJou).

Autres mentions d'individus volants : 4 au parc Georges Valbon à la Courneuve – 93 du 13 avril au 13 mai 2014 (FGas), population férale cependant probable ; 3 suspectées sauvages à l'étang des Bastilles à Guernes – 78 le 4 mars 2012 (EGro, ACha, FLel) ; 2 en vol à Congis-sur-Théroutanne – 77 le 18 février 2012 (TBit, JBot).

Des individus domestiques se sont reproduits au square des Batignolles à Paris – 75 : 4 ad. et 2 petits sont notés le 11 juin 2013 (FMal).



Bernache nonnette © G. Noclé

Bernache cravant

Branta bernicla

Cette espèce marine est notée une seule fois sur 2012-2014 : 4 ind. le 12 janvier 2013 à Beaumont-sur-Oise – 95, posés sur le lac (JCBé).

Bernache à cou roux

Branta ruficollis

Trois ind. le 12 janvier 2013 à Milon-la-Chapelle – 78, dont l'origine sauvage est fort peu probable (GKer).

Ouette d'Égypte

Alopochen aegyptiaca

Un groupe maximum de 11 ind. est vu à l'étang du Corra à Saint-Germain-en-Laye – 78 le 2 septembre 2013 (PZoz). À Asnières-sur-Seine – 95, plusieurs ind. sont comptés tous les ans : jusqu'à 7 le 7 octobre 2012 au Grand Vivier (JCBé). À noter également 5 ad. le 24 novembre 2013 à l'ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin). Ailleurs, sont notés des groupes inférieurs à 5 ind. Au lac de l'Arbalète à Grigny – 91, 1 ad. et 2 juv. sont trouvés le 9 septembre 2012 avec une suspicion de reproduction (MMSe) ; 2 ad. y avaient été notés avec nidification probable (classe 4) le 2 juin 2012 (GPas) ; nidification probable (classe 5) notée aussi à l'étang des Trois Sources à L'Isle-Adam – 95 avec 2 ad. dont 1 agressif vis-à-vis des Colverts (JCBé).

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

La population la plus importante est signalée à Paris – 75. 11 ind. sont comptés le 20 août 2014 au Jardin d'acclimatation, dont 6 mâles et 5 femelles (MApr), avec des ind. volants. Un groupe existe aussi à la carrière de la Croix-Saint-Michel à Neuville, Jaulmes – 77, avec jusqu'à 9 ind. le 28 septembre 2014 (CBra). Les tadorne sont présents sur le site en août et septembre. 8 ind. sont vus le 11 janvier 2013 à l'étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (JPDe) et non revus ensuite. La ferme d'Isle à Grisy-sur-Seine – 77 compte 6 ind. les 11 février 2012 et 23 novembre 2013 (TJou, PRou). Ailleurs, pas plus de 5 ind. L'espèce est vue régulièrement aux abords du bois de Vincennes – 75. Elle s'y reproduit et des juvéniles sont observés mais aucune information à ce titre en 2012-2014 sur le site de saisie « faune-iledefrance ».

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Comptages Wetlands International 2012 : 5 ; 2013 : 6 ; 2014 : 11. Hors période de reproduction, le site de la Haute Voie à Nangis – 77 est celui qui regroupe le plus grand nombre d'ind. : maximum de 39 le 14 mai 2013 (CBra). À noter également 25 ind. les 4 et 10 mai 2014 à l'étang des Grésillons à Triel-sur-Seine – 78 (CLen, LBoi). Autre site comptant au moins 20 ind. : le Grand Marais à Varennes-sur-Seine – 77 le 15 novembre 2012 (BSeg). L'espèce se reproduit en quelques endroits d'Île-de-France. C'est dans ce contexte que l'on dénombre l'effectif maximum de tadorne : 43 (27 ad, 16 canetons) à la Haute Voie le 2 juin 2013 (CBra). Autres sites de nidification certaine : Triel-sur-Seine (19 canetons le 21 juin 2013 aux Grésillons (LBoi)), le marais du Colombiers à Varennes-sur-Seine (9 canetons entre le 14 et le 19 mai 2012 (BLeb, BSeg, YMas) et nidification soupçonnée au Fond Fortin à Mitry-Mory – 77 avec 1 femelle et 2 juv. le 20 juin 2014 (JCBé). L'éclosion la plus précoce est signalée

le 4 mai 2014 à Triel-sur-Seine (MALHER *et al.*, 2017). Avec des ind. domestiques, 4 canetons sont présents le 16 juin 2014 au square des Batignolles à Paris – 75 (FMal)

Canard mandarin

Anas galericulata

Comptages Wetlands International 2012 : 6 ; 2013 : 8 ; 2014 : 23. L'étang de Beaubourg à Croissy-Baubourg – 77 compte les effectifs les plus importants, avec jusqu'à 31 ind. (19 mâles, 12 femelles) le 9 novembre 2013 (JPDe). Ailleurs, pas plus de 15 ind. en un lieu. L'espèce est notée dans les différents départements franciliens. Sa reproduction est avérée à Sevran – 93 dans le parc de la Poudrerie, aux étangs de Croissy-Baubourg – 77 (2 nichées notées à la suite en 2014 [JPDe]), à Chelles – 77 (le Bras des Ablettes), à Noisiel – 77 (le Pont Blanc), à Rambouillet – 78 (étang du Coupe-Gorge), à Gambaiseuil – 78, au Vert Galant à Tremblay-en-France – 93, à l'étang aux Pointes à Fontenay-le-Vicomte – 91, à Aulnay-sous-Bois – 93 (pont de l'Union), à Fontainebleau – 77 (mare aux Fées), aux Bréviaires – 78 (petit étang de Hollande), à Quesnay, Pavillons-sous-Bois – 93. Date la plus précoce d'observation de canetons : les 7 mai 2013 et 7 mai 2014, respectivement à l'étang aux Pointes à Fontenay-le-Vicomte – 91 (DAtt), avec 4 canetons, et au Bras des Ablettes, Chelles – 77 (THER), avec 1 couple accompagné de 2 juv.

Canard siffleur

Anas penelope

Comptages Wetlands International 2012 : 119 ; 2013 : 342 ; 2014 : 231. Un seul site présente un effectif supérieur à 100 ind., celui de la Ferme d'Isle à Grisy-sur-Seine – 77 le 4 janvier 2014, avec 108 ind. (SVin). Le nombre est encore de 102 le 11 mars 2014 à cet endroit (PRou). Le domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 approche les 100 ind., avec 96 le 27 mars 2013 (JBot) ; de même pour les Champs Courceaux à Bazoches-lès-Bray – 77, avec plus de 90 le 18 janvier 2013 (PMig). Sur les autres communes, on ne dépasse pas les 40 ind. Les groupes se dispersent en mai-juin. Des individus sont vus à l'unité dans le courant de l'été, sauf en 2014, avec 3 ind. en juillet et août à l'étang Vieux de Saclay – 91 (CHar). Pas de reproduction. Les regroupements reprennent à partir de fin septembre.

Canard chipeau

Anas strepera

Comptages Wetlands International 2012 : 715 ; 2013 : 1 166 ; 2014 : 1 345. L'effectif hivernal lors du dénombrement atteint un nouveau record en 2014 (P. Le Maréchal, comm. perso.). Plus de 200 ind. sont présents à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux – 78 le 9 février 2014 (LBoi). Des effectifs proches sont notés au marais de Misery à Écharcon – 91, avec 180 le 5 décembre 2014 (JDau), et au grand observatoire de Sorques à Montigny-sur-Loing – 77, avec 170 le 7 janvier 2012 (GLar). Ailleurs, moins de 150 ind. notés par site. À la migration prénuptiale, dès le mois de mars, les effectifs tombent rapidement à une cinquantaine par site.

En période de reproduction, une nidification est observée au marais de Misery le 12 juin 2012, avec 5 mâles, 5 femelles et 7 canetons (JDau, DBin), et en 2014, un mâle est apparié à une femelle Colvert avec un caneton au duvet gris au lac de Créteil – 94 le 2 mai 2014 (IGir). Le 15 juin 2014, il y a 6 Chipeaux à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 et on signale « au moins six couvées ce printemps » (TFou). La nidification est confirmée sur ce site le 28 juin 2014, avec

1 couple et 8 imm. (BFro). Une première reproduction d'un ou deux couples est notée sur le site du marais de Larchant – 77 (MALHER *et al.*, 2017).

Au passage postnuptial, de premiers regroupements (quelques dizaines d'ind.) ont lieu fin août, puis on note des rassemblements importants dès septembre, comme 120 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 le 14 septembre 2013 (CBri) ou 140 sur le même site le 14 septembre 2014 (TFou).

Sarcelle élégante

Anas formosa

Un oiseau non sauvage au square des Batignolles à Paris les 10 juin et 1^{er} juillet 2012 (ALam, SWro) et 1 mâle au Grand Vivier à Asnières-sur-Oise – 95 le 7 septembre 2014 (JCBe).

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Comptages Wetlands International 2012 : 1 011 ; 2013 : 500 ; 2014 : 605. La base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 héberge les groupes les plus importants en hiver : environ 300 le 27 janvier 2013 (APic, BFro) et le 29 novembre 2014 (SWro, QGui, NDup, FDuc, PRan, CDef). On approche les 250 sarcelles à l'étang Vieux, Saclay – 91 avec 246 ind. le 23 novembre 2013 (CHar). Ailleurs, moins de 200 ind. comptés par site. Des individus sont visibles durant l'été çà et là, parfois par couple mais la reproduction n'est confirmée qu'une seule fois entre 2012 et 2014, le 28 juin 2013 au marais Boisé-sud à Lesches – 77 avec 2 ad. et 4 jeunes presque aptes au vol (SMai).

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Comptages Wetlands International 2012 : 6 765 ; 2013 : 8 441 ; 2014 : 6 782. Environ 500 ind. sont dénombrés au Grand-Vivier à Asnières-sur-Oise – 95 le 24 août 2013 (CWal), 480 au parc du Château à Rambouillet – 78 les 29 octobre 2012 et 24 novembre 2013 (LChe), 400 à l'ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine – 77 le 1^{er} janvier 2012 (DBin) ainsi qu'aux Dessous de Messy à Luzancy – 77 le 1^{er} août 2012 (THER), 380 au moulin de Reculée à Gazeran – 78 le 15 janvier 2012 (LChe) et au Grand Vivier le 28 juillet 2014 (CWal)...

Des canetons sont vus tôt en saison de reproduction : dès le 26 février 2014, date la plus précoce pour la période avec 1 femelle et 4 juv., à l'Hôtel-Dieu à Chevreuse – 78 (GKer). Mais il peut y en avoir en plein hiver. Exemple : le 24 décembre 2012 au niveau de la station RER Sevran-Livry – 93 (OLap) et le 4 décembre 2014 au Jardin des plantes (jardin écologique) de Paris avec 1 femelle et 12 canetons de moins de cinq jours (RPro) et encore le 15 décembre 2014 avec 1 femelle et 9 canetons au Vésinet – 78 (LPO, selon un échange téléphonique avec un agent de la mairie).

Canard pilet

Anas acuta

Comptages WI 2012 : 5 ; 2013 : 10 ; 2014 : 6. Sur un seul site on dénombre plus de 50 ind. à la fois : 66 précisément lors du passage prénuptial aux Dessous de Messy à Luzancy – 77 le 11 mars 2013 (JBot). Des regroupements de plus de 10 ind. sont notés jusque courant avril. Exemple : 20 le 6 avril 2013 aux Prés du Refuge à Lesches – 77. En mai, l'espèce a quasiment disparu. Le plus tardif en passage prénuptial : 1 le 26 mai 2012 au marais de Misery à Écharcon – 91 (DBin). Pas d'oiseau en juin, ni en juillet pour 2012 et 2013. L'année

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

2014 se distingue par l'observation d'individus à l'unité en juillet : 1 le 18 aux Prés du Refuge (RPro) et 1 le 19 au marais du Sausset à Aulnay-sous-Bois – 93 (FGas). Plus classiquement, les premiers retours au passage postnuptial ont lieu fin août, début septembre avec de premiers regroupements (pas plus de 10) sur ce dernier mois. Au passage postnuptial, l'effectif le plus élevé est de 20 ind. le 6 octobre 2013 à la Haute Voie à Nangis – 77 (JCre). Quelques oiseaux indiqués en plein hiver : nombre maximum : 6 le 13 janvier 2013 à l'ENS des Olivettes à Trilbardou – 77 (OLap), peut-être un retour précoce des quartiers d'Afrique, plutôt qu'un hivernage.



Canard pilet © J.-C. Morin

Sarcelle d'été

Anas querquedula

Cette espèce migratrice passant l'hiver en Afrique est signalée dès le 3 février 2012 au bassin de Trévoix à Bruyères-le-Châtel – 91 (JDau). Plus classiquement, les arrivées ont lieu courant mars. Quelques individus sont notés durant la période de reproduction sur quelques sites, mais aucune nidification n'est détectée. Les regroupements du passage postnuptial reprennent pendant le mois d'août. Les derniers individus sont vus au début du mois d'octobre, sauf en 2014 avec 1 mâle signalé le 5 décembre au moulin des Roches à Saint-Forget – 78 (TCha), mais dont l'origine sauvage peut être sujette à caution selon l'observateur.

À noter les effectifs les plus importants sur la période : au passage prénuptial 14 ind. (11 mâles, 3 femelles) le 22 mars

2012 au bassin de Plessis-Picard à Réau – 77 (MZuc), et un nombre remarquable de 37 ind. à la Haute Voie à Nangis – 77 le 8 août 2012 au passage postnuptial (MZuc).

Canard souchet

Anas clypeata

Comptages Wetlands International 2012 : 376 ; 2013 : 490 ; 2014 : 733. C'est à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 que l'on enregistre les nombres les plus élevés : maximum de 670 environ le 14 décembre 2013 (CBri). À d'autres dates en hiver, on dépasse les 400 ou 300 ind. Second site par son importance d'effectif : l'étang Vieux à Saclay – 91 avec 319 le 7 décembre 2014 (CHar). Courant mars et même début avril, les effectifs peuvent être encore supérieurs à 200 ind. sur ces deux sites. Ailleurs, on compte moins de 200 souchets. À partir de la mi-avril, les groupes diminuent fortement en effectifs.

Nidification constatée au bassin du Val Favry à Coignières – 78 avec 1 femelle et 3 canetons le 8 juin 2012 (CLet), au marais boisé sud à Lesches – 77 le 28 juin 2013 avec 2 ad. et 12 jeunes presque volants (SMal) et le 17 juillet 2014 à l'étang Vieux à Saclay avec 5 ad. et 2 imm. (CHar).

À la migration postnuptiale, les regroupements importants reprennent fin août et surtout en septembre, avec des comptages supérieurs à 200 ind. : par exemple 215 le 13 septembre 2012 à l'étang Vieux de Saclay – 91 (DLal) puis 218 le 22 septembre 2012 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (CBri) ou 295 le 29 septembre 2012 (DLal) à l'étang Vieux.

Nette rousse

Netta rufina

Comptages Wetlands International 2012 : 382 ; 2013 : 329 ; 2014 : 363. À compter de 2012, on enregistre une explosion des effectifs hivernaux. Jusqu'à 2011, ils n'avaient pas dépassé les 150 ind. lors du dénombrement (P. Le Maréchal, comm. perso.). Localement, on atteint les 250 ind. le 12 janvier 2013 à la Grande Prairie à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77 (EBer) et les 210 le 15 février 2014 à la carrière de la Grande Bosse à Bazoches-lès-Bray – 77 (TJou), 169 le 22 janvier 2012 aux Prés Hauts à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin, TJou). Ailleurs, moins d'une centaine d'individus. La population de Nette rousse en Île-de-France se concentre surtout dans le sud de la Seine-et-Marne.

L'espèce se reproduit dans le département en quelques sites, où l'on note les dates les plus précoces d'observations de canetons : le 8 mai 2014 à l'étang du Point d'interrogation à Jablines – 77, avec 8 petits (PRan). Au lac de Créteil – 94, 1 femelle et 2 juv. sont repérés le 18 mai 2012 (JAnj) et aussi, plus tôt en saison, le 26 avril 2014 (Coli), peut-être résultat d'une hybridation. En période de reproduction, on note jusqu'à 109 ind. en un site, le 8 mai 2014 à la sablière d'Égigny – 77 (JBot).

Fuligule milouin

Aythya ferina

Comptages Wetlands International 2012 : 4 409 ; 2013 : 5 719 ; 2014 : 3 721. En un seul site, un effectif record pour l'Île-de-France de 1 200 ind. environ est atteint le 5 janvier 2013 à la Grande Prairie à Saint-Sauveur-lès-Bray – 77 (MZuc). On se situe à moins de 1 000 ind. ailleurs et à d'autres dates : 724 ind. le 19 février 2012 au port Ilon à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (LBoi), environ 700 le 4 novembre 2012 aux sablières de Jablines – 77 (RPro)... Quelques autres sites

atteignent ou dépassent les 500 ind. en période hivernale.

À la migration prénuptiale, les groupes diminuent nettement en effectif à partir de mars. À la fin avril, on ne dépasse guère les 10 ind. par site.

L'espèce se reproduit en Île-de-France en plusieurs localités, avec une estimation de 10-20 couples (MALHER *et al.*, 2017). La famille la plus précoce pour la période est observée le 5 mai 2012 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78, avec 4 canetons (CBri, SVin).

En migration postnuptiale et en vue de l'hivernage, les groupes se reconstituent dès le mois d'août, avec un maximum de 199 ind. le 14 août 2014 au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (JBot).

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris

Une femelle de 2^e année est présente du 9 avril 2013 (MBit) au 14 avril 2013 (divers observateurs) au Carouge à Brétigny-sur-Orge – 91.

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

En 2012-2014, l'espèce est observée en 16 site de l'Île-de-France, toujours à l'unité sauf :

- le 4 décembre 2013 au moulin de Royaumont à Asnières-sur-Oise – 95, avec 2 mâles (PTil) ;
- le 4 mai 2014 à l'étang “ du Point d'interrogation ” à Jablines – 77 avec 1 mâle et 1 femelle adulte (TVin, OLap).

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Comptages Wetlands International : 2012 : 3 541 ; 2013 : 3 262 ; 2014 : 3535. Un effectif de 1 000 ind. environ est estimé le 22 janvier 2012 au plan d'eau de Ville-Saint-Jacques – 77 (MMSe). De manière plus précise, 550 ind. sont notés le 18 février 2012 au port Ilon à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (GBau), 450 le 4 janvier 2012 au plan d'eau du Paradis à Jablines – 77 (LAlb) et le 28 octobre 2012 sur la base de loisirs de Jablines (RPro).

Ailleurs, on enregistre moins de 400 ind. L'année 2012 a été une bonne année pour l'hivernage de l'espèce.

En 2013, maximum de 347 le 21 décembre à Jablines (MZuc) et en 2014, 300 environ au même endroit le 18 novembre (JGna).

À la migration prénuptiale, les effectifs déclinent nettement après le mois de mars. Jusqu'à début mai, on peut compter des groupes de plus de 50 ind. par exemple, 60 le 1^{er} mai 2012 au bois d'Échalas à Ville-Saint-Jacques – 77 (CPGu).

Ce fuligule se reproduit en divers sites d'Île-de-France. Selon les années, 100 à 150 couples mènent des nichées à l'envol (MALHER *et al.*, 2017). Les pulli les plus précoces ne sont notés qu'au courant du mois de juin :

- le 17 juin 2012 à Croissy-sur-Seine – 78 (PHur) ;
- le 18 juin 2013 à Neuville-la-Croix de la Croix-Saint-Michel à Bazoches-lès-Bray – 77 (MZuc), avec 1 femelle et 7 canetons ;
- le 18 juin 2014 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78, avec 1 femelle et 8 canetons (PDar).

Les regroupements postnuptiaux commencent début août avec quelques dizaines d'individus, voire plus : 75 le 4 août 2013 à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc), 78 le 14 août 2014 au domaine régional du Grand-Voyeux sur la même commune (JBot).

Fuligule milouinan

Aythya marila

Comptages Wetlands International 2012 : 6 ; 2013 : 2 ; 2014 : 2. Les nombres les plus importants sont notés début 2012 : 7 le 4 janvier à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux – 78 (MCol), 5 le 6 janvier au domaine régional de Flicourt à Guernes – 78 (GBau). Pas plus de 3 ind. sont notés par ailleurs. Observation la plus tardive au passage prénuptial pour la période : 1 femelle le 21 avril 2012 au Grand Marais à Varennes-sur-Seine – 77 (PRiv). La plus précoce en hivernage : 1 ind. de type femelle le 29 novembre 2013 au moulin de Royaumont à Asnières-sur-Oise – 95 (CWal).

Eider à duvet

Somateria mollissima

Un individu de type femelle stationne longuement en 2012 au lac de Créteil – 94 : du 2 janvier au 21 mars (divers observateurs). Il est présent en réalité depuis le 2 décembre 2011 (LAPORTE, *et al.*, 2016).

Macreuse noire

Melanitta nigra

Voici la liste des observations exhaustive de cet anatidé marin :

- 1 mâle les 27 et 28 mars 2012 au lieu-dit “ les Prés Hauts ” à Marolles-sur-Seine – 77 (JDau, NFon) ;
- 1 femelle les 19 et 21 octobre 2012 à Alfortville – 94 (OPli) ;
- 5 ind. de type femelle du 12 au 14 novembre 2012 à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (TBit, PRiv) ;
- 1 de type femelle du 21 novembre au 29 décembre 2012 au lieu-dit “ les dessous de Messy ” à Luzancy – 77 (JBot, MZuc) ;
- 1 du 2 au 18 décembre 2012 à l'étang des Grésillons à Triel-sur-Seine – 77 (EGro, LBoi, FLel) ;
- 1 de type femelle les 20 et 21 avril 2013 aux Prés du Refuge à Lesches – 77 (TBit, RPro) ;
- 4 de type femelle le 9 novembre 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri) ;
- 2 le 26 octobre 2014 à la Haute Voie à Nangis – 77 (CBra) ;
- 9 le 26 novembre 2014 à Luzancy – 77 (JBot) ;
- 1 de type femelle du 14 au 24 décembre 2014 à l'étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy – 78 (JDRa, PMag).

Macreuse brune

Melanitta fusca

Comptages Wetlands International 2012 : 1 ; 2013 : 24 ; 2014 : 2. Plusieurs observations sur divers sites. Sur la période, 13 ind. au maximum sont observés sur un même site : le 16 décembre 2012 à la base de loisirs de Jablines – 77, sur le Grand Lac (JArg, NSMa). Un groupe de 10 ind. est présent du 21 décembre 2012 (PJDu) au 4 janvier 2013 à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux – 78 (divers observateurs). Le groupe de Jablines (entre 12 et 9 ind. selon les observateurs) est visible jusqu'au 27 mars 2013.

Pas de groupes de plus de 10 ind. ailleurs. La date la plus tardive en période prénuptiale est le 11 mai 2014 au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (JBot). Au passage postnuptial (hivernage), l'observation la plus précoce a lieu le 8 décembre 2013, avec 2 ind. à l'étang de la Justice à Grigny – 91 (AHom, YMas).

Garrot à œil d'or

Bucephala clangula

Comptages Wetlands International 2012 : 32 ; 2013 : 43 ; 2014 : 32. Le nombre le plus importants d'individus est de 17 (10 mâles, 7 femelles) le 16 février 2013 aux Gravelottes

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

à Cannes-Écluse – 77 (SVin). Autres effectifs importants : 15 ind. (6 mâles ad. 2 mâles de 2^e année, 2 femelles ad. 5 de type femelle) le 11 mars 2012 aux Prés Hauts à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin). Ailleurs, on enregistre en quelques endroits des effectifs entre 10 et 14 ind. en hivernage.

L'espèce se reproduit en Île-de-France : 2 ad. et 4 juv. sont observés à Vimpelles – 77 le 16 juin 2012 (OLap, comm. pers.) ; 1 mâle ad. 2 femelles et 11 canetons sont notés le 3 mai 2014 aux sablières d'Égligny – 77 (JCre). Cette famille avait été déjà observée le 1^{er} mai (EBer).

En dehors de cette reproduction, on peut dire que le passage prénuptial s'étend jusqu'en avril-mai : 1 mâle le 10 mai 2013 à Champmorin à Belloy-Bazoches – 77 (JBot, TBit), 1 mâle et une femelle vus le 4 mai 2014 au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (OLap), pour les dates les plus tardives. Les premiers hivernants arrivent en novembre ou décembre selon les années, mais des individus ont été observés à l'unité durant l'été, en dehors de ceux qui se reproduisent. Exemples pour les plus précoces : 1 le 15 juillet 2012 au lac de la Station au Vésinet – 78 (BSou) (domestique ?) et 1 le 7 juillet 2014 au domaine du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (THer).

Harle piette

Mergellus albellus

Comptages Wetlands International 2012 : 18 ; 2013 : 23 ; 2014 : 15. Un groupe de 19 ind. (5 mâles, 14 femelles) est présent le 26 février 2012 à Ballastières, Freneuse – 78 (LBoi). Au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77, 15 ind. (dont 3 mâles) sont visibles le 2 mars 2012 (RHuc). Ailleurs et à d'autres dates, les effectifs ne dépassent pas les 12 ind. L'hivernage le plus tardif avant la migration prénuptiale est noté le 31 mars 2013, avec 1 femelle aux dessous de Messy à Luzancy – 77 (THer), et l'arrivée la plus précoce au second semestre, le 1^{er} novembre 2014, avec 1 ind. de type femelle au bois d'Échalas à Ville-Saint-Jacques – 77 (CHar).

Harle huppé

Mergus serrator

Jusqu'à 3 ind. (de 1^{re} année) sont vus ensemble : le 13 novembre 2013 à l'étang Vieux de Saclay – 91 (SVin, SRol). En dehors de cette observation, ce harle est vu à l'unité : 1 mâle les 3 et 4 avril 2012 à l'étang du Gallardon à Verneuil-sur-Seine – 78 (CLen, OLec, JGou) ; 1 mâle imm. le 30 janvier 2013 à l'ENS des Olivettes à Trilbardou – 77 (JBot) ; 1 ind. le 26 novembre 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (BFro) ; 1 ind. de type femelle du 2 au 5 décembre 2014 à l'étang de la justice à Grigny – 91 (RPan, SWro, MMSe, CAle) ; 1 mâle ad. à l'étang Vieux de Saclay le 26 décembre 2014 (BLEb).

Harle bièvre

Mergus merganser

Comptages Wetlands International 2012 : 6 ; 2013 : 4 ; 2014 : 9. Sont notés des effectifs remarquables de 17 ind. (dont 8 mâles) le 11 février 2012 aux Gravières à Moisson – 78 sur la Seine (GBau, MBan) et de 15 ind. (dont 10 mâles) le 10 février 2012 à Valvins, Avon – 77 (PRou). En dehors de ces données, les effectifs ne dépassent pas 7 ind.

La date la plus tardive d'hivernage pour la période est le 12 avril 2012 à Sorques, Montigny-sur-Loing – 77, avec 1 femelle (GLar, LAlb), et le retour le plus précoce survient le 18 novembre 2013 à l'étang de Croissy-Beaubourg – 77, avec 3 ind. (JPDe).

Érismature rousse

Oxyura jamaicensis

Observation d'un seul individu sur la période, celle d'une femelle du 28 novembre au 5 décembre 2013, à l'étang de Pourras au Perray-en-Yvelines – 78 (TCha, CLet, AHom).

Caille des blés

Coturnix coturnix

Pour ce migrateur, l'observation la plus précoce en 2012-2014 est le 13 mars 2014 à la ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne – 94 (AFer), avec un contact auditif, et la plus tardive le 13 septembre 2014 à la Borne de l'Homme mort à Bazoches-lès-Bray – 77 (JCre).

La nidification n'est pas confirmée de façon certaine, mais la présence de chanteurs réguliers à divers endroits la rend probable en plusieurs sites de l'Île-de-France. L'effectif des couples nicheurs est estimé à 350-440 pour la période 2009-2012 (MALHER *et al.*, 2017).

Jusqu'à 8 ind. ont été comptés sur un site, en l'occurrence 8 mâles chanteurs le 1^{er} juillet 2013 à la Beurrerie, Saint-Martin-de-Bréthencourt – 78, avec des chants soutenus de 22 h 15 à 22 h 40 au moins (CLet).

Perdrix rouge

Alectoris rufa

L'effectif maximal d'un groupe pour cette espèce est de plus de 30 ind. le 3 novembre 2013 au Haut-Bout, Saint-Martin-de-Bréthencourt – 78 (LChe), « dont au moins trois chanteurs ». Ces groupes peuvent provenir d'élevages à but cynégétique.

Quelques cas de reproduction sont signalés :

- le 29 juin 2012 à Gardeloup, Saint-Germain-Laval – 77 avec 1 femelle et 14 poussins (âgés de 2 ou 3 jours) (CGui) ;
- le 18 juillet 2012 aux Hauts Brouts à Bréançon – 95, avec 1 femelle et 2 pulli (PJDu) ;
- le 6 juillet 2013 au bois de Berval à Grisy-les-Plâtres – 95, avec des jeunes de l'année volants (PJDu) ;
- le 8 juillet 2013 au bois des Sablons à Boissy-le-Sec – 91, avec une famille dans un champ de blé (BDur) ;
- le 17 juin 2014 à la fontaine du Noisetier à Saint-Clair-sur-Epte – 95 (CGou).

Perdrix grise

Perdix perdix

Plus de 100 ind. sont comptés le 15 janvier 2012 à l'aérodrome de Melun-Villaroche à Montereau-sur-le-Jard – 77 (THer), 83 le 27 octobre 2012 à Chatonville, Sonchamp – 78 (SWro), plus de 60 le 23 février 2012 à Chavenay – 78 (MCha). Les autres données n'excèdent pas les 50 ind. L'espèce se reproduit en divers sites. Les pontes les plus précoces sont notées le



Eider à duvet et macreuse brune © O. Laporte

6 mai 2012 à Chatonville (CLet), avec des coquilles d'œufs trouvées sur le chemin. Quant aux premiers poussins, il faut attendre fin mai-début juin pour avoir la première observation : le 3 juin 2013 à la butte de Doue – 77, avec une femelle qui reste tapie et au moins 2 poussins filant dans les herbes (JBot) ; le 31 mai 2014 à Villepreux – 78, avec 1 femelle et 1 juv. (JDRa). Au printemps 2008, les effectifs ont été estimés à 36 000 couples (BRO et CROSNIER 2012, in MALHER *et al.*, 2017).

Faisan vénéré

Syrnaticus reevesii

L'effectif maximal observé est d'environ 50 ind. le 2 février 2014 sur la parcelle 19-26 (forêt de Rambouillet) à Cernay-la-Ville – 78. Seul 1 mâle est repéré parmi les femelles (CLet). À Auffargis – 78, aux Quarante Arpents, environ 40 ind. sont vus le 21 décembre 2014 (APor, SRey). Pas de reproduction observée mais des comportements de parades parfois, comme le 6 avril 2013 à la Pièce de la Rigole à Auffargis, avec 3 mâles paradant parmi 21 ind. -dont 13 mâles- (YMas). La population francilienne est estimée à 250 couples (MALHER *et al.*, 2017).

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Environ 50 ind. sont comptés le 29 décembre 2013 au Fond des Bois à Saint-Martin-de-Bréthencourt – 78 (LChe), nombre maximum pour la période. Les poussins les plus précoces sont trouvés dans le courant du mois de mai excepté en 2014 : 1 couple et 4 poussins le 29 avril à Ableiges – 95 (DLed). Le nombre de coqs est estimé entre 3 000 et 4 000 en Île-de-France (MALHER *et al.*, 2017).

Rôle d'eau

Rallus aquaticus

Le Rôle d'eau est noté en hivernage sur 71 communes dont 9 en petite couronne. C'est au marais de Maincourt, à Dampierre-en-Yvelines – 78, que l'effectif hivernant est le plus important, avec 13 ind. comptés le 21 décembre 2014. Ce comptage a eu lieu dans le cadre du protocole de dénombrement de l'espèce mis en place par le CERF et le Groupe local du Corif de Rambouillet (CLet).

Notons également, sur un site moins prospecté, l'estimation de 10 hivernants le 2 février 2014 dans la zone humide de la Fessine, à Mitry-Mory – 77 (TBit).

Néanmoins, la donnée d'hivernage la plus remarquable concerne celle d'un individu présent dans la petite zone humide du parc de Bercy, à Paris dans le XII^e arrondissement, du 2 janvier au 6 avril 2013 (YGes *et al.*) (ALEMANNI, 2013). Il n'est pas impossible qu'il s'agisse de l'individu trouvé dans un café à l'angle de l'avenue de Belleville et de la rue J.-P. Timbaud, relâché le lendemain au Jardin naturel, près du cimetière du Père-Lachaise (PJDu).

La reproduction de cette espèce discrète n'est prouvée avec l'observation de juvéniles que sur quatre communes (Dampierre-en-Yvelines – 78, le Perray-en-Yvelines – 78, Congis-sur-Thérouanne – 77, Gif-sur-Yvette – 91), mais elle est notée probable sur au moins 9 autres communes et possible sur 8 autres localités (contacts ponctuels de chanteurs après avril).

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Première mention pour le parc départemental de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne – 93 avec le séjour d'un individu du 20 mars au 1^{er} avril 2012 (WHui, OSig). Observation d'autant plus intéressante que ce sera l'unique mention printanière cette année-là dans notre région.

En 2013, aucune mention au passage prénuptial, et en 2014 seulement une le 13 avril à Luzancy – 77 (JBot).

Traditionnellement, l'espèce est davantage observée au passage postnuptial :

- 2 ind. le 26 août (JPMo, DAtt) et 1 le 22 septembre 2012 (FDuc, CBri) à la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 ;
- 1 ind. de 1^{re} année le 31 août 2012 au domaine régional du Grand-Voyeux, Congis-sur-Thérouanne – 77 ; 2 ad. sur ce même site le 4 septembre, dont l'un encore présent le 17 (JBot). Une belle série !
- 1 du 23 septembre au 15 octobre 2012 aux étangs de Grigny – 91 (MMSé, PMul) ;
- 1 le 25 août 2013 à la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes – 78 (BFro, CBri) ;
- 1 du 27 août au 6 septembre 2013 au marais d'Itteville – 91 (AHom, TFer, JDau) ;

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

- 1 ind. de 1^{re} année du 27 août au 15 septembre 2013 au domaine régional du Grand-Voyeux, Congis-sur-Thérrouanne – 77 (JBot) ;
- 1 ad. probable le 17 août 2014 à Nangis – 77 (CBr, VLCa) ;
- 1 ind. de 1^{re} année du 17 au 18 août 2014, puis un autre – ou le même ? – du 17 au 26 octobre au domaine régional de Flicourt (PPic, LBoi, CDum, GBau) ;
- 1 ind. de 1^{re} année les 8 et 24 août 2014 aux bassins de Villenoy – 77 (VLCa, OLap) ;
- 1 le 29 août 2014 au parc départemental de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne – 93, 2^e mention en 3 ans (OHép, TViv) ;
- 1 ad. au lieu-dit le Poirier Hourdé à Compans – 77, dans une bretelle d'autoroute, du 20 au 24 septembre 2014 (DOma, FMal, TCha).

Rôle des genêts

Crex crex

Un unique individu contacté en 3 ans : un oiseau est entendu les 3 et 4 mai 2013 aux Seiglats, à Cannes-Écluse – 77 (TJou).

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Effectif remarquable : 89 les 20 et 30 septembre 2014 à l'étang Vieux, Saclay – 91 (CHar).

Les premières nichées éclosent vers le 7 avril, mais une nichée était bien plus précoce : un poussin de quelques jours est présent le 23 mars 2014 au square des Batignolles à Paris (BLa).

Foulque macroule

Fulica atra

Comptages Wetlands International 2012 : 17 616 ; 2013 : 20 040 ; 2014 : 20 608.

En moyenne, 83 % sont dénombrés dans les secteurs de gravières de Seine-et-Marne : plaine de Bassée et vallée de la Marne.

Grue cendrée

Grus grus

Le passage pré-nuptial est remarquable en 2014, avec en particulier, un minimum de 11 100 ind. comptés en migration uniquement en soirée de 16 h 45 à 19 h 10 au coteau de Tréchy à Saint-Germain-Laval – 77 le 4 mars (TBit, PRiv).

En 2013, sur ce même site, 6 517 ind. ont été comptabilisés le 24 février et 2 857 le 9 mars (SVin, TJou).

Le 24 février 2014, 2 835 ind. passent à Doue – 77 (JBot). Seulement 2 mentions estivales ou du moins en période d'erratisme : 1 le 13 mai 2012 à Jaulnes – 77 (FBra) et 2 le 12 juin 2013 à Mouroux (THer).

Les observations de Grue cendrée au cœur de l'hiver entre mi-décembre et fin janvier sont également peu communes :

- en 2012, 2 ind. sont observés le 15 janvier 2012 à Changis-sur-Marne – 77 (JBot, STar) ; 10 ind. le 27 janvier à Achères – 78 (JGue) ; 3 ind. passent à Nangis – 77 le 30 décembre (EBer).

- en 2013, 1 ind. est présent à Champmorin, Balloy-Bazoches – 77 le 6 janvier (TJou) et 9 à Chalmaison – 77 le 25 janvier (FBra).
- en 2014, 1 ind. arrive du nord à l'étang du Coq, Roissy-en-Brie – 77 (VLCa). En fin d'année, un passage de grues inhabituel pour la période est noté le 28 décembre à Souppes-sur-Loing – 77, avec 3 vols comptabilisant au total 381 ind., avant une arrivée d'air froid (FLeg). Un petit groupe est entendu ce même jour à Nogent-sur-Marne – 94 (SCha). Quelques jours avant, 30 ind. étaient passés à Marolles-sur-Seine – 77 le 21 décembre (CPat).

Huîtrier pie

Haematopus ostralegus

L'année 2014 a permis à de nombreux ornithologues d'observer cette espèce peu commune dans notre région puisque 3 ind. ont fréquenté l'étang du Rouillard à Verneuil-sur-Seine – 78 du 10 au 25 décembre (ILHe, CLen *et al.*).

L'Huîtrier pie est noté sur trois autres sites en 2014 :

- 1 ind. le 21 février à Saclay – 91 après une forte tempête (RPan) ;
- 2 le 2 décembre à Luzancy – 77 (JBot) ;
- 1 le 22 décembre à l'étang de la Galiotte, Carrières-sous-Poissy – 78 (OLap).

Seulement une donnée en 2012 et deux en 2013 :

- 1 le 17 octobre 2012 à Luzancy – 77 (JBot) ;
- 1 le 10 mars 2013 à Épône – 78 (PMor, LBoi) ;
- 1 le 16 mars à Montereau-Fault-Yonne – 77 (PMig).

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Des hivernants sont notés tout le mois de janvier 2012 à Guernes – 78 (GBau).

Sur d'autres sites, des contacts d'hivernants ou de migrateurs attardés sont mentionnés :

- 1 ind. le 7 février 2012 à Triel-sur-Seine-78 (LBoi) ;
- 1 le 2 décembre 2012 à Freneuse – 78 (LBoi) ;
- 1 le 16 décembre 2014 dans le sud de la Seine-et-Marne à Rampillon – 77 (YBro), site nouveau pour l'hivernage ;
- 1 le 28 décembre 2014 à Vignely – 77 (SBoy).

Noté nicheur certain sur les communes de :

Champmoteux – 77, Changis-sur-Marne – 77, Flins-sur-Seine – 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Guernes – 78, Jablines – 77, Jutigny – 77, Lesches – 77, Marolles-sur-Seine – 77, Moisson – 78, Montereau-sur-le-Jard – 77, Saint-Escobille – 78, Saint-Martin-la-Garenne – 78, Soindres – 78, Triel-sur-Seine – 78, Vignely – 77.

Et probable à :

Boigneville – 91, Chalo-Saint-Mars – 91, Germigny-l'Évêque – 77, Grisy-sur-Seine-77, Limay – 77, Juziers – 77, Mézières-sur-Seine – 78, Porcheville – 78, Saint-Ange-le-Viel – 77.

L'effectif record est obtenu le 12 octobre 2013 à Vignely – 77 avec 93 individus (RPro). À noter également 91 Œdicnèmes criards le 28 octobre 2012 à Isles-les-Meldeuses – 77 (MBan). Ces deux sites accueillent annuellement des effectifs importants en regroupement postnuptial.

Échasse blanche

Himantopus himantopus

L'Échasse blanche se reproduit pour la troisième fois en Île-de-France en 2014 à Neuville, Jaulnes – 77, après le succès de 1995 et 2011 à l'ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine – 77 (MALHER et al., 2017) : 2 couples donnent naissance vers le 1^{er} juillet respectivement à 3 et 4 poussins chacun au sud de l'étang dit la Croix-Saint-Michel de Neuville, en Bassée orientale (PRou, CBra et al.). Il ne reste plus que 4 juv. le 8 août (OLap, VLCa, YMas, JPSi).

L'observation la plus précoce est notée le 29 mars 2012 aux étangs de Corbet, Les Bréviaires – 78 (TCh).

Hormis les nicheurs de Jaulnes, une seule mention estivale, le 18 juillet 2014 à Lesches – 77 (RPro). Sinon, les derniers migrateurs sont notés en 2014, le 11 juin à l'étang des Noés, Le Mesnil-Saint-Denis – 78 (GKer).

Seule mention postnuptiale : 2 ind. du 3 au 8 septembre 2014 aux bassins de Nangis – 77 (CBra, DMau et al.).

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Les mentions hivernales sont rares mais néanmoins régulières, à la faveur des coups de vents, comme le montre la concordance des dates :

- hiver 2011-2012 : 16 le 1^{er} janvier 2012 à l'étang Vieux, Saclay – 91 (CHar) ;
- hiver 2012-2013 : 1 le 28 décembre 2012 à Bazoches-lès-Bray – 77 (FLeg) ;
- hiver 2013-2014 : un groupe de 27 ind. le 7 décembre 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri) et un groupe de 6 ind. le même jour à Varennes-sur-Seine – 77 (AFon) ;
- hiver 2014-2015 : 12 le 21 décembre 2014 à l'ENS des Olivettes, Trilbardou – 77 (OLap, PPer), 31 le même jour à l'étang de l'Arbalète à Grigny – 91 (OPl), 18 le même jour à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (LBoi et al.).

Seulement deux mentions au cœur de l'été : 2 ind. le 20 juin 2013 à Luzancy – 77 (JBot) mais sans suite, et 5 le 9 août 2014 à l'ENS du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine – 77 (OLap, YMas, VLCa).

Effectif maximum : 35 le 10 mars 2012 à l'ENS des Olivettes, Trilbardou – 77 (RPro).

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Le Pluvier argenté reste très rare en Île-de-France. Sur les trois années, il est toujours observé à l'unité, au printemps du 6 mai au 2 juin, en automne du 22 septembre au 7 novembre, uniquement en Seine-et-Marne. Aucune mention hivernale pour ce limicole hivernant sur nos côtes.

Données exhaustives :

- 1 ind. quasi nuptial le 6 mai 2012 au domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (STar, JBot) ;
- 1 le 10 mai 2013 et du 24 septembre au 13 octobre 2014 à Varennes-sur-Seine – 77 (LAlb, CHar) ;
- 1 le 2 juin 2013 au plan d'eau de Ville-Saint-Jacques – 77 (SVin) ;
- 1 ad. le 22 septembre 2013 à Neuville, Jaulnes – 77 (SVin, TJou) ;
- 1 les 10 et 11 mai 2014 à Bazoches-lès-Bray – 77 (EBar, CSei, JCre) ;
- 1 le 1^{er} juin 2014 à Neuville, Jaulnes – 77 (FPouz) ;
- 1 du 4 octobre au 7 novembre 2014 aux bassins de Nangis – 77 (CBra, TBar).

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Deux données extrêmes en période estivale : 1 ind. le 8 juin 2013 à Précy-sur-Marne – 77 (RPro) et 1 ad. le 15 août 2013 à Courcelles-en-Bassée – 77 (TJou).

En attendant la synthèse des comptages concertés d'hivernants coordonnés par F. Malher et M. Zucca, nous ne retiendrons que l'effectif maximal des groupes en hivernage présents dans notre région : 24 000 ind. le 3 janvier 2012 à Ablis – 78, probablement le même groupe estimé à 22 000 ind. environ le 24 janvier à Corbreuse – 91 (LChe).

Pluvier guignard

Charadrius morinellus

Quatre groupes observés en 3 ans, c'est peu alors que l'Île-de-France est sur le passage de l'espèce. Mais sa détection reste toutefois difficile et les labours bien dégagés et en légère surélévation, que le Pluvier guignard affectionne, ne sont pas non plus très nombreux dans notre région fortement urbanisée. Mais l'effort de prospection est surtout insuffisant, notamment en août...

- 4 ind. le 10 mai 2013 aux Fossés rouges, Chatignonville – 91 (TCha) ;
- 5 le 20 avril 2014 à May-en-Multien – 77 (MZuc) ;
- 3 le 22 avril 2014 à Boinville-le-Gaillard – 78 (TCha) et 2 oiseaux différents le lendemain à 300 mètres de là (TCha) ;
- 3 du 8 au 9 mai 2014 à Saint-Escobille – 91 (TCha, BRon, JRoc).

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

En passage prénuptial en 2012 le premier individu est noté le 18 mars à Épône – 78 (PJDu), le dernier à une date très tardive : le 25 juin 2014 à Limay – 78 (JJFr). Un erratique ?

Deux mentions de juvéniles en dispersion en juillet : 1 le 24 juillet 2013 à Nangis – 77 (FLeg, JCre) ; 1 le 23 juillet 2014 à Bazoches-lès-Bray – 77 (PRou).

Globalement sur ces 3 années, le passage postnuptial s'étend entre les dates suivantes : 5 août (en 2014) et 20 octobre (en 2012).

Effectif maximum : 26 ind. le 8 mai 2014 à la carrière de Neuville, Jaulnes – 77 (AMas et TBit).

Petit Gravelot

Charadrius dubius

En 2012, l'arrivée des premiers migrateurs est plutôt tardive : première mention le 17 mars seulement à Luzancy – 77 (JBot). En 2013, l'arrivée est plutôt précoce cette fois : 1 ind. le 3 mars à Achères – 78 (PJDu).

Durant ces trois années, les derniers migrateurs sont observés durant la 3^e décennie de septembre, signalons toutefois la donnée très tardive d'un migrateur le 29 octobre 2013 à Nangis – 77 (JCra).

Le Petit Gravelot est noté nicheur certain sur les communes de : Barbey – 77, Bobigny – 93, Boulogne-Billancourt – 92, Bruyères-sur-Oise – 95, Créteil – 94, Croissy-sur-Seine – 78, Épône – 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Limeil-Brévannes – 94, Luzancy – 77, Le Mesnil-Amelot – 77, Montereau-sur-le-Jard – 77, Palaiseau – 91, Saint-Germain-en-Laye – 78, Souppes-sur-Loing – 77, Saint-Martin-la-Garenne – 78, Triel-sur-Seine – 78, Valenton – 94, Varennes-sur-Seine – 77 et nicheur probable à Bannost-Villegagnon – 77 et Méry-sur-Marne – 77.

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

En attendant la synthèse des comptages concertés d'hivernants coordonnés par F. Malher et M. Zucca, nous retiendrons quelques groupes d'hivernants très importants (>8 000 ind.) :

- entre 8 000 et 10 000 à Ablis – 78 début janvier 2012 (LChev, JPDe) ;
- 10 000 à Roissy-en-France – 95 en janvier 2013 et 8 000 en décembre 2014 (CWal) ;
- 10 000 à Trilbardou – 77 le 21 décembre 2014 (OLap) ;
- 10 000 à Esmans – 77 le 3 janvier 2014 (TJou).

Le Vanneau huppé est noté nicheur probable ou certain sur 40 communes :

Achères – 78, Annet-sur-Marne – 77, Asnières-sur-Oise – 95, Barbey – 77, Bazoches-lès-Bray – 77, Bouafle – 78, Bruyères-sur-Oise – 95, Carrières-sous-Poissy – 78, Cergy – 95, Congis-sur-Thérrouanne – 77, Croissy-sur-Seine – 78, Ecqueville – 78, Égigny – 77, Épône – 78, Flins-sur-Seine – 78, Fresnes-sur-Marne – 77, Grisy-sur-Seine – 77, Guernes – 78, Isles-lès-Villenoy – 77, Jablines – 77, Jaulnes – 77, Lesches – 77, Limay – 78, Livry-sur-Seine – 77, Luzancy – 77, Mareil-en-France – 95, Marolles-sur-Seine – 77, Montesson – 78, Montigny-sur-Loing – 77, Noisy-sur-Oise – 95, Précigny-sur-Marne – 77, Presles – 95, Saint-Martin-la-Garenne – 78, Triel-sur-Seine – 78, Varennes-sur-Seine – 77, Vaugrigneuse – 91, Vignely – 77, Villenauxe-la-Petite – 77, Villenoy – 77, Ville-Saint-Jacques – 77.

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Au passage prénuptial, les dates extrêmes d'observations vont du 1^{er} avril 2012, avec un individu en migration active aux Bréviaires – 78 (SWro), jusqu'au 12 mai 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri, JPMo, CRow).

Au passage postnuptial, 3 individus sont notés en migration au-dessus de Montreuil – 93 dès le 26 juillet 2014. L'individu le plus tardif est vu le 13 septembre 2014 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (FMal, CGlo, FDuc).

Courlis cendré

Numenius arquata

L'espèce est notée de façon éparse toute l'année dans la région. Effectif record : 9 ind. en migration active le 7 mai 2014 à Luzancy – 77 (JBot).

Barge à queue noire

Limosa limosa

En passage prénuptial, les dates extrêmes d'observations s'étendent du 2 mars (en 2012) à Varennes-sur-Seine – 77 (LAlb) au 17 mai (en 2014) à Marolles-sur-Seine – 77 (JGou).

En passage postnuptial un individu est noté dès le 24 juillet

2013 à Jaulnes – 77 (FBra). Les données s'étendent ensuite jusqu'au 9 novembre 2013, date à laquelle le dernier individu est signalé à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (BFRp, CBri, LBoi). Il est intéressant de noter que l'espèce n'est pas observée au passage postnuptial en 2012. Un effectif record de 40 ind. est atteint le 3 août 2013 à Jaulnes – 77 (AFo).

Barge rousse

Limosa lapponica

La grande majorité des données concerne le passage postnuptial, qui s'étend du 31 août 2013 à Nangis – 77 (CBry) jusqu'au 29 septembre 2013 à Congis-sur-Thérrouanne – 77 (AFon, DMal, COLi). Le passage se déroule donc sur une courte période temporelle.

Notons toutefois le contact d'un individu en migration nocturne le 1^{er} novembre 2014 à Saint-Witz – 95 (MZuc).

Effectif record : 3 ind. le 7 mai 2014 à Luzancy – 77 (JBot).

Tournepierrre à collier

Arenaria interpres

Onze données sur la période, en avril-mai et août-septembre.

Effectif record : 3 ind. le 6 septembre 2014 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (SWro, CGlo).

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

Toutes les données concernent le passage prénuptial :

- 1 ind. le 3 avril 2012 à Épône – 78 (GBau) ;
- 1 le 5 juin 2012 à Varennes-sur-Seine – 77 (PRiv) ;
- 1 le 6 mai 2013 à Créteil – 94 (MNo) ;
- 1 le 14 mai 2013 à Saclay – 91 (CHar) ;
- 1 le 19 mai 2013 à Grisy-sur-Seine – 77 (PRou) ;
- 1 le 25 mai 2013 à Fresnes-sur-Marne – 77 (GPas, MZuc, TBit) ;
- 2 le 25 mai 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (SWro, JPMo) ;
- 1 le 2 septembre 2013 à Sonchamp – 78 (TCha) ;
- 1 du 15 au 18 septembre 2013 à Congis-sur-Thérrouanne – 77 (Ther, JBot) ;
- 10 le 8 mai 2014 à Lesches – 77 (TBit, MZuc, JBot), qui se disperseront jusqu'au 14 mai 2014.

Combattant varié

Philomachus pugnax

Quelques observations hivernales :

- 1 ind. le 28 janvier 2013 à Achères – 78 (PJDu) ;
 - au moins 4 le 16 décembre 2014 à Compans – 77 (FMal) ;
- Effectif record : 20 ind. le 1^{er} avril 2012 à Varennes-sur-Seine – 77 (MMSé).

Bécasseau cocorli

Calidris ferruginea

Aucune donnée en passage prénuptial en 2013 et 2014, mais au moins 3 ind. circulant en Seine-et-Marne entre le 29 avril et le 28 mai 2012. Notons par exemple 2 ind. le 4 mai 2012 à Marolles-sur-Seine – 77 (PMig).

Le passage postnuptial s'étend du 7 août 2013 à Nangis – 77 (CBry) au 19 octobre 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (JMou).

Effectif record : 5 ind. le 29 septembre 2013 à Nangis (CBry).



Petit Gravelot © S. Vabre

Bécasseau de Temminck

Calidris temminckii

Le département de la Seine-et-Marne (77) décroche le monopole de l'espèce pour la période de cette synthèse :

- 1 ind. du 2 au 3 mai 2012 puis le 14 mai 2012 à Varennes-sur-Seine (PRiv, LAlb, BLeb) ;
- 1 le 12 mai 2012 à Lissy (JCre, SVin) ;
- 1 le 15 mai 2013 à Marolles-sur-Seine (JBir, MZuc) ;
- 1 le 18 septembre 2013 à Congis-sur-Théroutanne (JBot) ;
- 2 le 4 mai 2014 à Bazoches-lès-Bray (JCer) ;
- 1 du 4 au 8 mai 2014 à Jaulnes (JCre, TJou, JBos, TBit) ;
- 2 le 18 mai 2014 à Villenoy (GPas, SVin, VLCa) ;
- 1 puis 3 du 2 au 8 septembre 2014 à Nangis (JBot, JCre *et al.*) ;
- 1 le 7 septembre 2014 à Jaulnes (SWro, TViv) ;
- 1 le 18 septembre 2014 à Réau (CGou).

Bécasseau sanderling

Calidris alba

Seules 2 données concernent le passage postnuptial :

- 1 jeune du 11 au 15 septembre 2012 à Luzancy – 77 (JBot, THer) ;
- 1 jeune le 14 septembre 2013 à Luzancy (JBot) ;

Le passage prénuptial se concentre quasi essentiellement au mois de mai. Notons toutefois un individu le 31 mars 2012 à Épône – 78 (SVin) ;

Effectif record : 9 ind. le 11 mai 2014 à Jaulnes – 77 (JCre).

Bécasseau variable

Calidris alpina

En passage prénuptial, les observations s'étendent du 3 mars 2012 à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin) jusqu'au 20 mai 2012 à Épône – 78 (CBR).

En passage postnuptial, un individu est noté dès le 13 juillet 2014 à Triel-sur-Seine – 78 (EGro, LBoi). Les données s'étalent ensuite jusqu'en octobre en moyenne. Notons toutefois quelques mentions hivernales :

- 1 ind. du 21 au 29 décembre 2012 à Congis-sur-Théroutanne – 77 (JBot, MZuc) ;
- 1 du 16 décembre 2012 au 9 janvier 2013 à Marolles-sur-Seine – 77 (SVin, TJou, AFon, DLal) ;
- 1 le 6 janvier 2013 à Nangis – 77 (EPer, JCre).

Du côté des effectifs remarquables, soulignons les données de 27 ind. le 5 octobre 2013 et de 29 le 6 octobre 2014 à Nangis – 77 (JCre, TJou), confirmant le potentiel de ce site pour les limicoles, chaque année à cette période.

Bécasseau minute

Calidris minuta

La majorité des données concerne le passage postnuptial, avec tous les individus correspondant à des jeunes.

Cinq données concernent toutefois le passage prénuptial, avec un individu particulièrement précoce stationnant au moins du 18 au 31 mars 2012 à Épône – 78 (PJDu, SVin).

Effectif record : 19 jeunes de l'année le 9 septembre 2014 à Nangis – 77 (JBot, DMal).

Bécasseau de Bonaparte

Calidris fuscicollis

Un individu a été observé le 17 octobre 2012 à Luzancy – 77 (JBot). L'observation de cet oiseau néarctique très rare à l'échelle nationale est remarquable pour la région. Il s'agit de la deuxième mention régionale.

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Bécasseau tacheté

Calidris melanotos

Le site de la Haute-Voie à Nangis – 77 confirme son statut de site privilégié pour cette espèce rare à l'échelle nationale, avec une donnée chaque année :

- 1 le 30 septembre 2012 (JCre) ;
- 1 le 15 mai 2013 (JCre) ;
- 1 jeune du 24 au 29 août 2014 (JCre, JBot, MZuc, TBit, CBry) ;
- 1 nouveau jeune du 6 au 14 septembre 2014 (TBar, MMS, JCre, JBot, SWro, TViv, OLap, BLeb, RPan).

Phalarope à bec étroit

Phalaropus lobatus

Trois données sur la période :

- 1 ind. le 10 septembre 2014 à Nangis – 77 (JCre, JBot, VPon) ;
- 3 du 20 au 23 septembre 2014 à Compans – 77 (FMal, DOma, OLap) ;
- 1 du 27 octobre au 1^{er} novembre 2014 à Saclay – 91 (CHar).

Phalarope à bec large

Phalaropus fulicarius

Une unique donnée sur la période :

- 1 ind. du 10 au 19 février 2014 à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux – 78 (BFro).

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Le limicole le plus commun de notre région y est noté tout au long de l'année.

L'effectif record est de 41 ind. le 7 mai 2013 à Luzancy – 77 (JBot).

Chevalier culblanc

Tringa ochropus

L'espèce est observée tout au long de l'année en Île-de-France.

L'effectif record est de 17 ind. le 1^{er} avril 2013 à Lesches – 77 (TBit). Également 16 le 27 août 2013 à Nangis – 77 (JCre).

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

En passage prénuptial, les premières observations sont effectuées le 14 mars 2012 à Luzancy – 77 (JBot, TBit, STar).

En passage postnuptial, l'espèce est notée jusqu'au 12 octobre 2014 à Varennes-sur-Seine – 77 (CHa).

Une donnée hivernale :

- 1 du 9 au 12 février 2012 à Guyancourt – 78 (PNau, YPau).
- Effectif record : 7 ind. le 15 avril 2014 à Saclay – 91 (CHar) et 7 le 18 avril 2014 à Jaulnes – 77 (JCre).

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

En passage prénuptial, les premières observations sont effectuées le 11 mars 2012 à Marolles-sur-Seine – 77 (PRvi, TBit).

En passage postnuptial, l'espèce est notée jusqu'au 11 novembre 2013 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (BFro).

Deux données hivernales :

- 1 ind. le 22 février 2014 à Saclay – 91 (SWro) ;
- 1 le 20 décembre 2014 à Ville-Saint-Jacques – 77 (CHar).

À noter l'effectif maximal de 35 ind. le 18 avril 2014 à Jaulnes – 77 (JCre).

Chevalier stagnatilis

Tringa stagnatilis

Trois données sur la période :

- 1 ind. le 7 mai 2012 à Ville-Saint-Jacques – 77 (SVin, JBot, PRiv, TBit, JBir, LAlb) ;
- 1 du 13 au 16 avril 2013 à Jaulnes – 77 (TJou, SVin, LAlb, FBra, PRou) ;
- 1 le 6 septembre 2014 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (SWro).

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Au passage prénuptial, le premier individu de l'année est noté le 20 mars 2014 à Lesches – 77 (TBit), alors que les deux derniers sont observés le 9 juin 2014 à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (SWro).

En passage postnuptial, les données s'étendent du 1^{er} juillet 2014 à Jaulnes – 77 (PRO) jusqu'au 11 octobre 2014 à Nangis – 77 (CBry).

À noter 17 ind. le 1^{er} mai 2013 aux Ormes-sur-Voulzie – 77 (FBra, TJou).

Chevalier gambette

Tringa totanus

Le premier individu est noté le 2 mars 2012 à Luzancy – 77 (JBot), alors que le dernier est observé le 30 septembre 2012 à Nangis – 77 (JCre). La fin du passage prénuptial ne peut pas être distinguée du début du passage postnuptial (plus de 20 données en été).

Les effectifs les plus remarquables sont les suivants :

- au moins 100 ind. le 3 août 2012 à Jaulnes – 77 (AFon) ;
- 49 le 27 mars 2013 à Congis-sur-Thérrouanne – 77 (JBot).

Bécassine sourde

Limnocyptes minimus

Certains sites accueillent une population hivernante chaque année :

- 3 ind. en 2012 et au moins 4 en 2013 et 2014 à Luzancy – 77 (JBot) ;
- 3 ind. pendant l'hiver 2012-2013, 1 seul fin 2013 et 3 fin 2014 au marais du Sausset à Aulnay-sous-Bois – 93 (PRou, JGna, WHui) ;
- jusqu'à 5 le 8 décembre 2014 à Saulx-les-Chartreux – 91 (RPan) ;
- jusqu'à 4 le 29 décembre 2014 à Gif-sur-Yvette – 91 (RPan) ;
- au moins 5 le 22 octobre 2014 à Lesches, constituant l'effectif maximal sur la période (JBot).

Globalement, l'hiver 2013-2014 semble être moins bon que les autres pour l'espèce.

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

L'espèce est notée en période de reproduction dans 8 communes, principalement autour des massifs de Fontainebleau – 77 et de Rambouillet – 78 :

L'effectif record est de 10 ind. le 14 juin 2014 à Angervilliers – 91 (BDur).

En hiver, l'espèce est notée jusqu'au cœur des villes (31 données intra-muros), par exemple 1 ind. le 20 mars 2013 sur la place de la Nation, Paris – 75 (GLes). La majorité des observations a lieu en mars (63 données).



Bécasse des bois © D. Stefanescu

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Aucun indice de nidification n'a pu être noté pour cette espèce.

Le passage postnuptial commence dès les 14 juillet en 2013, avec 2 ind. à Jaulnes – 77 (TJou). Le dernier ind. en pré-nuptial est noté le 27 mai 2012 à Sorques – 77 (JCol).

En hiver, l'effectif maximal est observé le 23 mars 2012 à Luzancy – 77 avec au moins 110 ind. (STar). Ce site constitue de loin le plus gros bastion hivernal de l'espèce dans la région.

Labbe pomarin

Stercorarius pomarinus

Un ind. de 1^{re} année fait le bonheur de nombreux observateurs en séjournant du 1^{er} au 19 octobre 2014 sur le grand étang de la base de loisirs de Jablines – 77 (PLPo).

Labbe parasite

Stercorarius parasiticus

Trois observations, toutes postnuptiales (s'étalant du 8 juillet au 13 octobre), non encore validées par le CHR à ce jour : 2 imm. le 8 juillet 2012 photographiés au parc Albert Marquet à Achères – 78 (JGou), puis 1 ad. le 21 juillet 2012 en vol au-dessus de l'étang Laveyssière à Draveil – 91 (YMas) et enfin 1 ind. de 1^{re} année le 13 octobre 2013 en vol au-dessus du parc du Sausset à Villepinte – 93 (JGna).

Labbe à longue queue

Stercorarius longicaudus

Un ind. de 3^e année est observé et photographié le 29 juillet 2013 sur l'étang de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (FCoq).

Sterne naine,

Sternula albifrons

Principalement observée sur les plans d'eau du sud de la Seine-et-Marne, cette espèce arrive au plus tôt dans notre région durant la première semaine de mai et repart fin juillet-début août. Date d'arrivée la plus précoce : un ind. le 1^{er} mai 2012 au Grand Marais à Varennes-sur-Seine – 77 (JPDe). Date la plus tardive un peu en dehors de la période habituelle de présence : 1 ind. de 1^{re} année le 30 août 2014 sur l'étang de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (SWro). Effectif maximum : 5 ind. le 26 mai 2012 en chasse au-dessus du marais d'Épisy – 77 (ALam).

Sterne caspienne,

Hydroprogne caspia

Une seule donnée de cette espèce d'apparition très épisodique en Île-de-France, non validée par le CHR à ce jour : 1 ind. passe en vol vers l'Est le 8 août 2014 au-dessus du marais du Colombier à Varennes-sur-Seine – 77 (ASag).

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

La phénologie du passage de cette espèce est relativement similaire en 2012 et 2014 : l'espèce n'est vue qu'au passage pré-nuptial et très majoritairement en avril et en mai (48 oiseaux sur 13 sites en 2012 et 42 sur 12 sites en 2014, pic de passage 8 ind. le 1^{er} mai 2012 et 9 le 6 mai 2014). En dehors de ces 2 mois, seuls 2 oiseaux sont notés : le 15 juin 2012 à Neuilly-sur-Marne – 93 (OLap) et un début juillet 2012 aux Bréviaires – 78 (JDCo).

En revanche, l'année 2013 est exceptionnelle : au cours du printemps, 90 ind. sont signalés sur 19 sites avec un pic de passage à la mi-avril (20 ind. simultanément le 14 avril), d'autres sont notés en juin, juillet et septembre. Un ind. de 1^{re} année stationne d'abord du 1^{er} au 13 octobre sur le lac de Grigny – 91 (SGui, YMas). Puis, l'année se termine sur 2 records consécutifs d'oiseau tardif :

- un ind. de 1^{re} année est présent le 11 novembre sur l'étang de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 battant le record de 11 jours (TFou, SRol, BFro).
- puis un ind. de 1^{re} année est de nouveau présent du 30 novembre au 3 décembre sur ce même site (BFro) !

Arrivée la plus précoce sur la période : un ind. le 3 avril 2014 sur l'étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (JPDe, VLCa).

Groupes maximaux :

- au moins 15 ind. le 14 avril 2013 sur l'étang de Corbet, Les Bréviaires – 78 (FPou) et encore 9 le lendemain (TCha) ;
- 8 le 6 mai 2014 sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (TFou) ;
- 7 le 21 juin 2013 à Neuville, Jaulnes – 77 (FBra).

Guifette noire

Chlidonias niger

Le passage de cette espèce est toujours plus conséquente au printemps qu'à l'automne : 128 oiseaux contre 45 en 2012, 199 contre 79 en 2013 et enfin 180 contre 52 en 2014.

Le record de précocité pour l'Île-de-France est battu lors de 2 printemps consécutifs : le 8 avril 2012 un premier ind. est détecté au-dessus du plan d'eau de la ferme d'Isle à Grisy-sur-Seine – 77 (MZuc) et en 2013, le 13 avril sur l'étang Vieux, Saclay – 91 (FPou, CHar). L'oiseau le plus tardif, un ind. de 1^{re} année, est vu le 10 novembre 2013 sur la base de loisirs de Moisson-Mousseaux, Mousseaux-sur-Seine – 78 (EGro, FLel) après le stationnement, du 2 au 4 novembre, d'un ind. de 1^{re} année sur l'étang des Grésillons à Triel-sur-Seine – 78 (EGro, FLel, SVin).

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Groupes maximaux :

- 21 ind. le 25 mai 2103 sur le grand étang de la base de loisirs de Jablines – 77 (GPas) ;
- 17 le 12 mai 2012 sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (JPMo) ;
- 11 le 22 mai 2013 sur l'étang Neuf, Saclay – 91 (SVin).




Figure 1 : passage de la Guifette noire *Chlidonias niger* en Île-de-France de 2012 à 2014 (effectifs observés à chaque passage pré-nuptial et post-nuptial)

Guifette leucoptère,

Chlidonias leucopterus

L'espèce d'occurrence très rare en Île-de-France offre pourtant une donnée exceptionnelle d'un groupe de 7 individus le 7 mai 2013 au-dessus de l'étang du Coq à Roissy-en-Brie – 77 (CDeI).

Sterne caugék

Sterna sandvicensis

Une seule donnée de cette espèce maritime très rare en Île-de-France : un individu est en train de pêcher le 15 août 2014 sur l'étang de Pourras, Le-Perray-en-Yvelines – 78 (CLet).

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Présente de mi-mars à fin septembre, cette espèce atteint son effectif maximum fin avril-début mai.

La plus précoce pour la période arrive le 15 mars 2012 sur l'étang Neuf, Saclay – 91 (CHar).

La plus tardive est vue en migration active le 21 octobre 2012 à la croix de Chavaux, Montreuil – 93 (PRou).

Notons, sur la période, la nidification remarquable de l'espèce sur le pavillon insulaire du parc du château de Fontainebleau – 77 (COMOLET-TIRMAN 2013).

Maximum sur les sites de nidification :

- 90 ind. le 17 mai 2014 sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri) ;
- 55 le 22 avril 2012 sur le lac de l'Arbalète à Grigny – 91 (YMas) ;
- 50 le 10 mai 2013 sur le site de Carreau Franc à Marolles-

sur-Seine – 77 (JBot, TBit) ;

- 50 le 30 avril 2012 sur le site de Champmorin à Bazoches-lès-Bray – 77 (GPas).

Sterne arctique

Sterna paradisaea

Un adulte en plumage nuptial est observé le 18 avril 2012 sur l'étang de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (TFou).

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

Les tempêtes successives qui ont frappé la France au cours de l'hiver 2013-2014 sont sans doute à l'origine de la présence de 5 ind. du 8 au 15 février 2014.

- 1 ad. le 8 sur l'étang Vieux, Saclay – 91 (CHar) ;
- 2 ind. de 2^e année le 9 sur l'étang de la Place verte à Grigny – 91 (COli) ;
- 1 ad. le 10 au parc de Sceaux – 92 (GPas, RPan) ;
- 1 ad. le 15 sur le bassin d'aviron de Mantes-la-Jolie – 78 (OPli, GMai).

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

Présente toute l'année, c'est de loin l'espèce de la famille des Laridae la plus notée, récoltant deux tiers des données de cette famille. Elle présente ses effectifs maximaux de fin novembre à fin février, lors des dortoirs hivernaux avec une pointe généralement début décembre puis de fin décembre à fin janvier. Les chiffres maximaux sont atteints sur les 5 principaux plans d'eau-dortoirs d'Île-de-France actuels :

- plus de 15 000 ind. le 8 décembre 2012 sur l'étang de la Justice à Grigny – 91 et plus de 11 000 le 30 décembre 2012 au même endroit (DLal) ;
- plus de 10 000 le 21 janvier 2012 à Trilbardou – 77 (SVin) ;
- régulièrement 10 000 lors des 2 hivers 2012-2013 et 2013-2014 à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri) ;
- 8 000 le 15 janvier 2012 à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux à Mousseaux-sur-Seine – 78 (EGro) ;
- 7 500 le 15 janvier 2012 à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (LAlb).

Les décharges, lieux de nourrissage préférés des laridés, rassemblent elles aussi de nombreuses Mouettes rieuses :

- 3 500 le 23 février 2012 sur la décharge de Soignolles-en-Brie – 77 (JCre) ;
- 3 000 le 18 janvier 2012 dans les champs proches du Centre d'enfouissement technique de Claye-Souilly – 77 (JBot).

Mouette pygmée

Hydrocoloeus minutus

Le passage pré-nuptial s'étire de mi-mars à début juin, avec un pic mi-avril. Il est nettement plus marqué pour cette espèce (95 données pour 178 ind. sur les 3 années) que le post-nuptial qui s'échelonne de début août à mi-octobre (15 données pour 15 ind.).

Un petit afflux est noté au printemps 2014 :

- 38 ind. sont notés le 18 avril sur 6 sites différents dont un groupe de 12 sur le plan d'eau de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (TFou) ;
- 13 ind. (ad. et imm.) le 25 avril sur l'étang Vieux, Saclay – 91 (SVin) constituant le groupe le plus fourni sur la période de 3 ans.

Classiquement, mais à de rares occasions, l'espèce peut être visible en hiver :

- 1 ind. de 2^e année chasse les 21 et 28 janvier 2012 à Luzancy – 77 (JBot) ;
- 1 de 3^e année est vue le 13 janvier 2013 au-dessus des champs au sud des étangs de Saint-Hubert, Le-Perray-en-Yvelines – 78 (SHou) ;
- un ad. et 1 ind. de 2^e année moucheronnent le 16 février 2014 au-dessus de l'étang de la Justice à Grigny – 91 (RPro) ;
- un ad. est posé le 29 novembre 2014 sur le plan d'eau de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 (CBri).




Figure 2 : passage de la Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* en Île-de-France de 2012 à 2014 (effectifs observés à chaque passage pré-nuptial et post-nuptial)

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

L'espèce désormais visible toute l'année n'est cependant présente à l'automne ou en hiver qu'en petit nombre, avec un maximum de 7 ind. le 26 janvier 2013 au parc des Chanteraines à Gennevilliers – 92 (AClé). Les premiers nicheurs arrivent début mars sur les sites de nidification où ils forment des colonies : 46 ind. sont déjà présents le 3 mars 2012 sur le plan d'eau de Ville-Saint-Jacques – 77 (SVin). Un premier pic de présence est noté fin mars-début avril. Puis, après un petit tassement, l'effectif noté remonte pour atteindre un second pic lors de la deuxième semaine de mai, en général un peu moins haut mais représentatif des futurs nicheurs d'Île-de-France. Dès le début juillet, les effectifs diminuent rapidement mais des groupes peuvent encore être présents jusqu'à la fin juillet : encore 22 ind. dont 20 1^{re} année le 27 juillet 2013 à la Grande Bosse, Bazoches-lès-Bray – 77 (RPan, BLeb).

Malgré l'échantillon faible de 3 années, on peut observer une augmentation notable des effectifs de l'espèce au cours de la période. En effet, 202 ind. sont notés au premier pic puis 161 au second, en 2012, 320 puis 460 en 2013. En 2014, la population explose, puisque 810 ind. sont comptabilisés au premier passage, puis encore 585 au deuxième laissant présager une reproduction record. On peut effectivement constater cette évolution directement sur les effectifs de poussins bagués au sein de la colonie de Jablines : 18 sont bagués en 2012, 75 en 2013 mais sans doute le double présents dans la colonie, et enfin 142 en 2014 avec sûrement beaucoup plus de 150 présents (FBou *et al.*).

Les principales colonies sur cette période sont situées en Seine-et-Marne : Jablines dans le nord du département, Merisier / Ville Saint-Jacques, Grande Bosse et le plan d'eau de Motteux en 2014, en Bassée. Preuve de l'expansion de l'espèce, de nouvelles colonies apparaissent ou se renforcent, telle celle de la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 à partir de 2013.

Goéland cendré

Larus canus

Les pics de présence de cette espèce sont très précisément corrélés aux vagues de froid hivernales. La plus intense dure une quinzaine de jours, du 29 janvier au 13 février 2012, et voit l'arrivée à la fin de cette période de nombreux Goélands cendrés : 800 ind. sont dénombrés sur 37 sites différents du 11 au 20 février, parmi lesquels plus de 200 lors des journées des 11 et 12 et encore 120 le 16, dont ce rassemblement notable de 90 ind. sur le grand étang de la base de loisirs de Jablines – 77 (JBot). De même, la donnée maximale sur la période de 100 ind. est relevée le 27 janvier 2013 à Trilbardou – 77 après une période de froid qui avait débuté le 14 (MZuc, TBit). Enfin, une troisième vague de froid, plus longue mais moins intense durant le mois de février 2013, conduit à une donnée de 80 ind. le 23 sur le même site (MZuc). Hormis ces 3 périodes, l'espèce est peu présente puisqu'aucun groupe de plus de 20 ind. n'est dénombré.

Goéland brun

Larus fuscus

Présente principalement en nombre en hiver de début décembre à fin février et parfois jusqu'à fin mars, l'espèce constitue la plupart du temps la majorité des goélands dans les rassemblements maximaux qui sont comptabilisés sur les plans d'eau classiques accueillant les reposoirs de laridés :

- 2 400 ind. le 16 janvier 2013 sur l'étang de la Justice à Grigny – 91 (DLal) ;
- 2 000 le 16 février 2013 à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (OLap, FYve) ;
- 2 000 le 17 février 2012 sur le plan d'eau du domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc) ;
- 1 210 le 13 janvier 2013 à Trilbardou – 77 (MZuc, OLap) ;
- 1 200 le 16 décembre 2012 dans les champs près de la décharge de Soignolles-en-Brie – 77 (FLeg).

Goéland argenté

Larus argentatus

Sous espèce *Larus argenteus*

De même que le brun, cette espèce de goéland, visible toute l'année, se rassemble en hiver de début décembre à mi-mars dans les reposoirs des sites habituels. Cependant, étonnamment, c'est, d'après les données des 3 années, celui des 3 goélands communs qui présente le moins de gros groupes : 13 données de plus 1 000 ind. pour le brun, 5 pour le leucophaea, et seulement 3 pour l'argenté.

- 1 500 ind. le 25 janvier 2013 à Trilbardou – 77 (MZuc) ;
- 1 000 le 18 janvier 2012 dans les champs proches du Centre d'enfouissement technique de Claye-Souilly – 77 (JBot) ;
- 1 000 le 27 janvier 2012 à la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (CBri).

Sous espèce *Larus argentatus argentatus*

Cette sous-espèce nordique du Goéland argenté est peu signalée, seulement 13 données en 3 ans, malgré une bonne représentativité au sein des groupes hivernaux de goélands argentés de début décembre à début février dans les reposoirs de laridés. Elle peut même parfois être majoritaire, comme le 6 janvier 2013 sur l'étang de la Justice à Grigny – 91 où l'on compte un seul *Larus argenteus* parmi 20 *Larus argentatus* (GPas).

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Goéland leucophaé

Larus michahellis

Présente toute l'année et contrairement à la majorité des goélands, l'espèce est représentée en nombre de début juillet à fin novembre, et non en hiver.

- 1 500 ind. le 3 juillet 2012 à Précy-sur-Marne – 77 (JBir) ;
- 1 500 le 15 septembre 2012 dans les champs proches du Centre d'enfouissement technique de Charny, Claye-Souilly – 77 (RPro) ;
- 2 500 le 28 octobre 2012 sur le domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc) ;
- 1 200 le 27 novembre 2013 (JBot) et le 23 novembre 2014 (MZuc) sur le même site.

Le passage printanier, peu détecté d'habitude, est pour une fois visible en 2014, la moyenne annuelle de 280 ind. notés par semaine étant dépassée pendant 3 semaines consécutives en mai :

- 300 ind. le 9 puis 150 le 10 et enfin 122 le 24 sur les Prés du Refuge à Lesches – 77 (OPli, GPas, DMal) ;
- 120 le 18 sur les étangs de Fontenay-le-Vicomte – 91 (BQue) ;
- 160 le 24 dans les champs à Saint-Mesmes – 77 (OLap).

Goéland pontique

Larus cachinnans

L'identification délicate de cette espèce, pourtant présente de fin octobre à fin mars, restait jusqu'à récemment l'apanage de quelques spécialistes laridologues. La période 2012-2014 marque sans doute le début d'une augmentation des observateurs capables d'identifier le Goéland pontique et les 190 données sur 3 ans par une cinquantaine d'observateurs différents en témoignent. Au moins 18 ind. sont signalés lors de l'hiver 2011-2012, une trentaine au cours de l'hiver 2012-2013 puis entre 20 et 25 lors des 2 hivers suivants.

Les faits marquants :

- le 13 février 2012 a lieu la 1^{re} observation du Goéland pontique adulte sur l'île de la dérivation de l'Isle-Adam – 95, noté en hivernage sur ce site chaque année depuis (PTil) ;
- le nombre maximum par donnée sur la période est atteint le 27 janvier 2013 avec 8 ind. (5 de 2^e année, 1 de 4^e année, 2 ad.) sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (GPas) ;
- à trois reprises, 6 ind. sont comptabilisés le 17 janvier 2014, puis le 2 février sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 (TCha, GPas) et enfin le 14 décembre 2014 sur l'étang de la justice à Grigny – 91 (GPas) ;
- un ind. de 2^e année constitue la 1^{re} observation parisienne mais extra-muros de l'espèce, le 16 février 2014 sur le lac Daumesnil (GPas).

Goéland à ailes blanches

Larus glaucoides

Cette espèce n'est observée qu'en hiver, en dortoir, dans des boucles de la Marne. Lors de l'hiver 2011-2012, au moins 3 ind. sont détectés :

- un ind. de 3^e année, est d'abord vu le 15 janvier 2012 à Trilbardou – 77 (MZuc), puis stationne du 28 janvier au 21 mars sur le plan d'eau du domaine régional du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne – 77 (MZuc, SVin, JBot, TBit) ;
- au moins 2 autres ind. différents sont observés sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 : 1 ad. le 12 février accompagné les 15 et 18 d'1 ind. de 2^e année et enfin 1 seul ind. de 2^e année le 19 (EBri *et al.*).

En 2013, seul 1 ind. de 2^e année est observé du 13 au 27 janvier à Trilbardou – 77 (OLap, MZuc, TBit).

Enfin en 2014, 1 ind. de 2^e année stationne sur la base nautique de Vaires-sur-Marne – 77 du 11 (RPro) au 25 janvier (SVin).

Goéland marin

Larus marinus

Espèce d'occurrence rare à l'intérieur des terres. Son identification n'étant pas toujours aisée hors du contexte habituel côtier, seuls les individus suivants ont été acceptés par le CHR :

- 1 ad. est observé posé puis en vol le 21 avril 2012 à Mantes-la-Ville – 78 (GBau) ;
- 1 ind. de 3^e année en mue importante des couvertures est noté le 12 avril 2013 sur le domaine régional de Flicourt à Guernes – 78 (EGro), et revu posé le 14 sur la base de loisirs de Moisson-Mousseaux, Mousseaux-sur-Seine – 78 (PJDu) ;
- enfin, la même année, 1 ind. de 4^e année et un ad. sont observés posés le 12 mai 2013 au port Ilon à Saint-Martin-la-Garenne – 78 (GCar), puis 1 ind. de 4^e année le 30 mai (LBoi), et le 1^{er} juin 2013 au même endroit (CDum, GBaud, SWro).

Pigeon biset

Columba livia f. domestica

Notée sur plus de la moitié des communes franciliennes, cette espèce ne produit que peu d'observations faciles à interpréter. Sa reproduction démarre très tôt : un grand jeune le 22 janvier 2012 (FMal), 2 poussins au nid le 1^{er} février 2013 (PBou), deux très jeunes le 1^{er} mars 2014 (LChe).

Observations de jeunes encore au nid le 6 septembre 2012 (FYve), le 28 août 2013 (VLCa) et le 16 septembre 2014 (FMal). Certains vols correspondent sans doute à des concours de pigeons voyageurs : des groupes sont ainsi observés volant vers le nord ou le nord-est, par exemple : 500 le 10 août 2013 (PMag), 350 le 7 juillet 2012 (JRoc), 1 000 le 28 juillet 2012 (CWal).

En revanche, des groupes de plusieurs centaines notés en hiver correspondent à des groupes au gagnage : 500 ind. le 2 janvier 2013 (OLap) et le 15 décembre 2013 (EPer).

Quelques beaux groupes attirés par la nourriture disponible : 300 ind. sur des silos le 24 février 2013 (GBri) ou des Grands Moulins de Paris à Meaux – 77 le 12 janvier 2013 (JBir).

Pigeon colombin

Columba oenas

Les sédentaires chantent en plein hiver, mais, si les parades commencent très tôt, les juvéniles ne sont pas observés avant le 16 avril (en 2012).

Le dortoir le plus important a été dénombré aux environs de Rocquencourt – 78 et comptait plus de 1 000 ind. le 29 décembre 2012 (JDRa).

En migration active, le plus gros effectif sur une demi-journée s'élève à 94 ind. le 19 octobre 2013 à Doue – 77 (JBot).

Pigeon ramier

Columba palumbus

L'espèce est omniprésente et son activité reproductrice commence très tôt dans l'année : les premiers chants ont été notés respectivement le 1^{er} janvier 2012 (CBri), le 17 février 2013 (SCod) et le 15 janvier 2014 (VLCa). Les derniers l'ont été en septembre. Premiers accouplements le 1^{er} janvier 2012 (DMal), le 19 janvier 2014 (DMal) mais seulement le 23 mars 2013 (FBra) ; encore un le 27 septembre 2014 (YPat).

Les premières constructions de nid sont notées les 28 février 2012 (YPat), 22 mars 2013 (AFet) et 4 février 2014 (YCre) ; la plus tardive le 28 septembre 2013 (CBri).

Des couveuses sont notées le 24 mars 2012 (LChe), le 11 avril 2013 (COLi) et le 7 mars 2014 (MApr). Encore une couvaïson le 31 août 2014 (BDur).

Les envols sont très étalés dans le temps, puisqu'un jeune juste envolé est trouvé le 20 mars 2012 (FJig), et un autre tombé du nid, le 25 mars 2012 (JCBe) ; un jeune tombé du nid le 5 avril 2013 (JCBe) et un jeune prêt à s'envoler le 17 avril 2014 (NBar).

Encore un jeune non émancipé le 22 septembre 2012 (CLet), un jeune non volant le 24 septembre 2013 (RPro) et un jeune de 2 semaines tombé du nid le 24 octobre 2014 (LChe).

La région est le théâtre de passages migratoires parfois impressionnants : les plus beaux, et de loin, ont été relevés le 21 octobre 2012 à la butte de Doue – 77, avec 200 000 ind. pour la journée (JBot et TBit) plus 95 000 au total les 19 et 22 octobre 2012 (JBot). Les autres années, les effectifs

comptés en un jour au même endroit n'ont pas dépassé 34 000 en 2013 (le 3 novembre JBot) et 15 000 en 2014 (1^{er} novembre JBot).

Le plus gros dortoir était formé de 10 000 ind. à Pontault-Combault – 77 le 9 novembre 2013 (VLCa) et la plus grosse bande se nourrissant dans les champs comptaient 5 000 ind. à Presles-en-Brie – 77 (OLap) le 17 janvier 2013.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

À Paris – 75, où elle reste rare, sa reproduction n'est notée qu'au square Saint-Antoine le 6 avril 2013 (FYve) et au parc Montsouris le 5 mars 2013 (YGes).

Quelques rassemblements importants sont notés à partir de fin septembre ; par exemple, en se limitant aux groupes de plus de 100 ind. :

- 160 ind. à Villepreux – 77 aux abords d'une ferme au lieu-dit le trou Moreau le 25 septembre 2013 (JDRa) ;
- 150 à Guernes – 78 le 26 septembre 2014 (EGro, FLeI) ;
- 111 à Jouy-en-Josas – 78 le 7 novembre 2012 (SVin) ;
- 102 à Varennes-sur-Seine – 77 le 17 novembre 2013 (SVin).

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Les premières arrivent entre le 12 et le 15 avril, selon les années ; mais en 2013 l'une d'elles, plus pressée, est notée dès le 7 avril au marais du Rabuais à Morionville – 95 (JFMa). Les arrivées s'étalent jusqu'à la mi-mai. Les preuves de nidification sont difficiles à obtenir, la plus courante pour une nidification probable étant la parade ou la construction d'un nid, observée pour cette dernière sur les communes de Dagny – 77, Nangis – 77, Jablines – 77, Banthelu – 95, Jaulnes – 77, Pommeuse – 77. Le nourrissage de juvéniles n'est observé que le 28 juin 2014 au sommet d'un arbre à Sansalle, Brie-Comte-Robert – 77 (OLap), et indirectement (transport



Goéland pontique de l'Isle-Adam © P. Tillier

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

de nourriture en vol) le 22 mai 2014 à Saulx-les-Chartreux – 91 (RPan). Sur ce site, un adulte est observé transportant une coquille vide le 1^{er} juin 2014 (OSol) : les jeunes grandissent, il faut faire de la place !

L'espèce ne semble plus nicher en petite couronne, à l'exception possible des bassins de rétention de Tremblay-en-France – 93 (JCBé) et de la ballastière de Limeil-Brévannes – 94 (FMal), elle est à confirmer à Thiais – 94 (FBoh *et al.*), la Queue-en-Brie – 94 et Villeneuve-le-Roi – 94 (RPRo). Les travaux pour l'*Atlas du Grand Paris*, coordonnés par le Corif, devront préciser cette tendance. Les derniers migrateurs quittent notre région la dernière décade de septembre (le 20 en 2012, le 29 en 2013, le 19 en 2014) ; toutefois, un individu migrateur est noté en vol sud le 24 octobre à Montreuil – 93

Coucou gris

Cuculus canorus

Les plus précoces de la période sont signalés, en 2012, dès le 18 mars à Villiers-sous-Grez – 77 (SMac) et le 19 mars à Congis-sur-Thérouanne – 77 (RHuc). Les coucous arrivent relativement tôt cette année-là puisque, en 2013, le premier est vu le 1^{er} avril à l'étang de Corbet, Les Bréviaires – 78 (GLes) et, en 2014, le 24 mars au carrefour d'Épernon à Poigny-la-Forêt – 78 (JRoc). L'espèce arrive majoritairement à la mi-avril et elle est bien détectée jusqu'à la 3^e semaine de juin. Les adultes partent dès le début juillet ; les données, essentiellement des jeunes, chutent alors sensiblement à partir de cette période jusqu'à mi-août, les suivantes étant très occasionnelles. Le plus tardif est noté le 22 septembre 2013 au carrefour du Rapport à Fontainebleau – 77 (EDec).

Effraie des clochers

Tyto alba

Entre 2012 et 2014, les mentions d'Effraie des clochers dans la région connaissent une diminution importante : pas moins de 80 % des observations sont ainsi concentrées entre janvier 2012 et avril 2013. On constate plus particulièrement une chute drastique des effectifs en avril-mai 2013 : on passe de 29 données en mars à seulement 3 de juin à septembre, soit moins d'une par mois.

Si les effectifs de l'espèce présentent souvent des variations interannuelles, on observe ici un effondrement très brutal. Celui-ci pourrait s'expliquer par la météorologie du printemps 2013 : les précipitations et le froid exceptionnels ayant sévi en mars et avril semblent corrélés à la période de diminution des données et pourraient donc en être une cause. Ils pourraient, par exemple, avoir anéanti les populations de micromammifères, ou rendu les conditions de chasse et de survie beaucoup plus complexes. Une étude a par ailleurs pointé une plus grande sensibilité au froid de l'Effraie, comparé à d'autres espèces de rapaces nocturnes, ainsi que de plus fortes dépenses énergétiques à la mauvaise saison : elle pourrait donc avoir été plus durement impactée (MASSEMIN et HANDRICH,

1997). En 2012, la nidification de l'espèce est certifiée sur Faune Île-de-France dans neuf communes : Bonnelles – 78, Choisel – 78, Flagy – 77, Héricy – 77, Les Granges-le-Roi – 91, Saint-Chéron – 91, Saint-Mars-Vieux-Maisons – 77, Savins – 77 et Us – 95. Les autres années, une seule mention certaine est recensée, à Genainville – 95 en 2012 (BBos). On ne trouve des données probables que dans quatre communes (à Andelu, Gambaiseuil et Hermeray dans les Yvelines et Courdimanche dans le Val-d'Oise). En fait, les observations comportant des codes atlas représentent moins d'un cinquième des données, soit en moyenne deux fois moins que pour les autres rapaces nocturnes sédentaires : pour la période 2012-2014, les informations concernant la nidification de l'Effraie des clochers en Île-de-France demeurent donc assez lacunaires.

On note 13 mentions de l'espèce en petite couronne, mais ce bon « score » est lié à l'hivernage d'un individu dans le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine – 94, qui fait l'objet de 12 données entre le 13 décembre 2012 et le 5 février 2013 (YAtt, ALam). On en compte aussi deux dans Paris intra-muros :

- 1 ind. trouvé mort près de la gare de l'Est le 26 novembre 2012 (BRog) ;
- 1 en vol au niveau de la porte de Clignancourt le 1^{er} novembre 2013 (LLav).

Au moins 52 mentions sur les 264 enregistrées entre 2012 et 2014 concernent des individus trouvés morts (quasi exclusivement par collision routière), soit 20 % des observations. C'est au moins 4 fois plus que pour les autres espèces de rapaces nocturnes : l'Effraie est donc clairement l'espèce la plus victime du trafic routier dans notre région, proportionnellement à sa population.

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Entre 2012 et 2014, l'effort de prospection des membres du réseau Chevêche a été variable : 276 communes prospectées en 2012, 195 en 2013 et 271 en 2014. De fait, le nombre de communes où l'espèce a été recensée (151 en 2012, 94 en 2013, 177 en 2014) et le nombre de sites trouvés (358 en 2012, 247 en 2013, 427 en 2014) sont également variables. Le nombre de couples est relativement stable : 139 couples observés en 2012, 140 en 2013 et 153 en 2014.

Chouette hulotte

Strix aluco

Aucune évolution ou tendance particulière ne se dessine sur la période 2012-2014 pour la Chouette hulotte.

Les mentions comportant un indice de nidification représentent presque 40 % du total, mais les trois quarts d'entre elles sont relatives à un statut de nicheur possible seulement. La reproduction est considérée comme certaine dans 41 communes, réparties dans l'ensemble des départements franciliens excepté le Val-de-Marne – 94 (qui est d'ailleurs également le seul à ne pas compter de code « probable »). La nidification est constatée au plus tôt à Saint-Just-en-Brie – 77 le 22 mars 2012 (JBot) et au plus tard à Richarville – 91 le 26 juillet 2013 (BLeb), mais 80 % des observations sont comprises entre le 10 mai et le 15 juillet.

En petite couronne, l'espèce reste assez répandue et régulièrement contactée. La nidification est certifiée dans les Hauts-de-Seine – 92 à Sceaux le 8 mai 2013 et à Châtenay-Malabry les 20 et 21 juin 2014 (BLeb), et en Seine-Saint-Denis – 93 à Sevran le 5 juillet 2014 (JFMa).

Sur la période étudiée, Paris recueille 53 mentions. Le bois

de Boulogne recueille 13 données (25 %), celui de Vincennes 28 (50 %) et Paris intra-muros 12 (25 %) réparties dans trois arrondissements :

- le VI^e au jardin du Luxembourg en 2012 et 2014 (OPat, OBoi) ;
- le VII^e à l'hôtel des Invalides et au musée Rodin, mais aussi aux abords du Champ de Mars, en 2012 et 2014 (JDLi, OLGa, FDuc, OPat) ;
- le XIX^e au parc des Buttes-Chaumont, au cimetière de la Villette et au quartier d'Amérique en 2012 et 2013 (FMal, TRab).

Un tiers des observations parisiennes sont dotées d'un code atlas. On compte deux codes « certains » : un au bois de Boulogne, où un individu a été observé en compagnie de 3 jeunes le 28 mars 2014 (MSit), et un, intra-muros, au cimetière de la Villette le 20 mai 2012 (TRab), avec 2 jeunes notés. Cette seconde donnée constitue la dernière mention de nidification certaine de l'espèce intra-muros recensée sur Faune Île-de-France : sa régression semble donc se poursuivre. Les seize codes restants sont tous des « possibles » : on en compte 10 au bois de Vincennes, 1 au bois de Boulogne (bien moins prospecté) et 5 intra-muros, dans les secteurs des Invalides et du jardin du Luxembourg.

Enfin, un effectif remarquable de 7 individus est noté le 7 janvier 2012 au bois de Vincennes (SDBr). Pour comparaison, le maximum recensé en Île-de-France sur toute la période étudiée est un minimum de 10 individus à Saint-Martin-la-Garenne – 78 le 4 août 2012 (GBau).

Au moins 59 mentions sur 2 143 concernent des individus trouvés morts (majoritairement par collision routière), soit environ 2,5 % des données.

Hibou moyen-duc

Asio otus

Pour la période 2012-2014, les mentions de Hiboux moyens-ducs rapportées sur Faune Île-de-France sont variables en nombre. 2012 est ainsi une bonne année pour l'espèce et concentre 40 % des observations de la période, tandis que 2013 et 2014 sont des années aux effectifs « normaux », dans la moyenne.

On peut aussi et surtout remarquer que l'année 2013 semble avoir été particulièrement mauvaise pour la nidification. Seules deux observations indiquent des nicheurs probables ou certains : c'est en moyenne 20 fois moins que les deux autres années ! Alors qu'un pic de données est souvent observé d'avril à juin, on note au printemps 2013 un lent déclin des observations de l'espèce, aboutissant à une absence totale de mentions en octobre et novembre. Si ce déclin rappelle bien évidemment celui de l'Effraie des clochers à la même période, le Hibou moyen-duc va retrouver des effectifs normaux dès l'année suivante et des adultes sont tout de même observés durant toute la période de nidification 2013. La météorologie du printemps 2013 pourrait donc également avoir eu un impact négatif sur le Hibou moyen-duc, mais moindre que celui constaté chez l'Effraie.

Près de 45 % des observations sont accompagnées d'un code atlas, et plus de la moitié de celles-ci font l'objet d'un code « probable » ou « certain », ce qui est très positif. Bruyants, les jeunes sont souvent plus faciles à repérer que ceux des autres espèces de rapaces nocturnes, ce qui peut expliquer cette proportion importante. La nidification est ainsi prouvée dans 40 communes, soit presque autant que pour la Chouette hulotte, qui pourtant compte 6 fois plus de données. En 2012 les mentions, à l'exception d'une, s'étalent du 5 avril à Roissy-



Chouette hulotte © A. Bloquet

en-France – 95 (JCBe), au 4 août à Rennemoulins – 78 (CBri), et sont particulièrement concentrées entre le 10 mai et le 20 juin.

Une observation se distingue par son extrême précocité : un couple avec deux jeunes poussins est en effet noté le 31 janvier 2012 à Roissy-en-France – 95 (JCBe) ! Le plus faible a été transféré au CEDAF de Maisons-Alfort – 94 tandis que le second a été retrouvé mort le 17 février. Il s'agit peut-être du couple détenteur du précédent record de précocité sur la période, cité plus haut.

Le Hibou moyen-duc est observé dans l'ensemble des départements de la petite couronne, avec une donnée dans le 92 à Boulogne-Billancourt le 28 février 2013 (JGou), 3 dans le 93, au parc départemental Georges Valbon de la Courneuve (FElb) et au parc du Sausset (MRoi), et pas moins de 23 dans le 94, ce qui s'explique par la nidification d'un couple au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, où 3 jeunes ont été vus entre le 13 mai et le 1^{er} juillet 2014 au moins (YAtt, RPan, OPli, APic). Une mention parisienne : un adulte trouvé mort près de la station de métro Glacière en mai 2013 (RPan).

Du côté des dortoirs, l'effectif le plus important est noté à Saint-Pathus – 77, avec 12 ind. le 30 novembre 2012 dans un saule pleureur (LCha). Autre beau score : 8 à 11 ind. sont rapportés selon les jours à Sonchamp – 78 entre le 16 décembre

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

2012 et le 17 mars 2013 (SWro, PCra, CDes).

Au moins 20 mentions concernent des individus trouvés morts, uniquement par collision avec un moyen de transport, soit à peu près 5 % des données.

Hibou des marais

Asio flammeus

Les effectifs franciliens de Hiboux des marais subissent d'assez fortes variations pour la période étudiée : on compte ainsi 202 mentions en 2012, 142 en 2013 et 44 en 2014. Ces changements sont, cette fois-ci, tout à fait typiques de l'espèce, dont l'abondance est fortement liée à celle des micromammifères (KORPIMAKI et NORRDAHL, 1991). Ainsi, si une baisse des observations est également relevée pour cette espèce au printemps 2013, celle-ci est attribuable au départ des hivernants et s'observe les deux autres années à la même époque.

La période 2012-2014 est surtout marquée par un événement majeur : le premier cas de reproduction certain du Hibou des marais en Île-de-France, en 2012 à Sonchamp – 78 ! Après un hivernage important de l'espèce dans le secteur et une présence de 4 ind. durant tout le printemps, un premier couple élevant 2 jeunes est découvert fin mai, puis le nid d'un second couple est localisé à proximité courant juin (LChe) sans que l'on puisse voir les jeunes (CHEVALLIER, 2013). Aucun autre cas de nidification n'est mentionné en dehors de celui-ci. L'espèce est également notée assez régulièrement en petite couronne, dans tous les départements (5 observations dans le 92 et le 93, 4 dans le 94). Les données sont toutes concentrées en période migratoire, notamment en octobre (50 % des observations) et concernent toujours des individus à l'unité et souvent en migration active, mais aussi quelquefois en halte ; dans ce dernier cas, la durée du stationnement ne dépasse jamais une journée. Paris n'est pas en reste avec 5 mentions, toutes d'individus en pleine migration : 2 au passage prénuptial (QDub, ALam) et 3 au postnuptial (GLes, YGes, YAtt).

Le plus grand effectif recensé est d'au moins 12 ind. au dortoir à Sonchamp – 78 le 3 et le 29 janvier 2012 (LChe). Cette commune est, avec celle voisine d'Ablis – 78, la seule à dépasser les 10 ind. en 2012 comme en 2013. L'autre secteur à rassembler des effectifs conséquents est l'aérodrome de Melun-Villaroche à Montereau-sur-le-Jard – 77, avec un maximum de 8 ind. le 11 Janvier 2012 (JCre, TBit). Aucun autre site ne dépasse les 5 ind. pendant la période étudiée. Ces scores sont assez exceptionnels, les hivers 2011-2012 et plus minoritairement 2012-2013 ayant, semble-t-il, été parmi les meilleurs jamais recensés pour l'espèce dans la région ces 30 dernières années (LE MARÉCHAL *et al*, 2013).

Deux mentions concernent des individus trouvés morts : un par collision routière à Ablis – 78 le 21 février 2013 (TCha) et un de cause inconnue (morceau d'aile retrouvé) à Flins-sur-Seine – 78 le 16 avril 2013 (OPai). Cela représente approximativement 0,5 % des données, ce qui est assez logique : l'espèce est rare, donc les contacts d'oiseaux morts le sont également.

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Le plus précoce de la période est relevé le 15 avril 2013 dans une parcelle close (ZNP) du parc de Sceaux – 92 (BLeb). L'espèce, qui arrive principalement à partir de la deuxième semaine de mai, présente un pic de présence ou de détection de mi-juin à début juillet. Les plus gros chiffres sont notés sur les sites de nidifications, telles ces données de 10 ind. sur le plateau de Coquibus les 15 juin puis 5 juillet 2013 à Milly-la-Forêt – 91 (MmSé, TViv). Il devient occasionnel après début août. Le plus tardif est vu en vol en soirée le 5 octobre 2013 à la fontaine Saint-Martin, Saint-Cyr-l'École – 78 (JdRa).

Martinet noir

Apus apus

Observé dans 60 % des communes de la région. Les retours les plus précoces ont été notés les 5 avril 2012 (RHuc), 9 avril 2013 (SBoi) et 6 avril 2014 (THer).

Les premiers accouplements ont été notés le 4 mai 2012 (COLi), le 13 mai 2013 (JdRa) et le 8 mai 2014 (DMal). La seule date un peu précoce d'un nourrissage est le 29 mai 2012 (NBar).

Les derniers individus ont été observés le 1^{er} octobre 2012 (FTho) (et 16 observations en septembre de cette même année), mais seulement dès le 7 septembre 2013 (JME) et le 6 septembre 2014 (DThs). L'année 2012 s'est donc caractérisée par des arrivées plus précoces et des observations plus tardives que les 2 autres années de notre synthèse.

Huppe fasciée

Upupa epops

Une donnée hivernale surprenante est notée le 2 février 2013 à Morsang-sur-Orge – 91 (JYBa). Plus classique mais précoce, la première des migratrices est notée le 24 mars 2013 à la plaine de Sorques, Montigny-sur-Loing – 77 (SAun). L'espèce arrive principalement à partir de la mi-avril et repart dès le début août. L'individu le plus tardif, peut-être un oiseau malade, est observé le 21 octobre 2012 à Saint-Hilarion – 78 (JCon). Une famille comportant deux adultes et trois jeunes est suivie à partir du 5 juin 2012 dans la plaine de Chanfroty, Arbonne-la-Forêt – 77 (BLeb, CAlex, MmSé).

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Les plus précoces de la période sont un groupe de 4 ind. observés le 7 mai 2014 à Milly-la-forêt – 91 (CDes). L'espèce arrive principalement à partir de la deuxième semaine de mai et repart dès le début août. Les plus tardifs sont vus en migration :

- 6 ind. le 21 septembre 2012 à Courcelles-en-Bassée – 77 (TJou) ;
- 1 le 24 septembre 2012 à Gazeran – 78 (JFla).

Les groupes les plus importants sont signalés :

- sur les sites de nidification de l'Essonne – 91, 18 ind. le 27 mai 2013 à Vayres-sur-Essonne (FGas), 14 le 18 mai 2013 à Milly-la-Forêt (CGau) ;
- en migration, 15 ind. vers le nord le 17 mai 2013 à Signy-Signets – 77 (MZuc).

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

L'espèce résidente est notée tout au long de l'année avec un pic de présence à l'occasion du passage post-nuptial de mi-

août à début octobre : le nombre maximum sur un même site atteint 9 ind. durant cette période le 20 août 2014 sur les étangs de pêche d'Épisy – 77 (ALov). La moyenne de 40 ind. notés hebdomadairement sur l'année est largement dépassée, atteignant plus de 100 ind. en septembre 2014 (125 la deuxième semaine) et lors de la première semaine d'octobre 2013.

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

L'observation la plus précoce est celle d'un individu le 1^{er} avril 2014 à l'hippodrome de la Solle à Fontainebleau – 77 (SDet). Le massif de Fontainebleau fournit le gros des données (185). La nidification est certaine avec 2 jeunes volants dans la plaine de Chanfroy, le 29 juillet 2012 (DTho) et le 30 juin 2013 (SHou). La nidification est probable en 2013 à la réserve biologique de Fontainebleau (RPro) et en 2014 à la plaine de Macherin (YMas). En dehors du massif, elle est également probable en 2012 à la mare à l'Étoile à Chenoise – 77 (JBot), L'automne 2014 sera marqué par la présence d'un individu très photogénique aux jardins des Grands-Moulins-Abbé-Pierre de Paris – 75 du 2 octobre (IGir) au 18 octobre (GMai *et al*). Il fournit les données les plus tardives enregistrées sur Faune Île-de-France (requête du 17 janvier 2017).

Pic cendré

Picus canus

Aucune donnée validée pour cette période.

Pic vert

Picus viridis

Le pPic vert est le pic qui fournit le plus de données pour les trois années (plus de 15 000) sur 885 communes.

Il est nicheur sur l'ensemble des départements de la région, mais la nidification est certaine dans seulement 49 communes. Une seule tentative de nidification à Paris d'un couple au parc Montsouris, mais 2 jeunes sont trouvés morts le 20 mai 2012 à proximité du nid (YGes).

Les premiers jeunes sont observés le 30 mai 2014 à Boissy l'Aillerie – 95 (BBos) et à Feucherolles – 78 (JFla).

Pic noir

Dryocopus martius

La nidification est certaine dans 19 localités. Les 2 premiers jeunes à l'envol sont notés le 12 mai 2012 au parc de la Poudrerie, Sevran – 93 (OHep).

L'espèce est observée dans les deux bois parisiens et la nidification est probable au bois de Vincennes, avec la fréquentation d'une loge le 08 avril 2012 (RHoc) et le 8 juin 2013 (GLes).

Pic mar

Dendrocopos medius

Ce pic est contacté dans 283 communes, mais la nidification n'est certaine que dans 23 d'entre elles.

Dans les deux bois parisiens, le Pic mar n'est pas noté pendant la période de reproduction ; deux ind. observés au bois de Vincennes le 23 mars 2013 (VTan) constituent les arrivées



Torcol fourmilier © O. Laporte

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

les plus tardives. En période postnuptiale, le premier individu est vu au Parc floral, Bois de Vincennes, le 20 août 2012 (Blot). À Paris intra-muros un ind. est retrouvé mort, le 16 juin 2014, rue de la grange aux Belles dans le X^e arrondissement (MGra).

Pic épeiche

Dendrocopos major

Le Pic épeiche est observé dans 798 communes. Le premier jeune est noté le 16 mai 2012 porte de la Muette, Paris – 75 (FMal). L'espèce est nicheuse certaine dans 119 communes.

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Ce pic est noté dans 338 communes. La discrétion du Pic épeichette explique peut-être le faible nombre de données de nidification : celle-ci est certaine sur 8 communes. Des jeunes sont notés à Paris intra-muros à la station de RER Port-Royal le 25 mai 2014 et au cimetière du Père-Lachaise le 15 juin 2014 (CGlo), ainsi qu'à l'arboretum de Verrières-le-Buisson – 91 le 31 mai 2014 (APic).

Perruche à collier

Psittacula krameri

Sur l'ensemble des trois années, l'espèce a été observée dans 23,9 % des communes d'Île-de-France (soit 306 sur 1 280) et des indices de reproduction ont été relevés dans 10,8 % d'entre elles, mais les proportions varient beaucoup selon les départements : la Seine-et-Marne est de loin la moins concernée (respectivement 6,6 % et 1,9 %), les Yvelines le sont relativement peu (16,0 % et 6,9 %), l'Essonne (37,2 % et 16,8 %) et le Val-d'Oise (29,7 % et 10,8 %) sont proches de la moyenne tandis que les trois départements de petite couronne sont les plus occupés par cette espèce (82,1 % et 45,5 % des communes sur l'ensemble des trois départements). Paris héberge des perruches nicheuses aussi bien dans le bois de Vincennes qu'intra-muros, mais apparemment pas encore au bois de Boulogne.

La reproduction de cette espèce est précoce : les premiers accouplement ont été notés le 28 janvier 2013 et le 8 janvier 2014 (YGes). Les premiers perruchons apparaissant « à la fenêtre » ont été notés à Paris les 16 mai 2012, 7 mai 2013 et 29 avril 2014 (YGes), mais un premier jeune à peine volant a été observé à Grigny – 91 dès le 18 avril 2014 (YMas). Le jeune le plus tardif a été observé dans sa loge le 12 juin 2012 à Paris – 75 (YGes).

Espèces issues de captivité ou supposées comme telles catégorie D et E

selon le nouvel ordre taxonomique des familles d'oiseaux (Commission de l'avifaune française, 2016)

Dendrocygne fauve

Dendrocygna bicolor

Pour l'anecdote, de petits groupes d'oiseaux captifs sont signalés à Paris, square des Batignolles, avec reproduction : 5 ad. et 3 juv. le 24 août 2013 (MApr). Vu à l'unité en trois autres localités.

Dendrocygne veuf

Dendrocygna viduata

Un le 23 février 2014 au lac de la Station au Vésinet – 78 (SWro). Oiseau d'ornement.

Cygne noir

Cygnus atratus

Une dizaine d'individus posés sont vus « depuis le TGV » au chemin de Montereau à Barbey – 77 le 16 mars 2013 (JCB), effectif le plus élevé pour la période. Par ailleurs, 9 ind. à l'étang Vieux de Saclay – 91 (2 ad. et 7 petits) le 27 juin 2014 (CHar).

La nidification est notée aussi à Grigny – 91 (lac de l'Arbalète et étang de la Place verte, à côté), où l'on compte jusqu'à 7 ind. (couple + 5 jeunes) le 1^{er} mai 2012 (YMas, QDub, YAtt). Ailleurs, pas d'effectifs supérieurs à 4 ind., comme à Paris au parc Montsouris, où l'espèce s'est reproduite en 2014 : 1 couple captif et 2 poussins le 22 avril 2014 (YGes).

Oie cygnoïde

Anser cygnoides

Quelques sites hébergent une population d'au moins 10 ind. :

- 11 en janvier 2012 (COLi, DMal), au parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi - 94 ;
- 11 à 12 en 2013 et 2014 à Guyancourt – 78 (PNau, YPat, AMau) ;
- 39 à la base de loisirs d'Etampes – 91 le 13 mai 2014 dont 7 petits (BDur).

Oie des neiges

Anser caerulescens

Un ind. le 29 juin 2012 à Chilly-Mazarin – 91 (GKec), non sauvage.

Oie à tête barrée

Anser indicus

Cette espèce d'origine asiatique est notée ça et là. Elle se reproduit au parc Montsouris à Paris – 75 mais en produisant des hybrides avec une Bernache nonnette. Le 16 septembre 2012, 14 ind. sont notés dont 10 juv. hybrides (IGir). Une autre reproduction est notée à Grigny – 91, au lac de l'Arbalète, avec 1 couple et 3 oisons les 22 et 23 avril 2014 (YMas, MApr), mais aussi en 2012 avec, le 2 juin, 2 ad. et 1 poussin (GPas) sur le même site. Ailleurs, pas plus de 2 ind. notés.

Céréopse cendré

Cereopsis novaehollandiae

Pour l'anecdote, 1 même ind. non sauvage observé les 16 et 20 août 2014, respectivement à la Gravière du château d'eau

à Marolles-sur-Seine – 77 et au Merisier à Varennes-sur-Seine – 77 (TJou, BLeb).

Canard carolin

Aix sponsa

Espèce d'origine américaine utilisée comme oiseau d'ornement. Jusqu'à 6 ind. comptés sur un site avec 3 couples le 12 février 2012 au lac de la Station au Vésinet – 78 (CBri). Pas de reproduction certaine notée en 2012-2014. Mais l'espèce a déjà niché antérieurement en Île-de-France : dernière preuve en 2009 (MALHER *et al.*, 2017).

Canard de Barbarie

Cairina moschata

Espèce domestique vue en divers sites. Reproduction à Créteil – 94, avec 2 couples et 4 canetons le 19 mai 2012 au Halage (COLi, OPli) et, plus étonnant, 4 canetons en duvet jaune le 5 novembre 2012 à l'Île Sainte-Catherine (OPli). Reproduction aussi en 2013 et 2014 sur ce site.

Canard à collier noir

Callonetta leucophrys

L'espèce (introduite) n'est vue qu'à l'unité (mâle ou femelle) sur quelques sites.

Canard de Chiloé

Anas sibilatrix

Jusqu'à 4 ind. au square des Batignolles à Paris – 75 le 10 juin 2012 (ALam), incapables de voler ; 1 au bassin de Trévoix à Bruyères-le-Châtel – 91 le 25 juillet 2014 (NBar).

Canard des Bahamas

Anas bahamensis

Cette espèce exotique introduite est présente en divers endroits en région parisienne. Maximum de 10 le 12 février 2012 au lac de la Station au Vésinet – 78 (CBri).

Sarcelle bariolée

Anas versicolor

Une le 6 avril 2014 à la base de loisirs de Jablines – 77 (RPro) et une du 11 au 13 octobre 2014 au Treille du Roi à Fontainebleau – 77 (EDec) pour cette espèce exotique.

Sarcelle hottentotte

Anas hottenta

Un ind. est présent du 7 au 27 septembre 2013 au fond Fortin à Mitry-Mory – 77 et 1 le 18 octobre 2013 (JCBe) aux bassins de rétention de Tremblay-en-France – 77 (JCBe). Espèce d'ornement d'origine africaine.

Nette demi-deuil

Netta peposaca

Espèce exotique d'ornement vue en quelques sites d'Île-de-France. Jusqu'à 8 ind. (4 couples bagués), au lac de la Station au Vésinet – 78 le 12 février 2012 (CBri).

Harle couronné

Lophodytes cucullatus

Un mâle adulte est signalé à l'île de la Cohue à l'Isle-Adam – 95 du 21 janvier 2012 au 1^{er} juin 2013 (divers observateurs), sans doute non sauvage.

Faisan argenté

Lophura nycthemera

Pour cette espèce d'ornement, 1 ind. le 23 mars 2013 à Jutigny (Les Justices) – 77 (FYve).

Faisan versicolore

Phasianus versicolor

Des individus sont trouvés à l'unité en quelques sites et 2 ensemble le 15 septembre 2012 à la Saussaie à Theuville – 95 (BBos) et le 10 février 2013, avec 1 couple au lavoir de Guigneville-sur-Essonne – 91 (VDur).

Paon bleu

Pavo cristatus

5 individus non sauvages sont comptés le 10 septembre 2012 au niveau des îles du lac Daumesnil, bois de Vincennes à Paris – 75 (DMal). (PRou).

Tourterelle rieuse

Streptopelia roseogrisea

Une Tourterelle rieuse ou hybride (mais chantant comme la rieuse) est notée du 20 mai au 17 juin 2013 au parc Chauchard à Versailles – 78 (SWro).

Inséparable de Fisher

Agapornis fisheri

Mention d'un ind. le 1^{er} septembre 2013 au Pecq – 78 (PHur).

Inséparable masqué

Agapornis personatus

Mention d'un ind. probablement de cette espèce les 25 et 27 décembre 2012 à Garges-lès-Gonesse- 95 (FEIB).

Inséparable rosegorge

Agapornis roseicollis

Des individus isolés observés le 24 mars 2013 à Montreuil – 93 (DThs, PRou et GMai), les 30 avril et 4 mai 2013 au parc Montsouris, Paris – 75 (YGes et MApr) ; le 11 mai 2013 à Cernay-la-Ville – 78 (SWro), le 22 juin 2014 à Saint-Mammès – 77 (CSis), un couple le 22 juillet 2013 à Meaux – 77 (DMer) ; une série d'observations jusqu'à 4 ind. ensemble, à Vernou-La-Celle-sur-Seine – 77 du 26 janvier au 21 novembre 2014 (PBas) n'a pas eu de suite les années suivantes.

Perroquet jaco

Psittacus erithacus

Des individus isolés ont été notés à Igny – 91 le 18 mars 2013 (LChs), à Sevran – 93 le 25 mai 2014 (RLeg) et à Montigny-le-Bretonneux – 78 le 6 août 2014 (JdRa).

Perroquet youyou

Poicephalus senegalensis

Un individu à Saint-Cloud – 92 le 18 juin 2012 (LChe), un ind. à Brie Comte-Robert – 77 le 26 octobre 2014 (STho) ; une série de 18 observations à Longjumeau – 91 du 4 avril 2013 au 3 octobre 2014 et une à Épinay-sur-Orge – 91 tout proche (OPai, MApr, RPan et JRey) où la nidification avait été avérée de 2007 à 2010.

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Conure veuve

Myiopsitta monachus

Seulement 2 ind. ont été observés, le 13 juin 2012 à Chelles – 77 (OLap) et les 2 et 3 octobre 2014 à Chaintreaux – 77 (JPJEd).

Perruche de Pennant

Platycercus elegans

Deux observations isolées à Corneilles-en-Parisis – 95 le 17 mai 2013 (PSch) et à Brunoy – 91 le 17 septembre 2013 (PYHe).

Perruche omnicolore

Platycercus eximius

L'espèce a été observée en trois endroits : au parc Georges-Brassens, Paris – 75 le 3 mai 2014 (FMal), au lac de Créteil du 7 juillet au 30 août 2014 (JAnj, QDub, COli) et sur la base de Saint-Quentin-en-Yvelines – 78, du 11 au 25 octobre 2014 (SWro, BFro, TCha, TViv, JPMo).

Perruche ondulée

Melopsittacus undulatus

Des observations isolées à Paris sur 4 sites (FJig, APri, RPro), Saulx-les-Chartreux – 91 (OSol), Gagny – 93 (OLap), Arnouville-lès-Gonesse – 95 (FEIB), Garges-lès-Gonesse – 95 (FEIB, OLap), Compans – 77 (FMalh), Montreuil-sous-Bois – 93 (DThs), Feucherolles – 78 (JFId) : 1 ind. chaque fois.

Perruche Alexandre

Psittacula eupatoria

L'espèce a été notée à Antony – 92 le 24 décembre 2012 (BLeb), à Ecouen – 95 le 31 mai 2013 (MApr), à Croissy-sur-Seine – 78 le 20 juillet 2014 (KRic), à Palaiseau – 91 le 14 septembre 2014 (SWro), à Villepinte le 26 octobre 2014 (JGna) ; une série d'observations à Champlan – 91 en 2013 (BLeb, CAle, RPan) avec une nidification probable, ainsi qu'à Saulx-les-Chartreux – 91 dans un lieu tout proche en février-mars 2014, avec aussi une nidification probable (RPan et MApr).

Bibliographie

ALEMANNI, J.-B. (2013) Un Rôle d'eau à Bercy durant l'hiver 2012-2013. *Le Passer*, **47**, p. 59

CHEVALLIER, L. (2013). Première nidification du Hibou des marais *Asio flammeus* en Île-de-France. *Ornithos*, **20** (2) : 65-68.

COMOLET-TIRMAN, J. (2013) Note sur la nidification de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* au château de Fontainebleau (Seine-et-Marne), *Bull. Ass. Nat. Vallée Loing*, **89** (3) : 90-92.

KORPIMAKI, E. et NORRDAHL, K. (1991) Numerical and functional responses of kestrels, short-eared owls, and long-eared owls to vole densities. *Ecology*, **72**, (3) : 814-826.

LAPORTE, O., WALBECQUE, C., ANGLADE, I., DUCORDEAU, F., GLORIA, C., HUIN, W., LETOURNEAU, C., MALHER, F. et WROZA, S. (2016) Synthèse ornithologique des observations franciliennes en 2011. *Le Passer*, **49** (1) : 10-51.

LE MARÉCHAL, P., LALOI, D. et LESAFFRE, G. (2013). *Les Oiseaux d'Île-de-France : nidification, migration, hivernage*. CORIF - Delachaux et Niestlé, Paris. 512 pages.

MALHER, F., LAPORTE, O., ALBESA, L., BARTH, F., CHEVALLIER, L., LETOURNEAU, C., MASSIN, Y. et ZUCCA, M. (2017). *Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France 2009-2014*. CORIF, Paris, 206 pages.

MASSEMIN, S. et HANDRICH, Y. (1997). Higher winter mortality of the Barn Owl compared to the Long-eared Owl and the Tawny Owl : influence of lipid reserves and insulation ? *The Condor*, **99** (4) : 969-971.

Les auteurs

Des cygnes aux faisans

Christian Gloria

Des oedicnèmes aux tournepierrres

Stanislas Wroza

Des sternes aux goélands, les huppes, guépiers et engouleverts

Sylvain Vincent

Des pigeons aux coucoux, des râles aux grues

Olivier Laporte

La Chevêche d'Athéna

Irène Anglade

Les rapaces nocturnes

Julien Piolain

Le torc olet les pics

Eric Grosso

Les perruches, martinets et pigeons

Frédéric Malher

Liste observateurs

Pour une meilleure lecture, nous avons suivi l'ordre alphabétique des acronymes identifiant les observateurs.

Antoine Adam (AAda), Aurélien Agnus (AAgn), Arthur Alt (AAlt), Alan Armouet (AArm), Aurélien Audevard (AAud), Alain Bafferon (ABaf), Armand Balloux (ABal), Alain Barbier (ABar), Alain Barbalat (ABat), Alain Barthelemy (ABay), Adele Bellego (ABel), Ariel Benito (ABeo), Aki Bergo (ABer), Aymeric Benoit (ABet), Alain Beuget (ABeu), Anthony Boulila (ABoa), Aymeric Bodin (ABod), Anika Bonhomme (ABoe), André Bon (ABon), Antoine Bousquet (ABot), Annick Brewee (ABre), Annie Brun (ABru), Alain Carlier (ACar), Arnaud Cavirot (ACav), Alain Cedard (ACed), Adrien Charbonneau (ACha), Anne Chesneau (AChe), Augustin Chen (AChn), Anthony Chaillou (AChu), Alain Clermidy (ACle), Alain Cléty (AClé), Arnaud Coppé (ACop), Alexandre Corbeau (ACor), Annick Collet Peltier (ACPe), Anne-Catherine Roué (ACRo), Anne-Charlotte Sire (ACSi), Arnaud Cuveillier (ACuv), Alan Daines (ADai), Antoine Daubignard (ADau), Agnès de Balasy (AdBa), Anaïs Debatty (ADeb), Arielle Delafoy (ADel), Anne Desallais (ADes), Aurélie Devoulon (ADev), Axelle Doufils (ADou), Adeline Dubernard (ADub), Alexise Duchene (ADuc), Annick Dufau (ADuf), Alice Duflocq (ADuq), André Enoch (AEno), Anna Even (AEve), Alain Ferchal (AFel), Annabelle Fernique (AFeq), Anneli Feret (AFet), Anne-Françoise Guichard (AFGu), Amine Flitti (AFli), Auriane Fontaine (AFon), Alain Fossé (AFos), Agnès Fournier (AFou), Anne Fontigny (AFoy), Anne Frances Paris (AFPa), Albert Freulon (AFre), Aurore Frérot (AFré), Audrey Frolois (AFro), Aurore Gagnaire (AGag), Annie Gaillard (AGai), Arnaud Gales (AGal), Antonin Garnier (AGar), Aurélien Gaunet (AGau), Arnaud Gomes (AGom), Arthur Gublin (AGub), Anthony Guérard (AGué), Ana Guichard (AGui), Alexandre Hamon (AHam), Antoine Hazebroucq (AHaz), Antoine Herrera (AHer), Alain Homassel (AHom), Annie Houé (AHou), Agnès Hugues (AHug), Alexandre Lagodkine (Alag), Alexis Jautee (AJau), Anny Jauffroy (AJay), Alain Jeanne (AJea), Alexandre Joffroy (AJof), Anne Kita (AKit), Arnaud Lacoste (ALac), Alexandre Lainé (ALaé), Annie Laine (ALai), Alexis Lamek (ALam), Alain Langouet (ALan), Alexandre Laubin (ALau), Annie Le Courric-Colin (ALCC), Anne-Lise Dermenghem-Majou (ALDM), Antoine Lefloch (ALef), Anita Legouillon (ALeg), Alexandra Lelieu (ALel), Alexandre Lemaintec (ALem), Antoine Li (ALi), Andree Lieger (ALie), Arlette Lizoret (ALiz), Alexandre Lopez (ALop), Alain Lovati (ALov), Augustin Le Roux Delignières (ALRD), Antony Maurice (AMae), Audrey Maurin (AMan), Arthur Marrel (AMar), Adrien Mauss (AMas), Alain Marnot (AMat), Alain Maurice (AMau), Anne-Marie Bredy (AMBr), Anne-Marie Charbonnier-Flamme (AMCF), Antoine Mercier (AMer), Agnès Métivier (AMet), Anne-Marie Lemius (AMLe), Aurélien Moureau (AMou), Audrey Muratet (AMur), Anne Malavieille (AnMa), Alain Noël (ANoe), Angélique Orts Poncelet (AOPo), Alain Parisot (APar), Alain Pasquereau (APas), Alain Pataud (APat), Annie Pérennes (APer), Aline Perez (APez), Antoine Picard (APic), Amélie Piégay (APié), Annick Pigeon-Magne (APMa), Annie Pons (APon), Alexandre Portmann (APor), Alexandre Prieux (APri), Annick Quin (AQui), Antoine Reboul (AREb), Alix Reisser (AREi), Alicia Rollin (ARol), Adrien Sagette (ASag), Aurélien Salesse (ASal), Alain Soubelet (ASob), Alain Solviche (ASol), Annie Sounthone (Ason), Amandine Soulaïne (ASou), Arnaud

Sponga (ASpo), Anne-Sophie Tillier (ASTi), Antoine Szadeczki (ASza), Antoine Ticot (ATic), Anne Traidmond (ATra), André Twardawa (ATwa), Alaïs Vareille (AVar), Augustin Vasseur (AVas), Alice Veyron-Churllet (AVCh), Alain Verleene (AVer), Arthur Vernet (AVet), Agnès Vander Heym (AVHe), Anthony Virondeau (AVir), Axelle Malavieille (AxMa), Agathe Zoé Maillard (AZMa), Antoine Zuccarelli (AZuc), Alexandre Zurecki (AZur), Bertrand Alliot (BAll), Brigitte Arnaud (BArn), Bruno Berry (BBer), Bernadette Bonnivard (BBon), Beatrice Boscher (BBos), Benedicte Capdevielle (BCap), Bruno Charlier (BCha), Bernard Crombez (BCro), Bertrand Dallet (BDal), Brigitte Delestaing (BDeg), Bernard Delangue (BDel), Bruno Durand (BDur), Benjamin Ente (BEnt), Betty Fouqueray (BFou), Bruno Frangeul (BFra), Benoit Froelich (BFro), Benjamin Garry (BGar), Bruno Gravelat (BGra), Brigitte Grand (BGrd), Benjamin Griard (BGri), Bob Home (BHom), Bruno Honoré (BHon), Benjamin Javaux (BJav), Brigitte Jourdan (BJou), Baptiste Juniot (BJun), Bruno Lang (BLan), Bruno Lebrun (BLEb), Bernard Leclerc (BLec), Benjamin Lefèvre (BLef), Benoit Lelaure (BLel), Bénédicte Lottin (BLot), Benoit Lujan (BLuj), Bernard Mallet (BMal), Bernard Marconot (BMar), Bruno Mathieu (BMat), Bertrand Mennesson (BMen), Bruno Migdal (BMig), Benoit Moinet (BMoi), Benjamin Munoz (BMun), Bernard Nogues (BNog), Bruno Odeyer (BOde), Bruno Piketty (BPik), Bernard Queval (BQue), Brigitte Roche (BRoc), Bruno Rogez (BRog), Bernard Rondeau (BRon), Benoit Rosar (BRos), Bruno Santens (BSan), Benoit Segerer (BSeg), Bruno Soret (BSor), Bernard Souvent (BSou), Béatrice Trin-Goldreich (BTGo), Baptiste Thomin (BTho), Birgit Tollner (BTol), Brigitte Texier-Richard (BTRi), Benoit Van Hecke (BVHe), Beatrice Vieville (BVie), Bady Zeaiter (BZea), Brigitte Zirrelli (BZir), Carol Ann Komly (CAKo), Christophe Alexandre (CAle), Celine Allain (CAll), Carine Alves (CALv), Catherine Amarge (CAma), Christiane Augusto (CAug), Christophe Bastien (CBas), Catherine Bechet (CBec), Colette Bernard (CBed), Charles Bertrand (CBER), Claudine Blanchet (CBl), Christine Braun Londechamp (CBL), Claire Bourgeois (CBog), Clio Bonello (CBon), Christophe Bousquet (CBoq), Catherine Boudies (CBos), Caroline Bourdin (CBou), Claude Bouvet (CBov), Catherine Braquart (CBra), Christine Breton (CBre), Christophe Brillaud (CBri), Chantal Brisson (CBrn), Christophe Bruneaux (CBru), Christophe Bray (CBry), Christel Bughin (CBug), Christine Casas (CCas), Christine Cayssilié (CCay), Communauté de communes du Pays de Limours (CCDPL), Célie Célie (CCél), Christophe Chaland (CChd), Claude Chariot (CCht), Catherine Cluzel (CChu), Christophe Coïc (CCoi), Christele Colombier (CCol), Clément Cornec (CCor), Claire Chenu Piolet (CCPi), Charles Daubas (CDau), Catherine Dechandol (CDec), Catherine Defourneaux (CDef), Christian Delorme (CDel), Camille Denozière (CDen), Cyril Destrebecq (CDeq), Christian Desenfant (CDes), Corinne Da Franca (CDFr), Claude Doucet (CDou), Catherine Dufrenoy (CDuf), Corinne Dumont (CDum), Corinne Dupuy (CDup), Cyril Duquenne (CDuq), Cécile Elfathi (CElf), Cédric Flageul (CFla), Céline Fourey (CFou), Christian Fouqueray (CFoy), Cloé Fraigneau (CFra), Cyrille Frey (CFre), Conseil général 91, Espaces naturels sensibles (CG91ENS), Christine Gaboriau (CGab), Claudine Gaugoin (CGau), Christophe Girard-Berthet (CGB), Clément Giacomo (CGia), Claudine Gillot (CGil), Christian Gloria (CGlo), Christophe Goujon (CGou), Clélie Grangier (CGra), Claire Gruel (CGru), Clara Guiblain (CGui), Christian Guilhem (CGum), Claude Hardel (CHar), Charles-Henri Bodin (CHBo), Catherine Honvault (CHon), Chantal Jacob (CJac), Christine

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Jaffrez (CJaf), Corinne Jeandillout (CJea), Christelle Josse (CJos), Christian Jourdan (CJou), Cynthia Kaiser (CKai), Cécile Koehler (CKoe), Cathy Kuypers (CKuy), Claudine Lambert (CLam), Cécile Lanfranchi (CLan), Catherine Laplagne (CLap), Chantal Le Duc (CLDu), Catherine Lefèvre (CLef), Christian Lenclud (CLen), Christine Lefevre (CLer), Christian Letourneau (CLet), Christian Lefèvre (CLev), Cécile Le Roy (CLRo), Corinne Le Saint (CLSa), Carine Le Thanh (CLTh), Christiane Lutyj (CLut), Christine Maffei (CMaf), Carole Mainguy (CMai), Catherine Malec (CMal), Carlos Malem (CMam), Christian Mars (CMar), Christine Masserot (CMas), Claire Marcadet (CMat), Christian Meisser (CMei), Christine Meunier (CMeu), Cécile Mézenge (CMéz), Claire Morlon (CMol), Catherine Moncel (CMon), Christophe Morin (CMor), Claire Moutardier (CMou), Christine Munsch (CMun), Chantal Nauguet (CNau), Christiane Oliviéro (COLi), Christophe Orvain (CORv), Claire Patouillard (CPat), Carole Perez (CPer), Chantal et Pierrick Guillier (CPGu), Carole Pingault (CPin), Corentin Plisson (CPLi), Cédric Pochelon (CPoc), Claire Poirson (CPoi), Claude Ponsard (CPon), Claude Poignavert (CPot), Catherine Querrien (CQue), Christian Rémond (CRém), Canelle Rolland (CRol), Céline Roussel (CRou), Céline Roverch (CRov), Christine Rowley (CRow), Catherine Rubon (CRub), Claire Rutherford (CRut), Claudine Sainmiard (CSai), Chantal Seguy (CSeg), Catherine Simon (CSim), Christine Simoes (CSis), Charlotte Siwiolek (CSiw), Christian Spain (CSpa), Christelle Strebler (CStr), Chloé Tanton (CTan), Céline Thomas (CTho), Christophe Tomati (CTom), Catherine Valaz (CVal), Chrystele Vassereau (CVas), Clémentine Verdier (CVer), Christian Vernet (CVet), Christophe Walazyc (CWac), Catherine Walbecque (CWal), Corinne Yam (CYam), Corinne Zannier (CZan), Claude Ziegler (CZie), Christine Zinetti (CZin), Dov Assayag (DAss), Denis Attinault (DAtt), Didier Barraud (DBar), Dominique Belzanne (DBel), Daniel Berthouloux (DBer), David Binvel (DBin), David Bismuth (DBis), Didier Bizien (DBiz), Danielle Blanc (DBla), Denis Boissière (DBoi), Dominique Bourdin (DBou), Damien Cartalade (DCar), Didier Christin (DChr), Didier Cleva (DCle), Dominique Crespel (DCre), Damien Czarnecki (DCza), Damien Daigre (DDai), David de Boisvilliers (DdBo), Delphine Destaig (DDeg), Daryush Dehghan (DDeh), Didier Delattre (DDel), Dominique Demota (DDem), Damien Desvignes (DDes), Danièle Dubois (DDub), Dominique Ennaji (DEnn), Dan Failler (DFai), David Genoud (DGen), Didier Gerome (DGer), Damien Giraud (DGir), Diane Gallet-Le Gros (DGLe), Didier Godreau (DGod), Denis Joye (DJoy), David Laloi (DLal), Danielle Lanquetuit (DLan), Dominique Laouenan (DLao), Daniel Leboucher (DLeb), Denis Leclerc (DLec), Damien Ledoux (DLed), Delphine Lemoine (DLem), Didier Leray (DLer), Delphine Leroy (DLey), Dany Le Grand (DLGr), David Loche (DLoc), David Longeanie (DLon), Dominique Le Poullennec (DLPo), Dider Macquart (DMac), Djamal Makhoulfi (DMak), Daniel Malassingne (DMal), David Martins (DMar), Daniel Mauras (DMau), Didier Mercier

(DMer), Dominique Millet (DMil), Danièle Monier (DMon), Denis Moreau (DMor), Dauren Omarov (DOma), Daniel Philippe (DPhi), Delphine Presles (DPre), Diana Quent (DQue), Didier Quinsinat (DQui), Danièle Reix (DRei), Delphine Rocher (DRoc), David Rosane (DRos), David Rousseau (DRou), Didier Scotti (DSco), David Simpson (DSim), Dominique Tessier (DTes), Daniel Thonon (DTho), David Thorns (DThs), Denis Trasfi (DTra), Dominique Triboulin (DTri), Daniel Trinquécostes (DTrs), Didier Vallée (DVal), Dominique Veuillet (DVe), Dimitri Viguer (DVig), Dominique Vioux (DVio), Dominique Weill-Hebert (DWHe), Dominique Zabinski (DZab), Ève Alcoulo (EAlc), Elias Bader (EBad), Émilien Barussaud (EBar), Emmanuel Berrod (EBer), Émilie Bouzendorf (EBo), Erwan Bouli (EBoi), Emmanuel Bonnet (EBon), Ève Bordoni (EBor), Étienne Bouret (EBot), Emmanuel Bouclet (EBou), Étienne Brisechant (EBri), Éric Broutin (EBro), Éric Charlier (ECha), Èvelyne Cocot (ECoc), Élisabeth Colombo (ECol), Élisabeth Cordoliani (ECor), Emmanuel Collet (ECot), Éric Coudert (ECou), Édouard Crechon (ECre), Elena Dallot (EDal), Étienne Decencièr (EDec), Eric Demille (EDem), Emmanuel de Guibert (EdGu), Éric Fenart (EFen), Édith Ficheux-Lefort (EFL), Emeline Fossard (EFos), Étienne Gilbert (EGil), Éric Gonzalez (EGon), Éric Grosso (EGro), Éloïse Grossier (EGrr), Elda Guenoux (EGue), Émilie Hutois (EHut), Émilien Jomat (ÉJom), Éric Larramendy (ELar), Étienne Leroy (ÉLer), Élodie Le Grand (ELGr), Édouard Lhomer (ELho), Emmanuel Le Roy (ELRo), Eric Lallemand-Senille (ELSe), Estelle Le Touze (ELTo), Éric Mallet (EMal), Estelle Marquart (EMar), Évée Mautret (EMau), Éric Menu (EMen), Éric Michel (ÉMic), Élodie Milleret (EMil), Eugène Montocchio (EMon), Éric Nianane (ENia), Émilie Noel (ENoe), Émilie Oudin (EOud), Éric Perret (EPer), Élisabeth Perchet-Hossenlopp (EPHo), Élodie Pouchet (EPou), Éric Puyrajoux (ÉPuy), Emmanuelle Riaute (ERia), Édouard Ribatto (ERib), Enrique Sans (ESan), Édouard Tesnière (ETes), Éric Trevisan (ETre), Élisabeth Valette (EVal), Emma Valadas (EVal), Emmanuel Véricel (EVer), Evarest Van Seters (EVSe), Éric Zurcher (EZur), Frédéric Akbik (FAkb), François Assens (FAss), Frédéric Bacuez (FBac), Franz Barth (FBar), Frédéric Baudat (FBau), Félix Bazinet (FBaz), Franck Benguigui (FBen), Florian Bestel (FBes), Franck Bohain (FBoh), Frédéric Bordeaux (FBor), François Bouzendorf (FBou), Fabien Branger (FBra), Françoise Cazein (FCaz), Françoise Chardon (FCha), François Chiron (FChi), François Charron (FChn), Françoise Choichillon (FCho), François Coquart (FCoq), Françoise Cornu (FCor), Frédéric David (FDad), Florian Dargent (FDar), Fanch Daussion (FDau), Fabienne David (FDav), François Duchenne (FDch), Famille Dé (FDé), François Dehondt (FDeh), Florence Delaroche (FDel), Francis Desjardins (FDes), Françoise Deydier (FDey), Fred Didelot (FDid), Françoise Dorcet (FDor), Fabrice Ducordeau (FDuc), François Dudouet (FDud), Farid El Batiwi (FEIB), Fabienne Fauré (FFau), Fabrice Frobenius (FFro), François Gasnot (FGas), Flora Gerfaud (FGer), François Gorenflot (FGor), François Gross (FGro), François Houdecek (FHok), Frédéric Houel (FHou), Florent Huon (FHuo), Frédéric Jiguet (FJig), Franck Le Bloch (FLBl), Florian Leemann (FLee), François Legendre (FLeg), François Lelièvre (FLel), Frédéric Leviez (FLev), Fabrice Leycuras (FLey), Frédéric Le Gallo (FLGa), Faustino Lorenzo (FLor), François Louiton (FLou), Fred Malapata (FMaa), Françoise Mailliez (FMai), Frédéric Malher (FMal), Florian Maumus (FMau), Florence Melan (FMel), François Meyer (FMey), Françoise Moignet (FMoi), François Mouret (FMou), Frédéric

Myrdawojka (FMyr), Fabienne Naudy (FNau), Françoise Nicol (FNic), Fernande Offroy-Delga (FODe), Frédéric Pezet (FPez), Fabrice Philbert (FPhi), François Picavet (FPic), Fab Pié (FPIé), Frédéric Portier (FPor), Frédéric Pou (FPou), Frédéric Pouzergues (FPoz), Francesco Rasio (FRav), Frédéric Revers (FRev), Fiona Rodrigues (FRod), Franck Rossignol (FRos), Fabienne Roumier (FRou), Florent Smelten (FSme), Fabien Spicher (FSpi), Françoise Stiéfater (FSti), Frauke Sultana (FSul), Florie Swoszowski (FSwo), Frédéric Thouin (FTho), Frédérique Valette (FVal), Florian Vernichon (FVer), François Verret (FVet), Florent Yvert (FYve), Françoise Zimmer (FZim), Guillaume Antoine (GAnt), Gilles Autant (GAut), Guy Bas (GBas), Gérard Baudoin (GBau), Gilles Beclu (GBec), Georges Berville (GBer), Guillaume Blanchard (GBla), Grégoire Blond (GBlo), Gilles Bourrioux (GBou), Gérard Briard (GBri), Gérard Brunot (GBru), Gilles Carcasses (GCar), Gérard Chopinet (GCho), Gerard David (GDav), Ghislaine Delhayé (GDee), Gaëtan Delaloye (GDel), Guillaume Demange (GDem), Guillaume Delaunay (GDey), Gilles Drouet (GDro), Grégoire Duffez (GDuf), Gilles Ensueque (GEns), Ghislaine Escoubeyrou (GEsc), Gil Faivre (GFai), Gaëlle Fauret (GFau), Gil Ferré (GFer), Guy Gautret (GGau), Guillaume Geneste (GGen), Gérard Genot (GGet), Geneviève Gonzy (GGon), Gégé Goujon (GGou), Geneviève Granier (GGra), Gérard Guibert (GGui), Gwen Gwez (GGwe), Guillaume Hoibian (GHOi), Grégory Houiller (GHou), Glenn Keck (GKec), Guy Keryer (GKer), Groupe Lpo 94 (GL94), Gérard Laizier (GLai), Guillaume Larrègle (GLar), Geneviève Laulhé (GLau), Géraldine Le Duc (GLDu), Guilhem Lesaffre (GLes), Guillaume Le Goff (GLGo), Grégoire Loïs (GLOi), Georges Lucas (GLuc), Gaëlle Mainguy (GMai), Gaël Martin (GMan), Guy Marvane (GMar), Gilles Mays (GMay), Guillaume Merlent (GMer), Geoffrey Mesbahi (GMes), Gabriel Musielak (GMus), Gérard Nocle (GNoc), Georges Oliosio (GOli), Ginette Orange (GOra), Guillaume Passavy (GPas), Grégory Picard (GPic), Gilles Pillet (GPil), Ghyslaine Prigent (GPri), Gérard Renaud (GRed), Gilles Renou (GRen), Guy Savornin (GSav), Grégoire Schneider (GSch), Guilhem Serval (GSer), Guilhem Sommeria-Klein (GSKI), Gwénaél Torres (GTor), Gaëlle Troubnikoff (GTro), Hélène Baillais (HBai), Henry Brown (HBro), Hélène Clogenson (HClo), Hubert D'hondt (HD'h), Hélène Duret (HDur), Hugues Finot (HFin), Hervé Georget (HGeo), Hélène Goossens (HGoo), Hugo Gruson (HGru), Hervé Lefort (HLeF), Hervé Le Morvan (HLMo), Huguette Macret (HMac), Hélène Morey (HMor), Hélène Pasco (HPas), Hélène Pedot (HPed), Hubert Pottiau (HPot), Hélène Radenac (HRad), Hugues Ringuenet (HRin), Hervé Roques (HROq), Hélène Thomassin (HThn), Hugues Thomas (HTho), Isabelle Belfort (IBel), Isabelle Borgia (IBer), Isabelle Bregeaux (IBre), Isobel Codjia (ICod), Isabelle Deman (IDem), Isabelle Giraud (IGir), Isabelle Lancry (ILan), Isabelle Lhermitte (ILhe), Ivan et Liza Lisiecki (ILLi), Isabelle Marchand (IMad), Isabelle Maillard (IMai), Isabelle Martin (IMan), Inès Martin (IMar), Irène Misguich (IMis), Isabelle Morgan (IMor), Isabelle Pernollet (IPer), Isabelle Rondelet (IRon), Jean-Aubert Dufaux (JADu), Jack Anjuerer (JAnj), Jonathan Ardelet (JArD), Jules Argis (JArg), Julien Barge (JBag), Jean-Bernard Alemanni (JBAl), Jeanne Barthe (JBar), Jerome Beaufort (JBea), Johanne Bellet (JBel), Joseph Beaurain (JBen), Jocelyne Biasin (JBia), Julien Birard (JBir), Julien Bottinelli (JBot), Jacynthe Brochard (JBro), Jeannine Capart (JCap), Jean-Christophe Beaucour (JCBé), Jean-Claude Bissier (JCBi), Jean-Christophe Bruneau (JCBr), Jacques Chatelain (JCha), Jean-Charles Jouffroy (JCJo), Jean

Claude Marin (JCMa), Jean-Claude Mauvais (JCMv), Julien Collet (JCol), Jacky Constanty (JCon), Juliette Coutière (JCou), Jérôme Coussy (JCoy), Jean-Claude Pagano (JCPa), Jean-Claude Pauwels (JCPw), Jaime Crespo (JCre), Jean-Christophe Robier (JCRo), Jacques Comolet-Tirman (JCTi), Jean-Claude Vadella (JCva), Jean Claude Vesco (JCve), Jean-Christophe Vandeveld (JCVv), Jean-Christophe Weidmann (JCWe), Julien Daubignard (JDau), Jean-Denis Bergemer (JDBé), Jean-Dominique Condé (JDCo), Joris Duval-de Coster (JDde), Jérôme Delabarre (JDel), Jérôme Demeulle (JDem), Jeanne Denieul (JDen), Jean Desautéz (JDes), Jerome de Linares (JdLi), Julia D'orchymont (JD'o), Jean Doucet (JDou), Joachim de Rancourt (JdRa), Jérôme Dumont (JDum), Jeanne-Flore Blomme-Leveneur (JFBLe), Jean-François Carbonne (JFCa), Jean-François David (JFDa), Jean-François Delangle (JFDe), Jean-François Dupré (JFDu), Justine Fernandes (JFer), Julien Fèvre (JFev), Joe La Tante Flandrin (JFla), Jimmy Flamand (JFld), Julien Foussard LPO (JFLP), Jean-François Magne (JFMa), Jean-François Thomas (JFTh), Jean Guillaume D'Orglandes (JGDo), Joseph Gnanou (JGna), Joëlle Gouin (JGon), Julien Gouëlle (JGou), Jacques Gueho (JGue), Jules Guilberteaud (JGui), Joël Hacquard (JHac), Josiane Hy (JHy), Jacques Jaworski (JJaw), Jean-Jacques Boujot (JJBo), Jean-Jacques Latu (JLLa), Jean-Jacques Lallemand (JLLt), Jean-Jacques Salette (JJSa), Jérôme Lacampagne (JLac), Josette Laurentin (JLau), Jean-Louis Barrès (JLba), Jean-Luc Bocquillon (JLBo), Jean-Luc Destrebecq (JLDe), Jean-Luc Duval (JLDu), Josiane Legros (JLeg), Jacques Lemoine (JLem), John Legros (JLes), Jean-Luc Hercent (JLHe), Jacky Libaud (JLib), Juliette Linossier (JLin), Jean-Luc Kleis (JLkl), Jean-Louis Laze (JLLa), Jean-Luc Lemonnier (JLLe), Jean Luc Liaud (JLLi), Jean-Luc Lopez (JLLo), Jean-Luc Maire (JLma), Jean-Luc Naudin (JLNa), Jim Lobservateur (JLob), Jardin Lapin Ouvrier (JLOu), Jean-Louis Verrier (JLve), Jacques Maout (JMaO), Jean Marmesse (JMar), Jean-Marie Audin (JMAu), Jérôme Mayolle (JMay), Jean-Marc Bourdoncle (JMBoc), Jean-Marc Bouchy (JMBY), Jeremy Mcmillan (JMcM), Jean-Marc Ducos (JMDu), Jean-Michel Enard (JMEa), Jérôme Meyer (JMey), Jean-Michel Fenerole (JMFe), Jean-Michel Gatefait (JMGa), Jean-Marc Guilpain (JMGu), Jean-Marc Laurenceau (JMLa), Jean-Marc Lustrat (JMLu), Jean-Marc Lutzi (kaigen) (JMLz), Jean-Michel Malaga (JMMa), José Miguel Martins Da Silva (JMMDa), Jean-Marc Rabby (JMRa), Jean-Michel Remaud (JMRe), Jean-Marie Rouxel (JMRO), Jean Michel Stephan (JMSt), Jean-Marc Taupiac (JMTa), Jean-Marie Ternisien (JMTe), Jean-Noël Héron (JNHe), Jérôme Partos (JPar), Joël Pasco (JPas), Jean-Pierre Billaud (JPBi), Jean-Pierre Charlier (JPCh), Jean-Pierre Delapre (JPDe), Jeannette Perret (JPer), Jean-Pierre Garnier (JPGa), Jean-Philippe Gremillot (JPGr), Jean-Paul Gulia (JPGu), Jean Pierre Hanne (JPHA), Joëlle Pineau (JPin), Julien Piolain (JPio), Joël Pinquier (JPiq), Jean-Philippe Joseph-Édouard (JPJEd), Jean-Pierre Labourdette (JPLa), Jean-Paul Ladoux (JPLd), Jean-Paul Lenglet (JPLé), Jan-Pierre Lafond (JPLf), Jean-Pierre Le Lezec (JPLLe), Jean-Pierre Lair (JPLr), Jean-Paul Maistre (JPMa), Jean-Pierre Merlaud (JPMe), Jean-Paul Moulin (JPMo), Jean-Paul Remise (JPRe), Jean-Pierre Tulou (JPTu), Jean-Pierre Van Wambeke (JPVWa), Jacqueline Quattrina (JQua), Jocelyne Ragon (JRag), Julien Raoul (JRao), Jacques Rey (JRey), Julien Rochefort (JRoc), Jean Rogez (JRog), Jacqueline Roussel (JRou), Jacky Saussereau (JSas), Julien Sauleau (JSau), Jean Saint Jean (JSJe), Jm Tissier (JTis), Jeannie Vassy (JVas), Jacqueline Vergne (JVer), Jacques Van Sevenant

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

(JVSe), Jean-Yves Baudot (JYBa), Karin Caporal (KCap), Killian Ferreira (asio) (KFer), Karine Lavagna (KLav), Katia Lebrun (KLeb), Karen Martin (KMar), Karine Martins (KMAs), Kevin Richard (KRic), Karl Sabourin (KSab), Kai Suomela (KSuo), Louis Albesa (LAlb), Lina Alonso (LAlon), Laure-Anne Merle (LAME), Laura Barreto (LBao), Lydie Baranton (LBar), Lucien Basque (LBas), Lucille Billon (LBil), Lucille Bourgeois (LBog), Laurence Boiteux (LBoi), Léa Boulière (LBou), Lorraine Ceccanti (LCec), Léa Chariol (LCha), Laurent Chevallier (LChe), Laurent Champenois (LChp), Laurent Chasserieu (LChs), Lionel Chevron (LChv), Lucile Clavier (LClav), Lucien Cloarec (LClo), Laurent Couzi (LCou), Laetitia Curien (LCur), Lucie Dauvigne (LDau), Laurent Degradi (LDeg), Laurence Delaportas (LDeL), Léo Deschamps (LDes), Léna de Framond Benard (LdFr), Loïc de La Rancheraye (LdLa), Laura Da Silva Miranda (LDSi), Lionel Dubief (LDub), Laurence Dumolard (LDum), Lisa Durand (LDur), Loïc Epelboin (LEpe), Laura Euzen (LEuz), Leandro Ferreira (LFer), Laurence Fidon (LFid), Louis Fraïtot (LFra), Ludivine Giet (LGie), LPO Guyancourt (LGuy), LPO Île-de-France (LIde), Loïc Jomat (LJom), Ly Khom Ngo (LKNg), Laurence Lacontre (LLac), Laurent Lagache (LLag), Laurence Lantoine (LLan), Laurent Lavarec (LLav), Laurent Le Bourg (LLBo), Leap Le Buat (LLBu), Lionel Lenne (LLen), Lisel Löschenkohl (LLös), Lucie Mallat (LMal), Loriane Mameli (LMam), Lucas Marineau (LMar), Lauriane Miné (LMin), Laurent Moussiegt (LMou), Liliane Polard Bontemps (LPBo), Louis Picard (LPic), Lydia Razafindralay (LRaz), Lucile Rimbault (LRim), Liliane Rogon (LRog), Lorna Rouhaud (LRoh), Léo Roumieu (LRou), Laure Rogeaux (LRox), Laurent Sicsic (LSic), Laurent Teyssède (LTey), Laurent Thibedore (LThi), Lucile Thomas (LTho), Lionel Toutain (LTou), Laure Turcati (LTur), Lucille Vanderberg (LVan), Laurent Vavasseur (LVav), Laurent Vindras (LVin), Léon Van Niekerk (LVNi), Laurent Wittmer (LWit), Louis et Xavier Vrinat (LXVr), Monique Diot (MDi), Muriel Abbott (MABb), Mathis Akl (MAkl), Maryline Alguacil Preslier (MAP), Marius Aprile (MApr), Mélanie Archambault (MArc), Michel Antoine Reglade (MARE), Michèle Audibert (MAud), Marco Banchi (MBan), Magali Barrielle (MBar), Monique Baudvin (MBau), Martine Belmont (MBeL), Matthieu Bernard (MBeR), Madeleine Biron (MBir), Michel Bitter (MBit), Mathilde Bordier (MBod), Michèle Boiron (MBoi), Monique Borel (MBol), Michel Boumier (MBom), Marc Bordier (MBor), Marine Bourles (MBou), Mathias Bouzin (MBoz), Maëlle Bujaud (MBuj), Marc Carvin (MCar), Maurice Cassier (MCas), Marie-Christine Bonnemye Blondeau (MCBBI), Marie-Christine Constant (MCCo), Marie-Christine Dandonneau (MCDa), Marie-Christine Dumoutier (MCDm), Marie Claude Dureuil (MCDr), Marie-Christine Dubernard (MCDu), Marie-Christine Gallot (MCGa), Marc Chantraine (MCha), Marc Chesneau (MChe), Martine Chalgou (MChg), Muriel Cheneval (MChl), Mélanie Chardin (MChr), Mariette Clerc (MCle), Marie-Claude Lenoire (MCLn), Michel Colombe (MCol), Marine Cornet (MCor),

Marine Couric (MCou), Mariannick Dagois (MDag), Mathilde di Bianca (MdB), Michel Delas (MDeL), Montaine Delmotte (MDeM), Marion Démonet (MDém), Michel di Maggio (Mdma), Mireille Dore (MDor), Muguette Douillet (MDou), Michaël Duclos (MDuc), Mathilde Dumontier (MDum), Monique Duplant (MDup), Michel Durand (MDur), Maria-Elisa Biotti (MEBi), Marie-Estelle Caspar (MECa), Matthieu Faveyrial (MFav), Marie-Françoise Dhiver (MFDh), Mara-Flore Dubois (MFDu), Maxime Flamand (MFla), Mathias Fleur (MFle), Marie-France Malézieux (MFMa), Mario Fouquet (MFou), Michel Freulon (MFre), Manon Friand (MFri), Marie-France Rojas (MFRo), Muriel Gelin (MGel), Martin Geoff (MGeo), Marie Ginibre (MGin), Marc Giroud (MGir), Michael Gobert (MGob), Maxime Gombert (MGom), Marie Gourmelen (MGou), Michel Granger (MGra), Maud Grelley (MGre), Martine Guilmet (MGui), Manon Hacquin (MHac), Michel Hamelin (MHam), Mickael Hamon (MHan), Maëlys Hemon (MHem), Marc Hernandez (MHer), Marie-Hélène Lopez (MHL), Martine Holzapfel (MHol), Marie-Hélène Pean (MHPe), Maryline Huet (MHue), Marie-José Cottin Chevet (MJCC), Marie-Jo Raimbault (MJRa), Marilyn King (MKin), Marie Kleim (MKle), Maria Lanoue (MLan), Monique Laporte (MLap), Muriel Langenet (MLat), Morgane Le Coq (MLCo), Michèle Leblond (MLeb), Maxime Lefebvre (MLeF), Micheline Lesniak (MLEk), Martine Leleux (MLEl), Mirabelle Lemaire (MLem), Martine Leroux (MLer), Martine Lesage (MLes), Marc Lestienne (MLet), Muiyang Li (MLi), Magali Limongi (MLim), Matthias Loiseau (MLoi), Marie-Laure Peretti (MLPe), Maud Marchand (MMad), Maurice Mahé (MMah), Michel Martin (MMar), Michel Mathis (MMat), Marie Melin (MMel), Michel Menanteau (MMen), Minot Marceau Minot (MMM), Matthieu Moles (MMol), Marie-Manuela Sénéchal (MmSé), Marie-Noëlle Benoit (MNBe), Marie-Noëlle Ducerueu (MNDu), Marie-Noëlle Presse (MNPr), Michèle Pater (MPat), Marie-Paule Ducteil (MPDu), Mickaël Péchaud (MPéc), Maryline Pegues (MPeg), Muriel Penpeny (MPen), Marc Pidou (MPid), Matteo Ploux (MPlo), Marion Poirer (MPoi), Marie Portas (MPor), Magali Pottier (MPot), Magali Pourrat (MPou), Muriel Raffin (MRaf), Marguerite Raymond (MRay), Maurice Robert (MRob), Monique Rodriguez (MRod), Mélissa Roig (MRoi), Monique et Rémi Taïb-Fonters (MRTF), Matthieu Sannier (MSan), Manuel Schlayen (MSch), Marc Serain (MSer), Marianne Serizier (MSez), Maryse Siksou (MSik), Michel Sitterlin (MSit), Murielle Solis-Lambert (MSLa), Madeleine Souchaud (MSou), Marc Stampfler (MSta), Martine Sulpice (MSul), Marie-Thérèse Dron (MTDr), Mireille Thevenet (MThe), Marc Toledo (MTol), Marc Triqueneaux (MTri), Michel Trolay (MTro), Mireille Ughetto Monfrin (MUMo), Monique Verrechia (MVer), Margault Vallet-Goupil (MVGo), Monique Vigla (MVig), Marie Vion (MVio), Marc Volatier (MVol), Murielle Weber (MWeb), Magali Werouwe (MWer), Maxime Zucca (MZuc), Nathalie Barré (NBar), Nicolas Biabaut (NBia), Nicole Brisac (NBri), Nadia Burguin (NBur), Nathalie Cazes (NCaz), Nicolas Coiffait (NCo), Noreen Connan (NCon), Nicolas Delon (NDeL), Nathalie Deslandes (NDes), Nicolas Donadieu (NDon), Nicole Dupin (NDup), Nicolas Emmanuel Granier (NEGr), Nathalie Fatou (NFat), Nadia Feuillo (NFeu), Nancy Fonteny (N Fon), Nicolas Forest (NFor), Nicole Fourquemin (NFou), Nathalie Garcia (NGaa), Nadine Garaud (NGad), Nicolas Galand (NGal), Nicolas Garnier (NGar), Nathalie Garrigues (NGas), Nadine Gaubiac (NGau), Nicole Gillmann (NGil), Nicolas Goulmy (NGou), Nadia Hulot-Naffakh (NHNa), Nadine Houizot (NHou),

Nathalie Laureillard (NLad), Nicolas Langlois (NLan), Nathalie Lautier (NLau), Nicolas Lemaire (NLem), Nicolas Louineau (NLou), Nicole Petitpas (NPet), Nicolas Porteix (NPor), Nicole Ratti (NRat), Nicole Ribière (NRib), Nathalie Rodas (NRod), Nidia Rodrigues (NRos), Nadia Saussey (NSau), Nicolas Sellier (NSel), Nadine Sense (NSen), Nelly Sigonneau (NSig), Nathalie Santa Maria (NSMa), Nicolas Traubly (NTr), Nathy Urvois (NUrs), Nathalie Urvois (NUrv), Nathalie Vannerot (NVan), Olivier Albessard (OAlb), Olivier Bardet (OBar), Olivier Boissier (OBoi), Olivier Cabrignac (OCab), Olivier Charade (OCha), Olivier Claessens (OCla), Olivier Delzons (ODel), Olivier Disson (ODis), Olivier Dufour (ODuf), Olivier Finet (OFin), Olivier Fourquet (OFou), Oiseaux Groupe (OGro), Odile Haouet (OHao), Olivier Hépiègne (OHép), Olivier Labbaye (OLab), Olivier Laporte (OLap), Olivier Le Duc (OLDu), Olivier Leclerc (OLec), Olivier Legros (OLeg), Olivier Le Gall (OLGa), Olivier Loir (OLoi), Ondine Marciniak (OMak), Olivier Marchal (OMal), Olivier Martin (OMan), Odette Marechal (OMar), Olivier Moreno (OMor), Olivier Muller (OMul), Olivier Paikine (OPai), Olivier Paikine (OPai), Olivier Patrimoine (OPat), Olivier Pellegrini (OPel), Olivier Plisson (OPli), Olivier Pratte (OPra), Óscar Ramírez Del Palacio (ÓRDP), Océane Roquinard (ORoq), Olivier Renou-Pepe (ORPe), Olivier Sigaud (OSig), Olivier Soldi (OSol), Olivier Tostain (OTos), Olivier Vannucci (OVan), Oriane Vivin (OViv), Patrick Albrecht (PALb), Pascal Aleixandre (PAle), Philippe Antoine (PANT), Patrick Audoux (PAud), Patrick Balluet (PBal), Philippe Bastard (PBas), Pascal Bednarczyk (PBed), Patrick Behr (PBeh), Paul Bekaert (PBek), Patrick Berniard (PBer), Philippe Beros (PBes), Patrick Bideault (PBid), Pierre Boissier (PBoi), Pascale Bonnet (PBon), Philippe Bordas (PBor), Pascal Bouet (PBot), Pascal Bounie (PBou), Philippe Broch (PBro), Philippe Carrere (PCar), Pascal Cavallin (PCav), Philippe Christodoulos Charrier (PCCh), Pauline Chevalier (PChe), Pauline Couric (PCou), Pierre Crançon (PCra), Pierre Crouzier (PCro), Philippe Dardenne (PDar), Patrick David (PDav), Patrick Decreus (PDec), Philippe Delpierre (PDel), Philippe Demange (PDem), Patrice Denoncin (PDen), Patrick Derennes (PDer), Prêles Deschamps (PDes), Pascale Dolo (PDol), Patrick Da Silva (PDSi), Philippe Duchene (PDuc), Patrice Duraffort (PDur), Paul Duverne (PDuv), Paul Doniol-Valcroze (PDVa), Pascal Echeveste (PEch), Pierre-Éric Guisard (PEGu), Paul-Émile Paillier (PEPa), Patrice Eudeline (PEud), Philippe Feldmann (PFel), Patrick Ferru (PFer), Patrick Ferdenzi (PFez), Philippe Fortini (PFor), Pascal-Guy Cusenier (PGCu), Philippe Germain (PGer), Pierre Gestraud (PGes), Pierre Giraud (PGir), Pierre Gitenet (PGit), Philippe Graulière (PGr), Patrick Grossin (PGro), Philippe Gratas (PGr), Philippe Hervieu (PHer), Pierre Héraud (PHér), Pascale Houdry (PHou), Pierre Hugué (PHug), Paul Hurst (PHur), Philippe J. Dubois (PJDu), Pierre Jeaucour (PJea), Philippe Jourde (PJou), Pierre Kremp (PKre), Pierre Lacampagne (PLac), Perrine Lecoq (PLec), Patrice Lerat (PLer), Pascal/Sylvie Le Guen/Ruffin (PLGu), Pierre Le Maréchal (PLMa), Pascal Le Poulain (PLPo), Pei Mafate (PMaf), Pascal Magnaudet (PMag), Perrine Maillat (PMai), Patrick Mauchien (PMan), Patricia Mario (PMao), Patricia Marie (PMar), Pascal Maratrat (PMat), Patrick Maunoir (PMau), Philippe Maintigneux (PMax), Pierre-Maxime Delattre (PMDe), Pierre Miguet (PMig), Pierre Mordacq (PMoq), Pascal Morin (PMor), Patrick Mulot (PMul), Philippe Naudinot (PNau), Petra Niggemann (PNig), Pierre-Olivier Combettes (POCo), Philippe

Persuy (PPer), Patrick Philippon (PPhi), Pascal Pichon (PPic), Philippe Pirard (PPir), Philippe Rance (PRan), Patrice Renard (PRen), Philippe Richard (PRic), Philippine Rivaud (PRid), Pierre Rigaux (PRig), Pierre Rivallin (PRiv), Pierre Rousset (PRou), Pascale Roynard (PRoy), Pascal Rozada (PROz), Philippe Salvy (PSal), Patrice Schaffhauser (PSch), Pierre Schumacher (PSch), Peter Schmitt (PSct), Pierre Solviche (PSol), Philippe Stocker (PSto), Pierre Tillier (PTil), Pierre Tourret (PTou), Personne Une (PUne), Philippe Vuillaume, Hélène Marchand (PVHM), Philippe Viette (PVie), Paule Walthert (PWal), Patrick Woehrling (PWoe), Pierre-Yves Henry (PYHe), Pierrick et Yvain Taghvaei (PYTa), Philippe Zozor (PZoz), Quentin Dubost (QDub), Quentin Guibert (QGui), Quentin Moreau (QMor), Rédouane Hocine (RHo), Rodolphe Alexis (RAle), Rose Aubrun (RAub), René Bastien (RBas), Raphaël Boyer (RBoy), Rodolphe Charrieau (RCha), Richard Cousin (RCou), Romain Clément-Palleg (RCPa), Romain Deleperdange (RDel), Raphael Devic (RDev), Rémi Fonters (RFon), Régis Frangeul (RFra), Raoul Furtak (RFur), Robert Gervais (RGer), Roger Grosjean (RGro), Rosemay Hanon (RHan), Rémi Henry (RHen), Romain Huchin (RHuc), René Jeune (RJeu), René-Jacques Lique (RJLi), Rémi Jugieux (RJug), Régine Le Courtois (RLCo), Régis Legros (RLeg), Romain Lorrillière (RLor), Romain Lrd (RLrd), Roland Malecot (RMal), Romain Martin (RMar), Rémi Malignat (RMat), Romain Mollot (RMol), Richard Mousset (RMou), Richard Muguet (RMug), Robin Panvert (RPan), Rossella Pintus (RPin), Romain Provost (RPro), Richard Raymond (RRay), Roland Trousseau (RTro), Stéphane Abin (SABi), Sylvie† et Aldo Gonzalez-Pueyo (SAGP), Sophie Aubertin (SAub), Sandrine Aubrun (SAun), Shoulamit Auvé (SAuv), Séverine Aubry (SAuy), Sandy Barberis (SBar), Sophie Baudet (SBat), Suzanne Baumeige (SBau), Stéphane Bernou (Sber), Sylviane Berthelot (SBet), Sabine Beutin (SBeu), Soazic Bounadi-Grisson (SBGr), Sandrine Bouligand (SBod), Serge Bogaerts (SBog), Sylvaine Boisson (SBoi), Stéphane Boitel (SBol), Sylvie Boutet (SBou), Sylvie Boyer (SBoy), Stéphane Brunet (SBru), Stéphane Camus (SCam), Sylvain Cardonnel (SCar), Sorlin Chanel (SCha), Serge Chevallier (SChe), Stéphane Clavé (SCLa), Sophie Clément (SCLé), Sylvain Codarini (SCod), Sandrine Coppens (SCop), Sylvain Courant (SCou), Stéphane Crémier (SCré), Sibylle Cuenin (SCue), Sylvie Dangelser (SDan), Stéphanie Dardenne (SDar), Sébastien Davoust (SDav), Sébastien Detante-Brison (SDBr), Sophie Debat (SDeb), Sébastien Decap (SDec), Sophie Deshors (SDeh), Stéphane Dempuré (SDEM), Stéphane Deroye (SDer), Stéphane Desvant (SDev), Stéphane Dubois (SDub), Sylvain Dufour (SDuf), Stéphanie Dupont (SDup), Sébastien Duboz (SDuz), Sully Ecodélégué(e)s (SEco), Sybille Egea (SEge), Solène Exbrayat (SExb), Samuel Ferreira (SFer), Sébastien Foix (SFoi), Sonia Freulon (SFre), Stéphane Gaillard (SGai), Stéphane Gallois (SGal), Sylvie Gosset (SGos), Stéphane Guillemot (SGui), Stéphanie Halter (SHal), Sébastien Hano (SHan), Sylvie Hendriksen (SHen), Sylvie Heraux (SHer), Sylvie Henry (SHey), Su Hong Ngo (SHNg), Sylvain Houpert (SHou), Simone Kirk (SKir), Sofie Kremen (SKre), Sébastien Lage (SLag), Steve Le Briquir (SLBr), Solenne Lefèvre (SLef), Sophie Lemarchand (SLEM), Serge Le Floch (SLFI), Sean Lohead. (SLoc), Suzanne Le Ralle (SLRa), Sonia Le Squeren (SLSq), Sébastien Macé (SMac), Stéphane Mallard (SMal), Sylvain Maresia (SMar), Sébastien Merle (SMer), Susan Merry (SMey), Sébastien Mollot (SMol), Serge Moreau (SMor), Sébastien Nédellec (SNéd), Stéphane Noell (SNoe), Sabine Normand (SNor), Sonia Oliviero (SOLI),

Les non-passereaux, volet 1

Années 2012 à 2014

Sylvestre Plancke (SPla), Sylvie Portier (SPor), Sophie Pernes-Pinta (SPPi), Sylvia Prévost (SPré), Sylviane Priou (SPri), Stéphane Prulière (SPru), Sylvain Reyt (SRey), Simon Rolland (SRol), Sab Ron (SRon), Sébastien Ruhaut (SRuh), Sylvaine Sallet (SSal), Sébastien Sans (SSan), Sylvie Sauvage (SSau), Sébastien Siblet (SSib), Sylvain Tardy (STar), Stéphane Thouanel (SThl), Stéphane Thomin (STho), Sylvie Thuillier (SThu), Susan Trude (STru), Sébastien Turpin (STur), Séverine Urbain (SUrb), Sébastien Vannerot (SVan), Sébastien Vanloo (SVao), Sylvie Van Den Brink (SVDe), Sylvain Vincent (SVin), Sylvain Vrignaud (SVri), Stanislas Witkowski (SWit), Stanislas Wroza (SWro), Thomas Ahr (TAhr), Thierry Armand (TArm), Thierry Bara (TBar), Thomas Bitsch (TBit), Tristan Bouteville (TBou), Thibaut Chansac (TCha), Thomas Chassagne (TChg), Timothée Chaumier (TChm), Thibaud Daumal (TDau), Thibaut Démoulin (TDém), Tristina Dinot (TDin), Tiffany Dumontier (TDum), Trevor Elliot (TEll), Thierry Fernez (TFer), Thierry Fournet (TFou), Thomas Fracapani (TFra), Thomas Gouëlle (TGou), Tristan Gruson (TGru), Thérèse et Guy Van Kalmthout (TGVK), Théo Hervé (THer), Thibault Joucla (TJoa), Thibault Jourdain (TJou), Thomas Koffel (TKof), Tsunehiko Kuwabara (TKuw), Thibaut Lacombe (TLac), Thomas Liebel (TLie), Tanguy Loïs (TLoï), Thomas Lux (TLux), Thierry Marc (TMar), Tony Mercan (TMer), Thierry Micol (TMic), Thierry Munier (TMun), Titouan Pottier (TPot), Thomas Puaud (TPua), Tarek Riabi (TRia),

Thomas Rogez (TRog), Thierry Roy (TRoy), Thomas Schuhmacher (TSch), Tristan Sévellec (TSév), Tarnat Tarnat (TTar), Thierry Vaissière (TVai), Thierry Vesz (TVes), Théo Vivensang (TViv), Ursula Berthon (UBer), Vincent Alarcon (VAla), Véronique Aubin (VAub), Véronique Bengue (VBen), Valentin Bors (VBor), Véronique Bossé (VBos), Véronique Challemel (VCha), Valérie Clert (VCle), Véronique Colas (VCol), Valentin Condal (VCon), Véronique Crasnier (VCra), Valérie Delpuech (VDeh), Véronique Delamare (VDel), Vincent Delecour (VDer), Véronique Devienne (VDev), Vincent Dourlens (VDou), Véronique Durney (VDur), Valérie [et ?] Éric Perrin (VÉPe), Vanessa Eychenne (VEyc), Valérie Fernandes (VFer), Vincent Florin (VFlo), Vincent Gilet (VGil), Véronique Godinot (VGod), Vincent Hulin (VHul), Véronique Hombieux-Wang (VHwa), Valérie Lamarre (VLam), Valérie Laporte (VLap), Véronique Lassalas (VLas), Vincent Le Calvez (VLCa), Valérie Leonhardt (VLeo), Vincent Limagne (VLim), Véronique Linglain (VLin), Virginie Maletterre (VMal), Véronique Martinelli (VMar), Valérie Mathieu (VMat), Virginie Nizard (VNiz), Vincent Ponelle (VPon), Valérie Revel (VRev), Véronique Roguet (VRog), Vincent Tanguy (VTan), Vincent Tanqueray (VTay), Viviane Toulhoat (VTou), William Hamadache (WHam), William Huin (WHui), William Langlois (WLAN), Wei Tan (WTan), Xavier Boudon (XBou), Xavier Danelon (XDan), Yacine Attik (YAtt), Yassine Ben (YBen), Yvette Brevière (YBre), Yohann Brouillard (YBro), Yann Carasco (YCar), Yvette Clemenson (YCle), Yves Cordoliani (YCor), Yvon Creau (YCre), Yves Dabry (YDab), Yves de Tonquédec (YdTo), Yves Dubois (YDub), Yves Gestraud (YGes), Yveline Goldman (YGol), Yannick Henry (YHen), Yann Loisel (YLoi), Yoanna Marescot (YMar), Yves Massin (YMas), Yoann Morel (YMor), Yannick Patis (YPat), Yann Paulet (YPau), Yvelise Pyl (YPyl), Yvette Ruiz (YRui), Yves Saulnier (YSau), Yvette Vargas (YVar), Zac Couret (ZCou).

Recommandations aux auteurs

Le Passer est une revue d'ornithologie régionale et publie des articles et notes apportant une contribution à la connaissance et à la protection des oiseaux sauvages en Île-de-France. Les questions d'ornithologie francilienne pourront utilement être replacées dans une perspective plus large, afin d'en préciser l'intérêt, mais les manuscrits traitant spécifiquement d'autres régions ne sont pas acceptés.

Les articles et notes sont soumis au comité de lecture, qui pourra proposer aux auteurs les modifications qu'il estime nécessaires à l'élaboration du texte définitif.

Recommandations

Il est recommandé de suivre, dans la mesure du possible, les conseils indiqués ci-dessous :

- L'organisation du texte est libre, mais il est vivement conseillé de respecter une présentation simple de l'article, avec des sections clairement définies (par exemple : Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion). Il pourra être utile de s'inspirer des articles publiés dans des numéros récents de la revue.
- Éviter les reports en annexes ainsi que les notes de bas de page. Les informations les plus pertinentes gagneront à être indiquées directement dans le texte principal, les autres pourront être omises.
- Fournir, de préférence, une version informatique du texte sous format Word (en précisant la version utilisée) ou sous un autre traitement de texte compatible (préciser alors le type de logiciel, la version, et

l'environnement utilisé – Windows, Macintosh). Les personnes n'ayant pas accès à un ordinateur pourront soumettre un texte dactylographié ou écrit très lisiblement à la main sur papier 21 x 29,7 cm.

- Les graphiques, tableaux, photos seront présentés séparément du texte (feuilles séparées et/ou fichiers informatiques différents). Ils doivent être numérotés en chiffres arabes, légendés, et être appelés dans le texte par leur numéro au moment où l'on s'y réfère. Pour les courbes et histogrammes, il est demandé de donner les tableaux de chiffres correspondants, afin de permettre de redessiner automatiquement les graphiques dans le format de la revue.
- Pour les dessins au trait et autres illustrations, fournir des originaux, ou des copies de très bonne qualité, destinés à être numérisés. Il est aussi possible de transmettre directement ces documents sous un format d'image informatique standard (fichiers tif ou jpg par exemple).
- La définition des images doit impérativement être suffisante pour permettre une résolution de 300 dpi minimum à la dimension finale de publication – condition indispensable à une bonne qualité d'impression. N'oubliez pas que plus une carte ou un schéma apparaîtra en grande taille sur la page, plus elle sera lisible.
- La nomenclature scientifique utilisée est celle de la *List of Holarctic bird species* (VOOUS, 1973, 1977), reprise dans la *Liste LPO des oiseaux du Paléarctique occidental*.
- Fournir, sauf pour les notes courtes, un résumé indiquant brièvement le

sujet traité ainsi que les principaux résultats et conclusions.

- Les références citées dans le texte doivent être listées en fin d'article, en les classant par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Suivant qu'on citera un article paru dans une revue, un livre ou un chapitre de livre, on respectera la présentation suivante : KOVACS, J.-C., et SIBLET, J.-P., (1998). Les oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial en Île-de-France. *Le Passer*, **35** : 107-117. LE MARÉCHAL, P., et LESAFFRE, G. (2000). *Les Oiseaux d'Île-de-France. Avifaune de Paris et de sa région*. Delachaux et Niestlé, Paris 343 pages. CUISIN, M. (1994). Pic mar, in YEATMAN-BERTHELOT, D., et JARRY, G., *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989*. Société ornithologique de France, Paris : 438-439.
- Indiquer les adresses complètes de tous les auteurs.

Les textes et les illustrations soumis pour publication dans *Le Passer* doivent être adressés au CORIF, Maison de l'oiseau, Parc forestier de la Poudrerie, Allée Eugène-Burlot, 93410 VAUJOURS. Les documents informatiques pourront être envoyés en pièce jointe par e-mail à corif@corif.net ou déposés sur l'espace adhérent du site Internet du Corif (www.corif.net).

La reproduction des articles et dessins publiés est interdite sans autorisation de la rédaction.

Sommaire

		Pages
F. Malher	Présentation de l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Île-de-France (Corif, 2017)	2 à 3
D. Laloi	Les oiseaux rares en Île-de-France 2007-2012 rapport n° 15 du CHR	4 à 21
C. Walbecque	Suivi de la nidification de linottes mélodieuses <i>Carduelis cannabina</i> dans un jardin du Val-d'Oise (95)	22 à 25
C. Gloria O. Laporte S. Wroza S. Vincent É. Grosso I. Anglade J. Piolain F. Malher	Synthèse ornithologique 2012-2014 : non-passereaux, volet 1	26 à 56